

Llista Sistemàtica

Cygnus olor

Cigne mut

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades, tot i que no es poden diferenciar els exemplars introduïts dels que puguin arribar de forma natural. Presència d'exemplars introduïts en algunes zones humides. Es distribueix per les Illes Britàniques i des del centre d'Europa fins a la Xina.

L'any 2008 es va rebre un important volum de dades, de les quals es publiquen aquelles que corresponen a poblacions consolidades (PNAE i aiguabarreig Segre-Cinca) i les que presenten indicis de tractar-se d'animals provinents de poblacions salvatges. Destaca en aquest aspecte la dada del cap de Creus a mar obert i els exemplars del Besòs i el Llobregat, que possiblement fossin els mateixos i provinguessin dels aiguamolls de l'Empordà.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a mitja milla nàutica de cap Norfeu el 24.V (ALXE i GGXB); (G). No tramesa al CAC.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en una parella (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un adult a Canal Vell el 28.XI (LWWA, MTTB, JTTD, ISSD i CJMA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la desembocadura del Ter el 16.II (EPMC i MBXH); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. de 1r hivern sobre cal Tet i després a la maresma del Remolar el 3.XI (FLSA, TRXD i STXB); (G). Homologada pel CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 3 joves al Parc Fluvial del Besòs el 20.X (XLBA), un d'ells es troba mort a la ciutat prop del riu el 26.X (ACXJ) i els altres 2 s'observen fins el 2.XI (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al riu Segre al pas per la localitat el 23.IV (APSA); (G). Homologada pel CAC.

Tèrmens 1 ex. al riu Segre el 28.XI (MLMB); (G). No tramesa al CAC.

SEGRIÀ

Lleida 6 exs. al riu Segre els dies 18 i 19.I (ESMA, EFSA, JPXM, ICXF, JIXA i RRJB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 15 exs. a l'aiguabarreig Segre-Cinca els dies 18 i 19.I (MGMA, QGXA, DSXD i MEXC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Cygnus columbianus

Cigne petit

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. Cria al nord de Sibèria, i hiverna a l'oest d'Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Continuen els 2 exs. de la subespècie *bewickii* localitzats el 26.XII.2007 a la Bombita, fins el 2.II (JTOA i RSBB); (G). No tramesa al CAC.

Anser albifrons

Oca riallera grossa

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC o el CR/SEO. Cria al nord de Sibèria, Alaska i el Canadà, i a la costa oest de Groenlàndia. Hiverna a la major part d'Europa, incloent en baix nombre, Doñana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua observant l'ex. de 1r any que es va detectar per primer cop a Molins de Rei el 16.XII.2007, entre el 9.I i el 10.IV (FLSA); (G). No tramesa al CAC.

Molins de Rei Es torna a observar l'ex. de la citació anterior entre el 2 (MLXF) i el 6.I (XPCA) i entre el 12 (MGVA) i el 24.I (JFGB); (G). No tramesa al CAC.

Anser anser

Oca vulgar

Estatus *A. a. anser* és un hivernant regular, en baix nombre, encara que en augment darrerament en les principals zones humides del litoral. Migrador regular a la resta del territori. *A. a. rubirostris* té un estatus desconegut i nomès s'ha citat com a hivernant al delta del Llobregat el 1993-

1994. Es distribueix pel sud-est d'Europa i de Turquia fins a l'extrem nord-est de la Xina

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 164 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 exs. a la Massona el 14.X (JMAA); primera citació postnupcial (F). 218 exs. a l'estany del Cortalet el 16.XII (JMAA); màxim anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 687 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 2 exs. el 15.V (PBGA i JBOL); darrera citació prenupcial (F). 10 exs. el 29.IX (PBGA i JBOL); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Perafita 17 exs. sobre el nucli urbà el 18.X (JBCB i MORA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. entre l'11 i el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida Mínim de 90 exs. sobre el nucli urbà el 30.IX (FMSA); primera citació postnupcial (F, N).

SELVA

Sils 7 exs. als estanys el 12.I (ADGA, ICAA, MVCA, MGSA i JVCB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SOLSONÈS

Guixers 6 exs. migrant a poca alçada en direcció sud-oest nord-est sobre la torre de la Corriu el 26.I (RBVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Uns 100 exs. en migració i cridant en vol baix a les 21:45 h sobre can Alzamora el 13.IV (JRCD i SMMD); (N, F).

Branta canadensis**Oca del Canadà**

Estatus Accidental. Dues citacions a Catalunya fins el 2002. La seva àrea de distribució és a Amèrica del Nord. Ha estat introduïda en alguns llocs d'Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda del 25.X (CJMA, ISSB, JFOD, AFFC, MZZA, ACTA i DBCA) al 29.XII (RBVA i SSXA); (G). No tramesa al CAC.

Branta leucopsis**Oca de galta blanca**

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén per l'Àrtic, des de Groenlàndia fins a Nova Zèmbia. Com a hivernant, es pot observar a la Gran Bretanya i a Holanda.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un adult a la platja de can Comes i l'estany del Cortalet del 10 al 19.VI (JMAA, AOTA, JGIA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Branta bernicla**Oca de collar**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC, que inclouen exemplars hivernants al delta de l'Ebre. La subespècie *bernicla*, que és la que es detecta a Catalunya, es reproduïx a l'àrea central del nord de Sibèria, i hiverna a la Gran Bretanya i a la costa est del mar del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Fangar entre el 21.I (JFBB) i el 28.III (CJMA); (G). No trameses al CAC.

Tadorna ferruginea**Ànec canyella**

Estatus Accidental. Hi ha dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén pel sud-est d'Europa cap a Mongòlia, i també pel nord-oest de l'Àfrica.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del 25.VI (MRFB i OCVA) al 2.VIII (ARSA); (G). No tramesa al CAC.

Tadorna tadorna**Ànec blanc**

Estatus Nidificant escàs al delta de l'Ebre i delta del Llobregat, on ho fan unes poques parelles recentment. Regular en migració i a l'hivern a tot el territori.

ALT CAMP

La Masó 1 ex. en una bassa de rec al nord del nucli urbà el 24.XII (ACTA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 25 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA,

BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle a la cua de l'embassament del Foix entre el 6 (PTEA, JCRE i XPCA) i el 9.V (XPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la depuradora el 27.XI (ACTA i MPSA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.473 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. a l'aeroclub Empordà de l'1 al 4.V (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 42 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 6 parelles nidificants en el conjunt del delta (FLSA); (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. cap al sud, davant de la desembocadura del Besòs el 5.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 4.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 3 exs. en vol al davant del port de Garraf el 6.IX (FMVA); (G, F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 20.V (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 15.VIII (JVDA); primera citació postnupcial (F).

Aix galericulata

Ànec mandarí

Estatus Hivernant molt escàs però quasi regular a les zones interiors del nord de Catalunya. Accidental a la resta del territori. La seva àrea de distribució natural es troba actualment al sud-est de Rússia, el nord-est de la Xina, i el Japó. S'ha establert al sud d'Anglaterra, Alemanya, Holanda, Suïssa, Àustria i s'ha reproduït de forma irregular en altres indrets.

Totes les dades rebudes entren dins la fenologia (novembre-abril, amb un màxim el gener i el desembre) atribuïble a probables hivernants procedents de poblacions naturalitzades al centre d'Europa. Considerant només les dades hivernals, l'hivern 2007-2008 s'haurien detectat 6 individus, mentre que l'hivern 2008-2009 la xifra hauria augmentat fins a 11. Tot i això, com ja és habitual per la manca de recaptures d'ocells anellats, resulta inviable dir amb seguretat si les observacions corresponen a veritables hivernants salvatges o a individus escapats de captivitat de zones pròximes. La reiteració interanual d'observacions en les mateixes localitats sembla indicar una fidelització als llocs d'hivernada, com és el cas del Berguedà central (on s'observa des de fa 20 anys) o, els darrers temps, de l'embassament del Foix i de l'entorn de Banyoles-riu Fluvià.- PABB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle que es mou entre l'estany del Cortalet i la Massona del 18 al

25.XII (PCXE i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1 ex. el 19.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens d'ocells aquàtics hivernants (G). De nou s'observa el 30.I, el 28.III, l'11.IV i el 14.IV (CGGA, XBGA i HSCA); (G, F). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una parella que sembla bastant confiada a la Murtra el 6.IV (RBVA); (G). No tramesa al CAC.

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l'estany de Graugés el 13.I (PABB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Olvan Diverses observacions a la colònia Rosal: un mascle l'1.I (PABB); (G). Un mascle i una femella el 20 (MCXE) i el 28.XII (PABB); (G). No trameses al CAC.

GARROTXA

Maià de Montcal Una femella a Dosquers el 2.I (FTCA); (G). No tramesa al CAC.

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la bassa d'aigua salobre ran de mar de la desembocadura de la Tordera el 22.IV (PABA i EBMA); darrera citació prenupcial a Catalunya (G, F). No tramesa al CAC.

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 3 mascles i 3 femelles, probablement escapats ja que es deixen observar a una distància molt propera, al sector sud de l'embassament de Cellers el 4 i 5.XII (JPRE); (G). No tramesa al CAC.

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Una femella a la resclosa de Seri-

nyà del 10 al 15.I (MLLA); (G). No tramesa al CAC.

RIPOLLÈS

Camprodon-Ripoll 2 exs. a l'alt Ter el 12.I (FGPA i CGPC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G). No tramesa al CAC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç entre el 26.XI (EPXA i JSXM) i el 14.XII (DMCA i EPXA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès Un mascle al riu Tenes el 25.XI (OBDA); primera citació prenupcial a Catalunya (F). No tramesa al CAC.

Anas penelope

Ànec xiulador

Estatus Comú en migració i a l'hivern en zones humides litorals, i rar a l'interior. Estiuejant molt ocasional i reproductor accidental al delta de l'Ebre.

La xifra total d'ànecs xiuladors enregistrada al 2008 als censos d'hivernants a Catalunya ha estat la més alta comptabilitzada des de 1996, any de la publicació del primer anuari. De la mateixa manera el nombre d'exemplars d'aquesta espècie detectats al delta de l'Ebre és també el més alt que s'ha publicat en l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya. Aquest fet no s'ha repetit en les dues altres principals zones humides del país (delta del Llobregat i PNAE). Curiosament els mateixos resultats es donen en els censos corresponents a l'ànec griset *Anas strepera*, el xarxet *Anas crecca*, l'ànec cullerot *Anas clypeata* i el morell de cap-roig *Aythya ferina*, coincidència que tampoc s'havia donat mai entre 1996 i 2007.-MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 120 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 7.585 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 53 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la llacuna de cal Tet: una parella el 6.V (FLSA i SBXC); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. al 17.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). Màxim de 48 exs. al desembre (FLSA); màxim postnupcial als censos d'anàtides hivernants (N).

BERGUEDA

Avià Un mascle i una femella a l'estany de Graugés el 8.III (PABB); (G).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Un mascle davant can Morgat el 19.IV (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 26 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Mínim de 30 exs. el 12.III (MGMA); màxim prenupcial (N). Un mascle el 24.IV (AVPA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); primera citació postnupcial (F). 44 exs. el 21.XI (SSAA); màxim postnupcial (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle als entorns del riu Besòs entre l'1 i el 9.X (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Anas strepera**Ànec griset**

Estatus Resident nidificant abundant al delta de l'Ebre (més comú a l'hivern) i escàs als aiguamolls de l'Empordà, i al delta del Llobregat. Migrador i hivernant regular i escàs.

Vegeu el comentari corresponent a l'ànec xiulador, *Anas penelope*.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 64 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 15 parelles (JMAA); (R).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 2 exs. a l'embassament del Foix l'1.IX (PTEA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5.285 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 155 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 parelles nidificants (FLSA); (R).

BERGUEDA

Olvan 2 mascles i 2 femelles en una resclosa al Llobregat de l'1.I al 31.I, dels quals en resten un mascle i una femella el 17.II (PABB); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 2 exs. al riu Gaià a l'alçada de Santa Perpètua de Gaià el 30.XI (JMFC i MSXF); (G).

GIRONÈS

Girona Un mascle al riu Onyar el 23.XI (XDPA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle i una femella a la desembocadura de la Tordera el 26.III (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 10 exs. a l'estany el 19.III (JBVB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una possible parella nidificant (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 20.X (JBGC); primera citació postnupcial (F).

Anas crecca**Xarxet comú**

Estatus Migrador i hivernant regular i molt comú a tot el territori. Nidificant molt rar i esporàdic, irregularment.

Vegeu el comentari corresponent a l'ànec xiulador, *Anas penelope*.

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boi Un mascle sobre la neu a l'estany Llong a més de 2.000 m el 14.V (MBPX); (B).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2.793 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 37.704 exs. entre el 6 i el

16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 428 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a la maresma del Remolar i la bassa dels Pollancrecs durant els mesos de maig i juny (FLSA); citació estival (F). 2 exs. a cal Tet el 16.VII (RBVA); possible primera citació postnupcial (F). Màxim de 586 exs. a l'octubre (FLSA); màxim anual (N).

OSONA

Vilanova de Sau Un mascle i 4 femelles al pantà de Sau l'11.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. a la mollera d'Escallarre el 30.IV (JCBC); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 77 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 14.IV (MBXL); darrera citació prenupcial (F). 25 exs. el 27.VIII (SSAA i ERVA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIA

Lleida 77 exs. al riu Segre el 18-19.I (ESMA, EFSA, JPMX, ICXF, JIXA i RRJB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: Un mascle i una femella el 14.IV (TMXC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII (TMXC); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Muntanyans el 15.VIII (JVDA); primera citació postnupcial (F).

Anas crecca × *Anas carolinensis*

Xarxet comú × Xarxet americà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle als estanys del Matà i la Massona del 28.II al 9.IV (JMAA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Anas platyrhynchos

Ànec collverd

Estatus Resident molt comú a tot el territori. Hi ha una aportació de migrants i hivernants que varia segons la cruesa dels hiverns.

D'entre les citacions rebudes l'any 2008 en destaca la dada de cria a l'estany de Malniu a una altitud de 2.200 m, per sobre de la màxima reportada a Catalunya (Estrada *et al.* 2004).- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=59).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 14% (*, n=95).
Índex 2008=2,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6.629 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

CERDANYA

Meranges Una femella amb 3 polls a mig créixer a l'estany de Malniu a 2.200 m d'altitud el 28.VIII (LTBB); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 70.212 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.286 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Entre 461 i 636 parelles nidificants (FLSA); (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1.439 exs. el 17 i 19.I (JEBa, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 20-30 parelles nidificants (JEBa); (R, N). Mínim de 2.300 exs. el 21.X (JEBa, VPRA i MLMB); màxim anual (F).

Anas acuta

Ànec cuallarg

Estatus Migrador i hivernant regular, tot i que només és comú al delta de l'Ebre. Rar a les zones humides de l'interior. Estiujeant ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 8 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8.926 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als calaixos de depuració el 2.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 12.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F). Màxim de 10 exs. al novembre (FLSA); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 25 exs. en vol direcció nord-est a la desembocadura de la Tordeira el 20.II (PABA i EBMA); (N).

OSONA

Gurb Un mascle i una femella al Gurri al Reixac el 31.XII (JCRC); (G).

Manlleu Un mascle i una femella, probablement els mateixos de l'observació anterior, a la Devesa al Ter el 31.XII (JAIA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Un mascle entre uns xarrasclets *Anas querquedula* al nord de l'estany el 15.III (CFQA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 30 exs. el 12.III (MGMA); màxim anual (N). 1 ex. el 21.V (JEBA i ERVA); darrera citació prenupcial (F). Mínim de 15 exs. el 9.IX (JEBA i ERVA); primera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Una femella a l'embassament de Sant Ponç el 5.III (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Una femella a la torre d'en Dol-

ça el 25.X (EGTA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una femella a l'estany de Gallecs l'11.VII (OBDA); citació estival (F).

Anas querquedula

Xarrasclet

Estatus Nidificant molt localitzat i darrerament més irregular i escàs. Migrador comú per tot el territori. Hivernant ocasional.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, F). Un mascle de 1r hivern a l'estany d'en Pericus del 5 (AOTA i JMAA) al 10.II (XDPA i JMAA); citació hivernal o primera citació prenupcial (F). Una parella a l'estany de Palau el 22.II (SSAA); primera citació prenupcial segura (F). 1 ex. als estanys del Matà l'11.VII (ABRA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a les Llaunes de l'11.XI (ABRA) fins al 20.XII (AOTA); citació hivernal (F).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a la Tancada el 3.III (JTOA i RSBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la gola de Migjorn el 6.VII (JTOA i RSBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Tancada l'1.XI (CJMA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la bassa dels Pollancrel el 25.II (FLSA, SBXC, ARMC i PBGA); primera citació prenupcial (F). Una parella als calaixos de depuració el 12.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 6.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració el 19 i el 24.XI (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 196 exs. a la zona nord de l'estany davant la caseta de fusta el 15.III (CFQA, JBVB i XVPA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 13 exs. l'11.IV (SSAA); màxim prenupcial (N). Un mascle el 21.V (JEBA i ERVA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Un mascle a l'embassament dels Montblanquets el 26.III amb un grup d'ànecs cullerots *Anas clypeata*; (JRAA); primera citació documentada en aquesta localitat (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 14.VI (JVLA, TMXC, TSCA, MGXF, ACPC i RNVA); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Diverses observacions a l'embassament de Sant Ponç; Una femella el 3.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 70 exs. el 15.III (RBVA); (N).

Anas discors**Xarxet alablau**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CR/SEO. La seva distribució s'estén per Amèrica del Nord com a reproductor i cap al sud fins al tròpic de Capricorn com a hivernant.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle a Canal Vell el 29.II (YBSA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella o 1 ex. de 1r hivern a la bassa dels Pollancrel del 24.IX (FMVA i JCMC) fins el 25.X (RBVA); (G). Homologada pel CAC.

Anas clypeata**Ànec cullerot**

Estatus Nidificant regular al delta de l'Ebre, tot i que en molt baix nombre, i irregular en altres àrees com el delta del Llobregat o els aiguamolls de l'Empordà. Estiuant ocasional en altres àrees del territori continental. Migrador i hivernant comú a tot el territori, especialment a les zones humides litorals.

Vegeu el comentari corresponent a l'ànec xiulador, *Anas penelope*. D'altra banda el 2008 només s'han recollit dades de reproducció a l'estany d'Ivars on ja va criar els anys 2006 i 2007 (Estrada & Anton 2007, Anton 2008).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 718 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 exs. a l'estany del Cortalet el 16.VII (JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 21.563 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 425 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a la maresma del Remolar, almenys fins l'11.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 2.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs malalt de botulisme el 7.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F, B).

OSONA

Vilanova de Sau 3 mascles i 2 femelles al pantà de Sau l'11.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 7 exs. a l'estany de Montcortés el 23.III (JRSB); (G, F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Una femella a la llacuna de l'Artiga el 2.VIII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 80 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBGA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2-4 parelles nidificants (JEBA); (R, N). 200

exs. el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); màxim anual (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.IV (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 6 exs. a l'embarcament de Sant Ponç el 16.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la torre d'en Dolça el 3.IV (CAFA); darrera citació prenupcial (F).

Marmaronetta angustirostris

Xarxet marbrenc

Estatus Visitant ocasional a Catalunya, més rar com més al nord. En augment, especialment al delta de l'Ebre, on actualment hi és de presència regular i hi ha criat recentment. Hivernant escàs al mateix delta.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a l'illa de Buda: 2 exs. el 26.IV (RGBA, XLBA, SSAA, ARMC i ALTA); (G). 1 ex. el 23.IX (KBBA, ISSB i ALTA); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma del Remolar el 23.VI (RMXH, PBGA, JBOL i ALTA), 3 exs. el 24.VI (STVB) i de nou 2 exs. el 25.VI (FLSA); (G). No trameses al CAC.

Netta rufina

Xibec

Estatus Resident al delta de l'Ebre, única localitat de cria regular amb un contingent important de reproductors, on hi ha un

bon nombre d'efectius durant tot l'any, amb una aportació significativa d'individus a l'hivern. A la resta de zones humides és un migrador i hivernant escàs, o rar i irregular i un estiuejant i nidificant irregular, especialment al delta del Llobregat, on ha nidificat alguns anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle a la Massona el 20.III (RFRA); primera citació prenupcial (F). Una femella a l'estany del Cortalet el 14.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). 2 mascles a la Massona el 20.VI (JMAA); citació estival (F). 2 exs. en vol per la platja de can Comes el 12.X (PFLB i ALTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a la cua de l'embassament del Foix el 4.X (JVXF i MCMF); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8.814 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Begur 26 exs. en vol sobre el mar al cap de Begur el 9.XI (OBDA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 8 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 parelles nidificants (FLSA); (R).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la desembocadura de la Tordera entre el 8 i el 10.IV (PABA); primera citació documentada en aquest espai (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 4 exs. a la zona nord de l'estany

el 19.III (JBVB i CFQA); primera citació prenupcial (F).

Porqueres 3 exs. a l'estany davant de can Morgat el 8.IV (JBVB); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. a la llacuna de l'Artiga el 25.VII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. el 9.III (MPLA); primera citació prenupcial (F). 2-3 parelles nidificants (JEBB); (R, N). Una femella el 21.X (JEBB, VPRA i MLMB); darrera citació postnupcial (F).

Aythya ferina

Morell de cap roig

Estatus Nidificant localitzat i irregular, en baix nombre, al delta de l'Ebre i al delta del Llobregat. Darrerament estiuegen en molt baix nombre i de manera local a les zones humides del Segrià i els aiguamolls de l'Empordà. Migrador i hivernant abundant a tot el territori on hi hagi masses d'aigua adients.

Vegeu el comentari corresponent a l'ànec xiulador, *Anas penelope*.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 32 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.684 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 119 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella amb 9 polls al pont de la Vidala el 28.VI (SMXA); única parella nidificant detectada (R). Màxim de 212 exs. al desembre (FLSA); màxim anual (N).

BERGUEDÀ

Avià Un mascle a l'estany de Graugés el 24.V (PABB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó Una femella prop el Llac entre el 4 i el 7.X (APXF); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 5.IX (CFQA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 76 exs. el 2.III (GBCA); màxim anual (N). 2 mascles el 3.VI i un mascle el 22.VII (JEBA); citacions estivals (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 4 mascles a l'embassament dels Montblanquets el 20.V (JRAA); darrera citació prenupcial (G, F).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys el 29.V (TMXC); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 3 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 27.III (RBVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau Solità i de Plegamans Un mascle a l'Hostal del Fum el 13.X (XLBA); primera citació postnupcial (F).

Aythya ferina × *Aythya nyroca*

Morell cap-roig × Morell xocolater**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet de l'11.XII (FLSA i RBVA) fins a finals d'any (FLSA); (M).

Aythya nyroca

Morell xocolater

Estatus No nidificant a Catalunya tot i que darrerament hi ha casos de residents, que no arriben a nidificar, com ha passat al Segrià. Hivernant molt escàs, però regular els darrers anys, a les principals zones humides tant del litoral com de l'interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Llaunes el 22.XII (JMAA, AOTA i TMJA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a Canal Vell entre el 4 (JFOD) i el 13.X (PJAA i CJMA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Tet el 5.III (FLSA); (E). Un mascle a la bassa dels Pollancrel el 4.V (MGVA); darrera citació prenupcial (E, F). Una femella o juvenil de 1r hivern a la Vidala el 13.X (FLSA); primera citació postnupcial (E, F). Diverses observacions a cal Tet: un mascle el 14.X (FLSA); (E). 2 mascles el 27.X (FLSA);

(E). 1 ex. a cal Tet l'1.XI (JSPC i CPMB); (E). Un mascle el 4.XI (FLSA); (E). Un mascle als calaixos de depuració el 24.XI (FLSA); (E). 2 mascles a cal Tet el 14 i 15.XII (FLSA); (E). Un mascle a cal Tet del 27.XII a finals d'any (RBVA); (E).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Una femella adulta a la llacuna de l'Artiga del 5 al 8.V (CFQA); (E, G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 18.XII (FSVA i DGCA); (E).

Aythya fuligula

Morell de plomall

Estatus Migrador i hivernant regular, no gaire abundant. Estiuejant molt rar.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 29 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a la Massona el 19.X (GDBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 393 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als calaixos de depuració el 6.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 12.X (RBVA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una parella el 28 (MPOA) i el 29.III (JEBA i FSVA); (G).

Somateria mollissima

Èider

Estatus Hivernant quasi regular a Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). Diverses observacions a la gola nova del Llobregat: es continua observant el mascle de 1r hivern que es va detectar per primer cop l'1.XI.2007 fins el 9.IV (FLSA); (E). Un mascle adult del 23.IX fins el 19.XII (PEGA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle davant l'espigó del trencaones entre l'heliport i el restaurant Porta Coeli del 10 al 13.XI (DMVB); (E).

MARESME

Arenys de Mar Una femella al port el 10.I (ACHA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del Francolí al gener (ACTA i RACC); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). Es continua observant com a mínim fins el 29.I (PJAA); (E).

Clangula hyemalis

Ànec glacial

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. Es reproduïx a les costes de l'Àrtic, i com a hivernant assoleix la Gran Bretanya i la costa est del mar del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G, N). No tramesa al CAC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Continua la femella localitzada el 9.XII.2007 a la Rogera i a altres llacunes litorals fins el 24.III (MLMB, AOTA i ALTA); (G). Homologada pel CAC.

Melanitta nigra

Ànec negre

Estatus Migrador i hivernant regular al litoral, però localitzat, especialment al delta de l'Ebre, el delta del Llobregat i la badia de Roses.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 2, mancances.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 7 exs. el 14.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 10 exs. al mar el 18.XI (DDDA i EFTA); primera citació postnupcial (E, F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 50 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 15.III (CCTA); (E). 1 ex. a la

gola del riu el 16.IV (FLSA); (E). 1 ex. a la mateixa localitat el 24.V (RBVA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 31.XII (XLBA i MGVA); (E).

Melanitta fusca

Ànec fosc

Estatus Migrador i hivernant molt escàs, però darrerament regular a les zones on també ho és l'ànec negre *Melanitta nigra*. La seva presència varia segons l'èxit de la reproducció als quaters de cria nòrdics, i de la cruessa dels hiverns, que porta més exemplars cap al sud.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Continua la femella localitzada el 28.XII.2007 al grau de Santa Margarida fins el 12.I (AOTA, JMAA i ALTA); (E). 15 exs. a la platja de can Comes el 9.XI (CLAA); primera citació postnupcial (E, F, N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Una femella a l'illa de Caramany i la gola del Fluvià del 18 al 26.I (AOTA i ALTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 9 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la badia dels Alfacs: 2 exs. l'1.I (JTOA i RSBB); (E). 4 exs. el 3.I (JTOA i RSBB); (E). 1 ex. al Fangar el 8.I (DBCA); (E). De nou diverses observacions a la badia dels Alfacs: 6 exs. el 17.I (DBCA i ALTA); màxim anual (E, N). 3 exs. el 19.I (JTOA i RSBB); (E). 3 exs. el 21.I (CJMA i JBAB) i el 2.II (JTOA i RSBB); darrera citació prenupcial (E, F).

Mergus serrator

Bec de serra mitjà

Estatus Migrador, i especialment hivernant, rar i molt localitzat. Només al delta de l'Ebre és un hivernant regular, malgrat ser escàs.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 14.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella a la platja de Sant Martí d'Empúries el 19.XI (JMAA i TMJA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a Punta Falconera el 8.XII (GCXB i LBXC); única citació de l'any (G).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. el 9.I (PJAA); (N). En dies posteriors s'observen fins a 4 exs. (PJAA); (N). 1 ex. al port el 15.II (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 62 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella o 1 ex. de 1r hivern el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a la platja de ca l'Arana el 4.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant a l'espigó de Bac de Roda el 22.I (RRSB); (G).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 8.I (MCVA i XLBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Cubelles 6 exs. a la desembocadura del Foix el 9.II (XBGA); (N). Una femella el

26.III (XPCA); darrera citació prenupcial (F).

Sitges 3 exs. a la desembocadura de la riera de Ribes el 10.I (CGGA i MCMF); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Oxyura jamaicensis

Ànec de Jamaica

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. Cria principalment a l'oest d'Amèrica del Nord, les Antilles i l'oest d'Amèrica del Sud. Ha estat introduït a la Gran Bretanya.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 20.X (GBCA i MLMB); (G). No tramesa al CAC.

Oxyura leucocephala

Ànec capblanc

Estatus Accidental a Catalunya, tot i que els darrers anys el nombre de dades ha augmentat de forma significativa. Algunes dades homologades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. a la llacuna de Canal Vell el 4.X (JFOB); (G). No tramesa al CAC.

Lagopus muta

Perdiu blanca

Estatus Resident que nidifica de forma localitzada al Pirineu, amb evidències de petits moviments hivernals, tot i que no abandona el seu hàbitat natural per sobre dels 2.100-2.200 m d'altitud.

El 2008 ha estat un any excel·lent en quant a l'èxit reproductor de l'espècie es refereix, no tan sols a la zona pilot de seguiment

del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sinó a d'altres sectors dels Pirineus orientals (Puig Pedrós) i centrals (Parc Natural de l'Alt Pirineu). Manquen, però, dades fenològiques de reproducció. La dada de Certascan (au fugint pel vol d'helicòpter) remarca la previsible vulnerabilitat de l'espècie a pertorbacions de freqüentació durant l'hivern (època més sensible per als tetraònids).- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA

Barruera 2 parelles a la Pica Cerví el 26.X (JRSB); (E).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/**PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN**

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Durant la campanya de seguiment de l'èxit reproductor es localitzen 34 adults i 27 polls de 8 llocades (JCBC i VSEO); (E, R, N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira 5 adults entre Bassiets i el pic de la Bassera el 20.VIII (CRAA i PNAA); (E, N).

CERDANYA

Lles de Cerdanya Observat a l'estació d'esquí nòrdic d'Aranser el 21.I (DOAA); (E).

Meranges 2 mascles, una femella i 5 polls rescuts al Puig Pedrós el 28.VIII (LTBB); (E, R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 adults i 2 polls al Monteixo l'11.VIII (VJXA); (E, R). 1 ex. a 50 m del cim de la Pica d'Estats el 27.IX (JFXE i EMFA); (E).

Alt Àneu Una femella i 2 polls a Rocablanca el 9.VIII (JCBD); (E, R). 1 ex. al SOCC 272, Port de la Bonaigua, el 23.XII (JCBD); (E).

Lladorre Una femella, 4 polls i 1 ex. solitari als Plaus de Boldís el 16.VII (RCXD, JSXN i APXJ); (E, R). 2 adults a la Roca Ciga-

lera el 23.VII (MAXA); (E). 1 ex. i una quantitat important d'excrements a la cresta dels Guins de l'Ase el 28.VII (OBXA); (E). 1 ex. volant espantat pel vol de l'helicòpter a l'estany de Certascan, totalment ple de neu, el 28.XI (MGLA i NEXA); (E, B).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. al SOCC 269, Ulldeter, el 2.VI (OCVA); (E).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un niu amb restes d'un ou de l'any anterior a Arenho el 29.V (MAMA); (E, R). Un mascle a les pales d'Era Montanheta l'1.VI (XNPA); (E). Diverses observacions a Arenho: un mascle i una femella el 14.VI (MAMA); (E). Una femella el 22.VI (MAMA); (E). Un mascle, una femella i un tercer ex. sense sexar el 17.VIII (MAMA); (E).

Vielha e Migaran Un mascle a la collada de Varradós el 6.II (XNPA); (E).

Tetrao urogallus

Gall fer

Estatus Resident als boscos subalpins del Pirineu i Prepirineu, amb algunes evidències de moviments entre àrees per part de les femelles i joves de l'any. Tot i això, es tracta d'una espècie molt sedentària que no acostuma a moure's del territori durant l'hivern.

Contrasta l'escàs èxit reproductor del 2008 a l'alta conca de la Noguera Pallaresa (7 polls de 31 femelles) en comparació amb el de la perdiu blanca al mateix any i sector. Sembla evident que factors no meteorològics han de modelar també en part el reclutament del gall fer (com per exemple l'estat fisiològic de les femelles o la depredació, entre d'altres). Caldria una recerca específica al respecte. La resta de dades

confirmen patrons de distribució ja coneguts en l'espècie.- JCBC.

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò Es veuen rastres i 1 ex. al pic de les Mongetes, bosc del Tall, les Vigues i coll de Burbe entre el 23 i el 24.I (ABRA); (E). Una femella en una pineda de pi negre *Pinus uncinata* a Rubió el 26.VI (ALXF); (E).

PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ

Alta conca de la Noguera Pallaresa 31 femelles i 7 polls de 7 llocades entre el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant la campanya de seguiment de la reproducció (JCBC i VSEO); (E, R, N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Una femella al bosc de Virós, un mascle cantant a les 6:39 h i 2 mascles amb la cua oberta el 4.VI (MBXI i XGPB); (E, R).

Alt Àneu Rastres al bosc de la Mina a 1.859 m el 9.II (ABRA); (E). 2 exs. a Comabiera entre 1.900 i 2.000 m el 7.VI (JJXD); (E). Un mascle s'aixeca d'un arbre a 1.960 m i un altre mascle s'aixeca del terra a 2.020 m al serrat d'Escala Grau el 10.VI (JJXD i XGPB); (E).

Esterri de Cardós Un mascle jove en una zona boscosa a Fontfreda el 22.IX i un mascle que sembla adult a la mateixa localitat el 23.IX (CVPA); (E).

Llavorsí 1 ex. al SOCC 284, Port-Ainé, el 13 i el 30.V (JRSB); (E).

Rialp Observat al bosc dels Tres Comuns durant el mostreig de l'atles d'hivern el 24.I (APSA); (E).

RIPOLLÈS

Ribes de Fresser Una femella al camí forestal del refugi de Ribes Altes el 3.VIII (JRCD i SMMD); (E).

VAL D'ARAN

Naut Aran 4 mascles a Mont Romies el 20.X (MAMA); (E).

Vielha e Mijaran Un mascle a la Piusa l'1.V (MAMA); (E). 1 ex. al SOCC 402, plans d'Uishera, el 15.V (MBPX); (E). Una femella en vol a l'Artiga de Lin el 26.V (MAMA); (E).

Alectoris rufa

Perdiu roja

Estatus Resident i nidificant localment abundant per tot Catalunya, que es pot trobar en diversos ambients, des del nivell del mar fins a prop dels 2.000 m d'altitud. En moltes comarques no és gaire abundant a causa de l'abandonament dels cultius, l'augment de la massa forestal i l'excessiva pressió cinegètica.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=146).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=87).
Índex 2008=1,2

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 6 juvenils al camí entre cal Cassanyes i cal Cremat el 16.VI (PTEA); primers polls de l'any (R).



Perdix perdix

Perdiu xerra

Estatus Resident que nidifica de forma local al Pirineu i Prepirineu. Realitza moviments estacionals de caire altitudinal. Actualment és molt rara a la part oriental; més nombrosa, dins de la seva escassetat, a la porció occidental (especialment al Pallars).

El 2008 sembla haver estat un any regular en quant a la reproducció de la perdiu xerra es refereix, malgrat la informació és escassa. Destaca la observació del Pallars Jussà (Pleta Verda) on tot i tractar-se d'època hivernal (15.II) podria suggerir una reproducció en aquesta zona meridional del Prepirineu on l'espècie és francament escassa.- JCBC.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Durant la campanya de seguiment de l'èxit reproductor es localitzen 15 adults i 27 polls de 4 llocades (JCBC, VSEO, CRPC, CRPD i CRVA); (E, R, N).

ALT URGELL

Les Valls de Valira Observat a la collada de la Borda durant el mostreig de l'atles d'hivern el 25.I (APSA); (E). Un mascle cantant en una zona de rocams solells i pastures montanes a les bordes de Jussà el 25.VI (NEXA i PABB); (E, R).

Montferrer i Castellbó 2 exs. al SOCC 462, Aravell, el 12.XII (NTGA); (E).

BERGUEDÀ

Castellar de n'Hug 4 exs. al sud del coll de la Creueta i 8 exs. ja dalt del coll el 6.II (MBVA); (E).

CERDANYA

Alp Una parella amb 11 polls a la collada

de Toses al costat de les pistes d'esquí de la Molina el 23.VII (MGVA); (E, R).

Bellver de Cerdanya 1 ex. al pla de les Creus el 3.VIII (LCPA); (E).

GUILS DE CERDANYA Observat al Bac de la Comella durant el mostreig de l'atles d'hivern el 29.I i el 9.II (DOAA); (E).

Lles de Cerdanya 2 exs. al SOCC 324, estany de la Pera, el 8.I (DOAA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Uns 10 exs. en 3 grups diferents al bosc de la Pleta Verda el 15.II (FMSA); (E, N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 exs. a les bordes de Besan a 1.700 m el 6.IV (JRSB); (E).

Alt Àneu Un grup de 5 exs. sota el cim del pic de Muntanyol el 8.II (ABRA); (E). Una femella i 6-7 polls al serrat de Comabiera el 19.VII (PCXF i RBXB); (E, R). 3 exs. menjant nabius *Vaccinium myrtillus* a era Peülha el 28.IX (MAMA); (E, B).

Llavorsí 13 exs. al solà de Baiasca el 10.X (JPXF i MBXJ); (E, N). 2 exs. al collet dels Cortalets el 16.IV (RPXD); (E).

Sort 12 exs. al SOCC 380, estació d'esquí de Llesúí, el 20.XII (JRSB); (E, N).

RIPOLLÈS

Pardines 1 ex. al SOCC 120, Puigcerverís, el 22.VI (MARC); (E).

Setcases 1 ex. pujant al Costabona l'1.III (MGMD); (E).

VAL D'ARAN

Naut Aran 3 exs. a era Cabana el 22.I (MAMA); (E). 12-14 exs. a Moredo el 26.I (XNPA); (E, N). Diverses observacions a era Cabana: 4 exs. el 5.II (MAMA); (E). 1 ex. mort sota el telecadira, possiblement per col·lisió amb els cables, el 14.II (MAMA); (E, B). 1 ex. el 15.II (MAMA); (E). Un mascle i 2 exs. més el 22.II (MAMA); (E). Un mascle i una femella a Moredo el 7.VI

(MAMA); (E). Uns 20 exs. alimentant-se de nabius *Vaccinium myrtillus* el 26.IX (MAMA); (E, N, B). 10 exs. a Moredo el 17.X (MAMA); (E, N).

Vielha e Migaran 5 exs. a la collada de Varradós el 22.X (XNPA); (E).

Vilamós Un mascle, una femella i un grupet de 3 exs. a Uixera el 6.V (MAMA); (E).

Coturnix coturnix

Guatlla

Estatus Estival nidificant de forma regular i localment nombrós per tot el territori sempre i quan contingui hàbitats que li són adients (pastures i camps de conreu farratgers i cerealistes), entre el nivell del mar i fins i tot l'alta muntanya. Migrant regular per tot el territori. Hivernant rar.

Les citacions rebudes s'ajusten a la fenologia coneguda de l'espècie, tot i que la seva vida críptica, sobretot post-reproductora, fa molt difícil precisar quina és l'extensió real dels seus moviments. A Catalunya les primeres arribades es van produir a finals de març (el 26 de març a Figuerola del Camp) i, amb més intensitat i de forma més generalitzada, la primera quinzena d'abril. El pas de tardor s'inicià la segona quinzena d'agost i continuà al setembre i octubre. Les dades d'hivernada són molt escasses, a Catalunya i també a França (Mur 2009); tenint en compte que només els mesos de desembre, gener i febrer es consideren hivernada estricta, quatre de les citacions acompleixen el criteri. Encara que en poca abundància, es pot trobar l'espècie criant a alçades considerables (més de 1.500 m).- JRTB i MPOA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -16% (*, n=49).
Índex 2008=0,3

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. el 26.III (JRTB, MPOA i FSPB); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de mas Trencat el 29.XII (AOTA); citació hivernal (F).

ALT URGELL

Les Valls de Valira Un adult i almenys 2 polls al Bony de la Serena a 1.700 m el 25.VIII (NEXA i PABB); reproducció tardana i a gran altitud (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la platja de les Olles el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a can Morral el 31.III (MLMB); primera citació prenupcial (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 24.IX (FLSA); darrera citació post-nupcial (F).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. entre Llambilles i el Bugantó, prop de la Barceloneta, el 20.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primera citació prenupcial (F).

Sant Andreu Salou 4 exs. prop de la Torrepona el 24.IX (RMGA); darrera citació postnupcial (F).

Vilablareix 1 ex. caçat el 12.I i un altre el 15.I (SGVA); citacions hivernals (F).

OSONA

Gurb 1 ex. l'11.III (MMSA); primera citació prenupcial o citació hivernal o ex. d'origen domèstic (F).

Folgueroles 1 ex. prop dels Focs el 19.IV (MRFA) primera citació prenupcial segura (F).

PLA D'URGELL

Vila-sana 1 ex. el 6.IV (MBXL); primera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. alçant el vol a la collada de Varradós, a quasi 2.000 m el 30.VIII (MAMA); possible primera citació postnupcial (F, G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 12.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Phasianus colchicus**Faisà**

Estatus Resident introduït que nidifica de forma escassa per la Catalunya humida, tot i que és possible trobar individus en altres ambients més secs o de comarques més meridionals. Els patrons de distribució local poden variar molt segons les introduccions que es van fent i, de fet, les seves poblacions depenen en part de la gestió cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=43).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=37).
Índex 2008=0,5

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Un mascle a les vinyes de cal Corraler, i un altre mascle al puig de l'Àliga el 18.I (PTEA i JCRE); (G). Un mascle al fondo de la Bovera el 15.IV (FCFA); (G).

Gavia stellata**Calàbria petita**

Estatus Hivernant regular i migrant escàs, en unes poques àrees del litoral.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de can Comes el 16.XI (AOTA i JGMD); primera i única citació postnupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 2 exs. al Fangar el 8.I (DBCA); (E). 2 exs. al Trabucador el 9 i el 17.I (DBCA); (E). 1 ex. a la mateixa localitat el 27.I (ACTA, AMXK, BFXA i MMXL); (E). 2 exs. a la badia dels Alfacs el 24.II (JTOA i RSBB); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un adult a la platja del Prat l'1.I (RBVA); (E). Un juvenil a la platja del Remolar-Filipines el 7.I (RBVA); (E). 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 23.II (MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. posat al mar que surt en vol direcció sud el 8.I (FMVA); (E).
Pineda de Mar 1 ex. davant de la platja el 13 (EGGA i PBGA) i el 15.II (EGGA i OCVA); (E).

Gavia arctica**Calàbria agulla**

Estatus Hivernant i migrant regular, però escàs, en unes poques àrees del litoral. És la més comuna de les calàbries a Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 22 exs. el 14.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex, davant la platja de can Comes el 25.X (AOTA, GDBA i HMPA); primera citació postnupcial (E, F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. entre els Brancs i el far de Roses el 18.I (PFLB); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). Diverses observacions a la barra del Trabucador: 1 ex. el 9.I (DBCA); (E). 1 ex. el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 1 ex. el 29.XII (RBVA i SSXA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 17 exs. el 12-13.I (ABRA, JCXJ i DBRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

Torroella de Montgrí 1 ex. a la platja del Cul de les Senyores el 13.IV (JPCA); darrera citació prenupcial (E, F).

Gavia immer**Calàbria grossa**

Estatus Hivernant irregular i molt rar, que els darrers hiverns s'ha convertit en regular en àrees com el delta de l'Ebre, i més freqüent al tram de la costa del Barcelonès i el Maresme. Més rar a la resta de les àrees litorals.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Continua l'ex. detectat el 15.XII.2007 a les platges de Riells, Sant Pere Pescador i can Comes, fins el 19.I (AOTA i ALTA); (E). Continua un dels 2 exs. de 1r hivern detectats el 26.XII.2007 a les platges de Roses, fins el 12.I (AOTA i ALTA); (E). L'altre ex. continua al grau de Santa Margarida fins el 12.I (AOTA i ALTA); (E).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); darrera citació postnupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). Diverses observacions a la barra del Trabucador: 1 ex. el 9.I (DBCA); (E). 1 ex. el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 4 exs. el 29.XII (RBVA i SSXA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels 1 ex. a Port Ginesta el 13.XII (FMVA); (E).

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del Prat el 31.XII (XLBA i MGVA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 4.II (MGVA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. pescant vora el dic del port de Garraf el 13.XII (FMVA); (E).

MARESME

Pineda de Mar Observacions regulars d'entre 1 i 5 exs. entre el 12.I (FMVA, XRCA, DCFA, EBMA i EGXH) i el 12.III (EBMA); (E).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. davant els Salats i Muntanyans el 5.XII (AVDA i EBRC); primera citació postnupcial (E, F).

Tachybaptus ruficollis**Cabusset**

Estatus Resident comú als Països Catalans, distribuït de forma regular per les zones humides litorals i en embassaments de l'interior. Migrador i hivernant regular.

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 36 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 28 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 671 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro Una parella amb quatre petits, els quals probablement eren d'una segona posta ja que, al mateix estany, hi havia un juvenil completament plomat, a un dels estanys del golf Mas Nou el 8.VIII (JRGA i CACB); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 141 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 30 parelles nidificants al conjunt del delta (FLSA); (R).

GIRONÈS

Llagostera Una parella amb 3 polls a la bassa de la costa de l'Alou, Penedes, l'1.V (CACB); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. en una bassa de reg de terra al camí de Puigmaçana del 28.VIII a l'11.XI (JCCD i MVEB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 5-7 parelles nidificants (JEBAA); (R, N).

SELVA

Sils 4 parelles nidificants als estanys (ADGA i MGSAA); (N, R).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Un adult peixant un poll el 4.XI (FMVA); data tardana de cria (R).

Podiceps cristatus

Cabussó emplomallat

Estatus Resident i nidificant comú en algunes zones humides, com el delta de l'Ebre, i més escàs en altres zones com per ex. els aiguamolls de l'Empordà o l'embassament d'Utxesa. Comú en migració i hivernant en àrees on no nidifica.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=148).
Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 3 parelles (JMAA); (R).

ALT URGELL

Basella 51 exs. a l'embassament de Rialb el 18.I (MGMA, CMXA, JBAA i CRAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 819 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un adult amb 2 pollets de pocs dies a la llacuna de cal Tet el 28.V (FLSA i FSEB); primers polls de l'any (R). 6 parelles nidificants (FLSA); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 5.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a les Gambires el 30.IV (PVXD); darrera citació prenupcial (F).

Roda de Ter 1 ex. prop del nucli urbà el 20 i el 21.XI (MGBA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 96 exs. a l'embassament de Sant Antoni el 18 i 19.I (CRPC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 6-8 parelles nidificants (JEBa); (R, N).

Podiceps auritus**Cabussó orellut**

Estatus Molt rar com a migrador o hivernant, tot i que els darrers anys és de presència anual a Catalunya a l'hivern i es distribueix pel nord d'Europa fins a Sibèria i també a Amèrica del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als Alfacs el 17.I (DBCA i ACTA); (G). 3 exs. a la barra del Trabucador l'11.II (MRXG); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana de l'11 (RBVA, MCXE, EPXA, DMCA, XBXD, JSXM, ICXE, XCXB i CFXB) al 29.XII (RBVA); (G). Homologada pel CAC.

Podiceps nigricollis**Cabussó collnegre**

Estatus Resident en molt baix nombre en algunes zones humides, on pot nidificar. Més comú en migració, amb hivernants regulars en nombre sempre no gaire alt, tret del delta de l'Ebre.

Destaca la dada de reproducció probable a l'estany d'Ivars i Vila-sana on ja va nidificar amb èxit el 2006 (Estrada & Anton 2006), d'una espècie que, a Catalunya, cria de manera ocasional des de fa pocs anys (Estrada *et al* 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. entre s'Arenella de Port de la Selva i el Cau del Llop de Llançà el 24.I (ECFA); (G). 2 exs. a la badia de Port de la Selva el 8.II (PFLB); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un juvenil a l'estany del Cortalet el 13.VIII (JMAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. amb plomatge nupcial a la cua de l'embassament del Foix el 19 i el 20.III (CGGA i XBGA); única citació de l'any a l'espai (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 385 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. davant la punta de Garbí el 2.XI (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una parella als calaixos de depuració el 10.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). Diverses observacions a cal Tet: 1 ex. el 10.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 7 exs. el 13.XI (FLSA i SBXC); màxim anual (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una probable parella nidificant (JEBA); (R, N).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans del 23 al 26.VIII (AVDA i JVDA); primera citació postnupcial (F).

Vilallonga del Camp 1 ex. en una bassa de rec entre Vilallonga i Reus el 20.I (ACTA); (G).

Calonectris diomedea**Baldriga cendrosa**

Estatus A Catalunya té presència regular durant l'estiu, especialment en mar obert. També és abundant durant els passos migratoris. Accidental com a hivernant.

Aigües catalanes Observat a tota la costa catalana en una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus. Presenta abundàncies baixes al sud de Barcelona i al nord de Blanes. Concentracions màximes de fins a més de 250 exs. davant de Barcelona el 2.VI (PASA, JAPB i JPMC); (F, N).

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural de Cap de Creus Diverses observacions a la punta de cap de Creus: 2 exs. el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); primera citació prenupcial (F). 576 exs., dels quals 278 es troben sedimentats al capvespre el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i SOAA); màxim anual (N). 418 exs. en pas cap al sud el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); (N, B). 1 ex. en pas el 16.XI (JVSA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1.019 exs. en pas per la punta d'es Plom en 3 hores de seguiment el 6.IX (ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 40 exs. des de la platja de ca l'Arana el 18.V (XLBA); primera citació prenupcial (F). Uns 50 exs. des de la platja del Prat el 6.VII (RBVA); màxim anual (N). 21 exs. davant ca l'Arana l'1.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 993 exs. a la desembocadura de la Tordera en migració cap al sud durant 3 hores d'observació el 6.IX (MGVA); (N).

Puffinus griseus

Baldrigra grisa

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes dades homologades pel CAC. Cria a l'extrem sud de Sud-amèrica, a l'àrea de Nova Zelanda, i al sud-est d'Àustràlia. Migra cap al nord de l'Atlàntic i, sobretot, al nord del Pacífic; es pot observar a les costes de l'oest d'Europa a finals de l'estiu.

La citació d'un exemplar el mateix dia, en dues localitats que disten entre si en línia recta poc més de 40 km, amb dues hores de diferència entre les dues observacions i en vol cap al sud, fan suposar que es pugui tractar del mateix individu.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en vol cap a les 17:11 h al sud per la punta de cap de Creus el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA, SJJA i SOAA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en vol per la punta d'es Plom a les 19:11 h el 5.VII (ABRA); (G). No tramesa al CAC.

Puffinus mauretanicus

Baldrigra balear

Estatus A Catalunya és un migrador i hivernant comú, que pot formar concentracions d'uns quants milers d'individus en alguns punts de la costa en especial a la meitat meridional; més escàs a l'estiu.

Les observacions de 2008 mostren novament un clar predomini de la presència hivernal de l'espècie, que pot presentar concentracions importants al llarg de la costa catalana, sigui al delta de l'Ebre, litoral barceloní, o a l'Empordà, on enguany

s'han observat concentracions de prop de 2.000 exs. a finals de tardor. L'espècie esdevé molt més escassa després del pas prenupcial i fins ben entrada la tardor arreu del litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes Observat a tota la costa catalana en una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus. Esdevé escàs al nord de Barcelona amb un màxim de 15-20 exs. al golf de Roses el 3.VI i presenta les màximes abundàncies entre Tarragona i Barcelona amb un màxim de més de 400 exs. davant de Barcelona l'1.VI (PASA, JAPB i JPMA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 14.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural de Cap de Creus 52 exs. els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions la punta de cap de Creus: 600 exs. en pas el 12.IV (OCVA); màxim prenupcial (N). 1.843 exs. en pas, majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores d'observació l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSb); màxim postnupcial (N). 1.118 exs. en pas el 14.XII (PFLB i JVSA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 50 exs. al litoral el 6.I (RGA i ELXE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 500-700 exs. al Trabuador el 2.II (JTOA, RSB i CJMA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Uns 300 exs. davant la punta de Garbí en 5 minuts d'observació el 3.V (CACB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 124 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 150 exs. davant la platja del Prat el 2.II (XLBA); màxim anual (N).

MARESME

Arenys de Mar 456 exs. al port el 18.I (PJMB, MBBB, JBXN, SBXE, AVXD i IJVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Salou 1.200 exs. al cap de Salou el 9.II (PJAA); (N).

Tarragona 61 exs. al port el 6.I (ACTA, MPSA, AMOB i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Vila-seca 270 exs. a la Pineda el 6.I (ACTA i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Puffinus yelkouan**Baldriga mediterrània**

Estatus Presència regular tot l'any, malgrat que no cria a Catalunya. Força més escassa que *Puffinus mauretanicus*. És més regular cap a la costa nord i a finals de primavera.

L'espècie presenta un patró geogràfic que fa palesa novament la seva freqüència al nord del país, especialment al litoral empordanès, on és particularment abundant entre octubre i maig, i on enguany s'hi han donat concentracions rècord de més de 12.000 exemplars en una tarda de recompte. A mesura que ens desplaçem cap al sud, l'espècie esdevé més escassa, per bé que enguany trobem concentracions, sobretot a l'hivern, al litoral del Maresme. Cal destacar un dels primers registres per les comarques interiors de Catalunya, en concret un exemplar aparegut mort al riu Ter a Girona, després d'uns dies de llevantades.- PFLB.

Aigües catalanes Present amb seguretat a la franja litoral des de Barcelona cap al nord amb abundàncies que oscil·len entre més de 5 exs. a Barcelona l'1.VI i 30-35 exs. a la badia de Roses el 3.VI, durant el decurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA, JAPB i JPMA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 493 exs. els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2.400 exs. en direcció a cap Gros des de la costa de la Marenda el 17.X (MBFA); (N). Diverses observacions a la punta de cap de Creus: 12.067 exs. en pas, majoritàriament cap al sud, al llarg de 6 hores d'observació l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ); 3.347 exs. en pas el 14.XII (PFLB i JVSA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 132 exs. el 12.I (MDSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la platja del Prat el 14.VIII (RBVA); màxim anual (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. trobat mort al riu, probablement arrossegat terra endins per la forta llevantada de dies anteriors, el 12.V (ARVA, JVLA i JBPC); (B, G).

MARESME

Pineda de Mar 810 exs. al port el 18.I (XRCA, FMVA, EBMA, DCFA i XLBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a punta Cavalls el 6.I (ACTA i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G). 1 ex. al cap de Salou el 4.V (ACTA i MPSA); (G).

Torredembarra 6 exs. als Salats i Muntanyans el 12.I (PASA, RFSA, XLBA, DMXB, AMXL, EQXA, RSLA, AVDA i JVDA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G).

Vila-seca 5 exs. a la Pineda el 6.I (ACTA i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G).

Hydrobates pelagicus

Ocell de tempesta

Estatus Regular fora del període hivernal. Comú a alta mar, però molt més rar a prop de la costa, tot i que localment no és tan rar a l'estiu (per ex. illes Formigues o illes Medes). Rar a l'hivern.

Aigües catalanes Durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus, s'observen un mínim de 2 exs. davant de Barcelona l'1.VI i de 2 exs. al canó de Blanes el 2.VI (PASA); (E, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA i ALTA); (E). 1 ex. als voltants de cap de Creus el 26.IV (JMAA, TMJA, ABRA, AOTA i ALTA); (E). 5 exs. a 3 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 7.V (GGXB i ALXE); (E). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); (E). 3 exs. a l'est de cap de Creus el 20.V (GGXB i ALXE); (E). Es controlen les 20 caixes-niu col·locades l'any 2006 a l'Encalladora, de les quals se'n recuperen només 9 sense cap indicati de reproducció, i se'n col·loquen 30 de noves el 5.XI (PFLB, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA); (E, R).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per davant cap sa Sal el 10.V (ABRA); (E). Diverses observacions davant la punta d'es Plom: 1 ex. el 5.VII

(ABRA); (E). 1 ex. el 4.X (AOTA, ABRA, PSGA, AROA i BMBA); darrera citació postnupcial (E, F).

Illes Medes 12 exs. anellats els dies 12 i 13.VI (RGBA, FLSA i ARMCI); (E, N).

Palamós. 1 ex. en vol cap a NE davant la punta del Molí l'11.IV (MDSA); primera citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mirador de cal Francès el 2.V (MGVA); (E). 1 ex. davant de l'Arana el 5.VII (XLBA); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant de la desembocadura del Besòs el 31.V (XLBA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 20 exs. seguint un palanquer entre les 7:00 i les 12:00 h el 3.VII (EBMA); (E, N).

El Masnou 1 ex. el 27.V (APSA); (E).

Malgrat de Mar 5 exs. al davant de la desembocadura de la Tordera el 7.VI (FMVA); (E).

Mataró 4 exs. a 3-4 milles nàutiques de la costa el 29.VI (EBMA i EGXH); (E). 4 exs. mudant les primàries internes al calador de lluc el Filant el 25.VIII (EBMA); (E).

Morus bassanus

Mascarell

Estatus Comú en migració i a l'hivern. Molt més rar entre juny i setembre, quan alguns immadurs poden romandre a les nostres costes.

Aigües catalanes 2 exs. de 2n any davant de Tarragona el 30.V durant una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA); (E, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 223 exs. els dies 12 i 20.I (PFLB, MSFB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la punta de cap de Creus: 370 exs. en pas el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD); màxim anual (N). 3 exs. a l'est el 14.VI (GBCA, PGGA, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB); citació estival (F). 10 exs. de 1r i 2n any el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA i SJJA); citació estival (F). 3 exs. el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC); citació estival (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la platja del Cul de les Senyores l'1.VI (JPCA); citació estival (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. des de la platja de ca l'Arana el 19.VI (FLSA); citació estival (F). 9 exs. davant de l'Arana el 5.VII (XLBA); màxim estival (N). 1 ex. des de la platja del Prat el 6.VII (RBVA); citació estival (F). 35 exs. aturats a la mateixa platja el 9.XI (RBVA); (N, B).

BARCELONÈS

Barcelona 50 exs. al port entre l'11 i el 12.I (RGBA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Sitges 18 subadults en 3 hores d'observació davant el port de Garraf el 5.VII (FMVA); citació estival (F, N).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 26.V (EBMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. l'1.VIII (FMVA); citació estival (F). **Mataró** 2 immadurs a alta mar el 29.VI (EBMA); citació estival (F).

Pineda de Mar 40 exs. als entorns de l'emissari submarí el 22.I (EBMA); màxim prenupcial (N).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses observacions als Salats i Muntanyans: 9 exs. el 12.I (PASA, RFSa, XLBA, DMXB, AMXL, EQXA, , RSLA, AVDA i JVDA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 29.V (CGGA i XBGA); darrera citació prenupcial (F).

Phalacrocorax carbo**Corb marí gros**

Estatus *P. c. carbo* probablement accidental, tot i que calen més dades per a precisar-ne l'estatus. Recentment algunes dades a Osona indiquen que la seva presència pot ser més freqüent del que se suposa. Aquesta subespècie cria des de l'est del Canadà i Groenlàndia fins a Islàndia, Noruega i les Illes Britàniques. A l'hivern, arriba fins a la costa nord de la península Ibèrica. *P. c. sinensis* comú en migració i a l'hivern. Més rar a l'estiu, quan escassos exemplars poden romandre en algunes zones humides com els aiguamolls de l'Empordà, o el delta de l'Ebre. Caldria una revisió de les úniques dades de cria publicades, de les illes Medes, doncs hi ha dubtes raonables que hagi nidificat en aquest indret.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 621 exs. al dormidor el 18.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 6.V (PTEA i JCRE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. els dies 3, 16 i 23.VI (PTEA); citacions estivals (F). 749 exs. el 17.XII (CGGA, XBGA i HSCA); màxim anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.623 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. anellat a Dinamarca el 2001, s'observa a la zona per tercer hivern consecutiu, el 10.II (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 587 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. a cal Tet el 9.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a ca l'Arana durant el mes de juny (FLSA); individus estiuejants (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 30.VII (RPEA); primera citació postnupcial (F).

Vilanova de Sau 2 immadurs ajocats a l'embassament de Sau el 31.V (JAIA i GACA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany el 7.VIII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 29.IV (JEBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 22.VII (JEBA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 20.VI (PJAA); citació estival (F). 2 exs. el 6.VIII (PJAA); primera citació postnupcial (F).

Flix 1.326 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 12.I (PJMB, MBBB, JBXN, SBXE, AVXD i IJVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Riba-roja d'Ebre Un adult a l'embassament el 6 i el 9.VI (RBVA); citació estival (F).

Phalacrocorax aristotelis**Corb marí emplomallat**

Estatus Resident i nidificant en baix nombre en algunes àrees del litoral: Alt i Baix Empordà, Selva, Garraf i a parts de la costa tarragonina, on no hi nidifica però hi és estiuejant. Fora de les àrees on pot nidificar és escàs en el període migratori, i s'observa principalment quan els joves es dispersen (a partir de juny).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 14.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural de Cap de Creus 2-3 parelles nidificants (PFLB); (R). 15 exs. els dies 12 i 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 adults i 2 polls de l'any al niu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); primers polls de l'any (R). 96 exs., bona part dels quals són joves, a l'ajocador de l'illa Messina el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSJA); màxim històric documentat al parc natural (N).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. a la punta Pixerota el 2.VII (PJAA); (N).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 3 exs. el 20.VII (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a la punta de la Banya: un juvenil i un adult el 22.V (JTOA i RSBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a el Perelló el 7.VII (RGBA i HAXA); darrera citació de l'any (F).

BAIX EMPORDÀ

28-29 parelles nidificants a la comarca (RGBA); (R).

Sant Feliu de Guíxols Diverses observa-

cions a la cala del Vigatà: aquest any no hi ha criat (CACB); (R). 24 exs. el 8.IX (CACB); xifra rècord documentada a la zona (N). Almenys un adult dins el niu el 27.XII (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 2.II (XLBA); primera citació de l'any (F). 1 ex. de 1r estiu a la gola de la riera de sant Climent l'11.VI (FLSA i FSEB); primera citació postnupcial segura (F). 1 ex. davant de ca l'Arana l'1.XI (XLBA); darrera citació de l'any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. davant de la desembocadura del Besòs el 24.XII (XLBA); (G).

GARRAF

Sitges Màxim de 44 exs. als voltants del port de Garraf el 18.V (FMVA); màxim anual (N).

MARESME

Calella 22 exs. a Roca Grossa el 9.XI (EBMA); (N).

TARRAGONÈS

Salou 6 exs. al cap de Salou el 12.VIII (PJAA); màxim observat (N).

Pelecanus onocrotalus

Pelicà vulgar

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. La seva distribució, discontinua, s'estén pel centre d'Euràsia i per l'Àfrica al sud del Sàhara, així com en algunes localitats al nord-est de l'Índia i al sud del Vietnam.

Les citacions que es publiquen corresponen totes a un mateix exemplar que es va

anar observant en companyia de grups de cigonyes migrants des d'Alemanya, Suïssa i França, fins a Catalunya on va passar l'hivern.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un adult als estanys del Matà i del Cortalet del 13 al 29.IX (JBCA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Pedret i Marçà Un adult a l'abocador els dies 18 i 22.IX (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

SEGRÀ

Lleida Un adult a la bassa del CRFS de Vallcalent el 10 (CSXD) i el 29.X (MGMA); (G). No tramesa al CAC.

Montoliu de Lleida Un adult a l'abocador comarcal en companyia de grups de cigonya blanca *Ciconia ciconia* del 15.X a finals d'any (RGMB); (G). No tramesa al CAC.

Botaurus stellaris

Bitó

Estatus Nidificant escassíssim i molt localitzat als aiguamolls de l'Empordà i al delta de l'Ebre. Hivernant regular en algunes zones humides com el delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà, i molt més escàs a altres zones humides, com el delta del Llobregat. Irregular a la resta de zones. En migració és regular, però escàs, en zones amb hàbitat adequat (per ex. aiguamolls de l'Empordà), i molt irregular a la resta.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). Un mascle cantant a l'estany de Palau el 3.III (ABRA); primera dada de

cant (E, R). 2 mascles defensant territori a un canyissar del parc natural (ABRA); (E, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Riet Vell entre el 12.I (AAXC) i el 29.III (JBAB, ISSB i CJMA); (E). 1 ex. a Canal Vell el 14.I (ISSB, YBSA, CDBA i CJMA); (E). 1 ex. a l'Alfacada el 17.III (JBGC i OCVA); (E). 2 exs. a Canal Vell el 22.III (JFBB); (E). 1 ex. a l'Alfacada l'1.IV (JBGC); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a Riet Vell el 19.X (CJMA); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. a l'Encanyissada el 8 i el 9.XI (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. al canyissar del Remolar l'11.II (PBGA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a cal Roc el 29.IX (PEGA); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. sobre cal Tet el 5.X (JJMB); (E). 1 ex. al costat de l'estació biològica del Remolar el 20.X (PBGA); (E). 1 ex. als calaixos de depuració el 12.XI (FLSA); (E). 1 ex. a cal Tet el 24.XI (FLSA); (E). 1 ex. a la maresma del Remolar el 29.XI (MMXK i STXB); (E). 1 ex. a cal Tet el 3.XII (CFXB); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 19.XII (XLBA); (E, G).

RIBERA D'EBRE

Flix Diverses observacions a la llacuna de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. el 12.I (PJMB, MBBB, JBXN, SBXE, AVXD i IJVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. entre el 13.I i el 24.II (PJMB); (E). 2 exs. el 20.III (PJMB); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. l'1.XI (PJMB); primera citació postnupcial (E, F). A par-

tir d'aquesta data, observacions regulars d'l-2 exs. fins a finals d'any (JBGC i PJMB); (E).

SELVA

Sils 1 ex. sentit als estanys el 17.V (ADGA); (E).

Ixobrychus minutus

Martinet menut

Estatus Estival nidificant regular, especialment comú al delta de l'Ebre. Migrador regular, però força rar a les zones on no nidifica. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle amb l'ala trencada resta als estanys del Matà durant el mes de gener (JMAA); citació hivernal (F). Població nidificant avaluada en 7 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Canal Vell el 22.III (JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als calaixos de depuració el 13.III (FLSA i CFXB); possible primera citació prenupcial (F). Mínim d'11 parelles nidificants al conjunt del delta (FLSA); (R). 1 ex. a la Vidala el 18.XI (FLSA); possible darrera citació postnupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel l'1.XII (ARMC); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 18.V (XLBA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a illa de Ter el 4.IV (CPVA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a l'aigua-barreig Ter-Sorreig el 17.V (MGBA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una parella nidificant (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 17.XI (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. a la làmina d'aigua del Ripoll al barri de can Puiggener el 20.IV (PMBE); (G).

Nycticorax nycticorax**Martinet de nit**

Estatus Estival nidificant regular, especialment comú al delta de l'Ebre, i amb alguns nuclis petits tant en punts del litoral (delta del Llobregat, irregular) o de l'interior (per ex. Osona). Migrador regular. Hivernant molt escàs.

Al 2008 cal destacar les dades de reproducció a Sils que aporten una nova zona de cria a Catalunya. Aquest nucli es coneix des de 2006 (Delgado 2006), si bé, és el primer any que se n'han rebut dades a l'anyuari.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 13 exs. al riu Fluvià el 4.II (JMAA); citació hivernal o primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Presència regular d'un adult durant els mesos de juliol i agost al riu Foix, a l'entrada de l'Hort del Rec-



tor (PTEA, JCRE, FCFA i PARA); citació estival (F). Un adult i un juvenil a l'embassament del Foix el 28.X (XPCA); darrera citació de l'any (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 363 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro Un immadur als estanys de les Escoles el 17.V (CACB); darrera citació prenupcial (F).

Illes Medes 146 nius a la colònia de la Meda Gran (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 65 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una possible parella nidificant al Remolar (FLSA); (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 12.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Ter a Malars el 15.III (MRFA); primera citació prenupcial (F).

Les Masies de Voltregà Un mínim de 98 parelles nidificants a la colònia d'ardeids

del Ter (MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R).

PALLARS SOBIRÀ

Tírvia 1 ex. a la Noguera de Cardós a l'altura de Terveu el 15.IV (JGCC); (G).

PLA DE L'ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. vist des del cotxe al pont de ses Serres al riu Terri, Ravós del Terri, el 25.VII (APXE, IAXA i IPXA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.IV (AVPA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 2 adults i un jove a la llacuna permanent, provinents dels 3 ponts on s'hi ha reproduït, el 20.VI (ADGA i MGSA); nou quadrat UTM 10×10 de reproducció segura (GR). 1 ex. el 4.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Un juvenil o immatur en una bassa el 17.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Ardeola ralloides

Martinet ros

Estatus Nidificant regular en bon nombre al delta de l'Ebre, únic lloc de nidificació regular a Catalunya. Molt més escàs o irregular a altres colònies d'ardeids, com per exemple a les illes Medes. Migrant escàs fora dels llocs regulars de cria, especialment a la primavera. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 3.IV

(ABRA i JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'em-bassament del Foix el 12.V (PTEA i PARA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al pont del Través, l'Encanyis-sada, el 19.I (XTGA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Un niu a la colònia de la Meda Gran (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Almenys 3 exs. no reproductors al Remolar i a ca l'Arana durant tot el mes de juny (FLSA); citacions estivals (F). Diverses observacions a cal Tet: 25 exs. el 3.IX (RBVA); màxim anual (N). 1 ex. el 20.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar l'1.VI (RRSB); citació estival (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 18.VI (XLBA, DMCA i MCXE); citació estival (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 10.IV (PABA); primera citació prenupcial (F). 5 exs. l'1.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espadamala el 31.III (JCRC i MRFA); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Un adult a la reserva de l'illa de Fares el 19.V (SCIA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'1.VI (DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHÀ, MFSA, AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA); darrera citació prenupcial o citació estival (F).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp-Massalcoreig-Serós 3 nius a l'illa dels Martinets el 12.VI (MGTA, JCMG, MGMA i JGGD); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

Lleida 1 ex. al riu Segre a la Mitjana el 13.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a la llacuna permanent el 20.VI (ADGA i MGSA); citació estival (F). 1 ex. als estanys el 25.IX (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 5 exs. als Salats i Muntanyans el 20.VIII (AVDA i JVDA); primera citació postnupcial (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a la bassa del Gurugú el 30.IV (XLBA); (G). 1 ex. a la bassa de can Cabanyes el 3.V (CODA i RAPA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Un juvenil al riu Besòs el 10.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F, G).

Bubulcus ibis**Esplugabous**

Estatus Resident i nidificant localment abundant. Migrador i hivernant en àrees on no nidifica. En expansió a l'actualitat, amb observacions cada vegada més habituals en punts on fa anys era més rar.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=76).
Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.654 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 672 nius a la colònia de la Meda Gran (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 921 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un poll sortit de l'ou a la colònia del parc zoològic el 15.III (JGGD); primera dada d'eclosió (R). 2 polls demanant menjar al niu el 3.X (JGGD); citació tardana de cria (R).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. en uns camps a l'entrada de la població el 7.IV (JGPB); (G).

GIRONÈS

Girona 1.098 exs. a Fontajau el 12.I (GDBA, JFPB, HMPA, CPVA, JRBB, NRCA i ENEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sant Gregori 1 ex. a Cartellà el 29.VIII (PFLB i ARVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 14 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (N, GR).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 16.V (CFQA i JBVB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1.400 exs. el 9.IX i el 4, 7 i 21.X (JEBA, VPRA, MLMB i ERVA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Lleida 1.397 exs. al dormidor dels aiguamolls de Rufeia el 18.I (FMSA); (N).

Egretta gularis × *Egretta garzetta*

Martinet dels esculls × Martinet blanc

La citació del Remolar correspon probablement al mateix exemplar localitzat pocs dies abans a Barcelona (López 2008b) que després es torna a observar a diferents punts del riu Besòs i que, possiblement, es va moure entre aquestes tres àrees.-MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als arrossars entre Amposta i la Casa de Fusta el 8.I (ISSB, MHHA, NSSB i CJMA); primera observació de l'any (M). 1 ex. a les salines de Sant Antoni el 29.XII (RBVA i SXXA); darrera observació de l'any (M). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar entre el 20.VI (JBOL i PBGA) i

el 24.VIII (JCMC i SMXA); (M). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. que es mou entre la colònia d'ardeids del parc zoològic i el parc de Diagonal Mar entre el 15.V (JGGD) i el 12.VIII (RRSB); (M). Es torna a veure debilitat al parc zoològic el 29.VIII (JGGD); (M). No tramesa al CAC.

Santa Coloma de Gramenet 1 ex., probablement el mateix de la citació anterior, volant riu Besòs amunt el 18.VIII (XLBA); (M). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs entre el 15 i el 20.VIII (FMVA); (G). No tramesa al CAC.

Egretta garzetta

Martinet blanc

Estatus Resident i nidificant localment abundant al delta de l'Ebre, i amb petits nuclis a les illes Medes i el parc zoològic de Barcelona, amb episodis de cria irregulars en altres llocs. Migrador regular i hivernant escàs en àrees on no nidifica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=50).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=24).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. en pas per davant de cap de Creus el 5.IV (GGXB i ALXE); primera citació prenupcial (F). 7 exs. en pas cap al sud des de Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus el 19.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, ARGC i CFLA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Diverses observacions al riu Segre: 1 ex. el 12.III (JNVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.V (JNVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.312 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 36 nius a la colònia de la Meda Gran (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

BARCELONÈS

Barcelona Un poll sortit de l'ou a la colònia del parc zoològic el 6.III (JGGD); primera dada d'eclosió (R).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l'estany de Graugés entre el 10 i el 31.XII (PABB); citació hivernal en una comarca sense dades anteriors en aquest període (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 15-17 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFA, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R). Ajocador mixt amb esplugabous *Bubulcus ibis* amb un mínim de 98 exs., els quals la majoria són martinets blancs *Egretta garzetta*, a Espadamala el 9.VIII (MRFA); màxim anual (N).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. a la mollera d'Escalarre el 30.IV (JCBC); darrera citació prenupcial (F).

Sort 1 ex. a la verna de Montardit el 30.IV (JCBC); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 8.IV (JEBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.XI (JEBA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 42 exs. als Salats i Muntanyans el 20.VIII (AVDA i JVDA); (N).

Casmerodius albus**Agró blanc**

Estatus Nidificant recent amb una població incipient i petita al delta de l'Ebre. Migrador i hivernant regular en baix nombre al delta de l'Ebre. També és migrador i hivernant, darrerament més regular, als aiguamolls de l'Empordà, al delta del Llobregat i a altres zones humides, tant litorals com de l'interior.

Al 2008 s'han tornat a rebre moltíssimes citacions d'agró blanc. Durant el període hivernal les dades es concentren al delta de l'Ebre, que torna a assolir el seu màxim històric als censos d'ocells aquàtics hivernants, així com al llarg dels principals cursos fluvials, on s'ha citat al Ter, Fluvià, Llobregat, Besòs, Francolí, Noguera Pallaresa, Segre i Ebre. Els nombres màxims als censos d'ocells aquàtics hivernants fora del delta de l'Ebre s'han donat a l'aiguabarreig Segre-Cinca i al Ter a Osona. També s'han produït força citacions estivals d'entre les quals destaquen les dades de cria probable a Flix i l'aiguabarreig Segre-Cinca, possible a Utxesa i la presència regular d'1-2 exs. a prop de la colònia d'ardeids d'Osona, fets que permeten suposar que aviat es podria localitzar alguna parella nidificant fora del delta de l'Ebre.-MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del riu Foix: 2 exs. posats en pins al marge dret davant de la caseta d'en Segura el 2.V (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 20.VII (PTEA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 20.X (XPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 482 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 6 exs. als arrossars el 20.X (ABRA); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 12.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a la maresma del Remolar i cal Tet entre 13.IV (MMXK i IVXA) i el 28.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a la bassa dels Pollancrel el 15.VII (RMXH); primera citació postnupcial (F). 6 exs. a la maresma del Remolar el 30.VII (RMXH i FPXA) i el 29.IX (MGVA); màxim anual (N). 2 exs. a cal Tet el 20.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F). 2 exs. a cal Tet el 19.XII (RBVA); citació hivernal (F).

Sant Andreu de la Barca 3 exs. al riu Llobregat el 19.I (VSSA, JCRD, ECGC, MSA, RAGA, MLMB, XLBA, SXXC, JSZA i AGXJ); màxim anual al riu i citació hivernal (N, F).

GARROTXA

Olot 4 exs. a la joca del Parc Nou el 19.III (FTCA); màxim anual (N).

Sant Ferriol 4 exs. a l'illa de Fares el 19.I (JNFE i RCXC); màxim anual (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà Observacions regulars d'entre 1 i 2 exs. al Ter a Gallifa, les Gambires i Espadamala els mesos de juny, juliol i agost (MRFA, JCR, JPRA, RJNA, JEP, JAIA i MGBA); citacions estivals (F).

Manlleu 9 exs. a l'ajocador de la Devesa l'11.I (MRFA); màxim prenupcial (F). 14 exs al Ter a l'embarcador el 15.XII (NSXC, MORA i CGXH); record comarcal (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al bosc de ribera de la Noguera Pallaresa a l'alçada de Vilamitjana el 10.XII (JCCD i MVEB); citació hivernal (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. volant sobre el pla de Martís i Espolla direcció al Fluvià el 10.V (JBVB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 9.III (MPOA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 6.VI (JEBJA); citació estival (F). 10 exs. el 28.IX (ERVA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Ascó 2-3 exs. entre l'aiguabarreig del Siurana amb l'Ebre i el meandre de Flix entre el 16.III i el 20.VI (PJAA i LJAA); (G, F).

Flix 2 exs. posant branques sobre d'un salze blanc *Salix alba* a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 14.VI (PJMB); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp Observacions de pares nupcials i exs. juvenils durant la temporada de cria a l'aiguabarreig Segre-Cinca, sense que se'n pugui confirmar amb seguretat la reproducció (JBGC); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Torres de Segre 20 exs. al riu Segre el 18-19.I (CRSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. entre la colònia d'ardeids de l'embassament d'Utxesa el 13.V (JGGD); (F, R).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 8.III (JVLA); primera citació prenupcial (F). Presència regular entre març i agost amb un màxim de 8 exs. el 19.III (DCFB); (N, F). 1 ex. el 25.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al riu Francolí el 22.XI (VPRA); (G).

Vila-seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 23.VIII (CAFA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. a can Riba de la Serra Alta el 23.III (FMVA); (G, F).

Ardea cinerea

Bernat pescaire

Estatus Resident comú a tot el país al llarg de tot l'any, amb migradors i hivernants regulars. Nidificant regular, als deltes de l'Ebre i del Llobregat i en algunes àrees de l'interior com el Pallars Jussà, el Bages, el Segrià i al recinte del parc zoològic de la ciutat de Barcelona.

A falta de les dades de l'Encanyissada al delta de l'Ebre (on es fan censos d'ardeids cada quatre anys), el creixement general de la població reproductora catalana ha estat discret. S'ha constatat un increment a cinc colònies, especialment a Sant Llorenç de Montgai que es recupera de la davallada patida l'any 2007. Cal destacar també el nucli reproductor de la punta de



la Banya que, de mantenir aquesta dinàmica, s'espera que es consolidi com a colònia (segona pel delta de l'Ebre), i el Sot del Fuster que es pot considerar de manera segura la novena colònia establerta a Catalunya. L'intent fallit de cria a Flix, amb un hàbitat idoni, no deixa de ser, malgrat tot, una bona notícia. La resta de dades fenològiques es mantenen dins del patró típic per a l'espècie a terres catalanes. Juntament amb el delta de l'Ebre, Oliana es consolida com a destacat centre d'hivernada.-JGGD.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=91).

Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 15% (*, n=56).

Índex 2008=2,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA); primera citació prenupcial (F). 5 exs. en pas cap al nord pel coll de Sant Genís el 4.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. en pas de nit cap a la

costa nord de cap de Creus des de Grifeu el dia 16.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a Punta Falconera el 5.XI (PFLB, DXXA, TMJA, RGBA, GGXB, ALXE i AOTA); darrera citació postnupcial (F).

Rabós 3 exs. en direcció nord el 8.III (MBFA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Oliana 428 exs. a l'embassament el 18.I (CRAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAGES

El pont de Vilomara i Rocafort-Sant Vicenç de Castellet Almenys 45-50 parelles nidificants (MGMA i SAAA); (N, R)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.738 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 parelles nidificants a la punta de la Banya (CDBA, FVEA/PDEA i JGGD); (N, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 75 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 parelles segures i 2 possibles al Remolar (FLSA i JGGD); (R).

BARCELONÈS

Barcelona Un poll sortit de l'ou a la colònia del parc zoològic el 14.II (JGGD); primera dada d'eclosió (R). 120 parelles nidificants (JGGD); (N, R).

NOGUERA

Sant Llorenç de Montgai 56 parelles nidificants a l'embassament (JBSA i JGGD); (N, R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 22 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFA,

JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 75 exs. el 2.III (GBCA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Flix Troballa d'un niu en un arbre sec a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 8.VI que s'abandona el 23.VI (PJMB); (R).

SEGRIÀ

Torres de Segre 93 parelles nidificants a l'embassament d'Utxesa (JBSA i JGGD); (N, R).

Vilanova de la Barca 11 parelles nidificants al Sot del Fuster (JBSA, JEBA i JGGD); (N, R).

Ardea purpurea

Agrò roig

Estatus Estival i nidificant localitzat en les principals zones humides, especialment comú al delta de l'Ebre. Migrador regular però escàs, amb ocasionals exemplars estiuuejants no reproductors en alguns casos, a la resta del territori. Hivernant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 37 parelles (JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix l'11.VI (XPCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 24.V (CACB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions als calaixos de depuració: 1 ex. el 16.I (FLSA); citació hivernal (F). 1 ex. el 26.XI i el 10.XII (FLSA); citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 17.XI (MCVA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Tortellà 1 ex. el 18.III (SCIA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 7 exs. en migració activa cap al nord el 17.IX (PFLB, PFSA i MSFB); (N, B).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espadamala el 4.IV (PVXD); primera citació prenupcial (F).

Torelló 1 ex. al Ter el 20.VI (RACA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. pescant granes a la mollera d'Escalarre el 5.V (EVAA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2-3 parelles nidificants (JEBÀ); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 8.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

Flix Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: nidificació de 25-30 parelles (PJMB); (R, N). 1

ex. el 20.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

Ginestar Nova localitat de cria en un canyissar amb 2-3 parelles; els nius es perden a causa de la pluja i la crescuda del nivell de l'aigua (PJMB); (R).

SEGRIÀ

Lleida 3 exs. volant sobre el CRFS de Vallcalent el 16.III (CPBA); primera citació prenupcial (F).

Torres de Segre Diverses observacions a l'embassament d'Utxesa: 1 ex. el 16.III (AGXG); primera citació prenupcial (F). 70 parelles nidificants (JGGD); (R, N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IX (FRRA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a l'espai Riberes del Congost el 15.III (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Ciconia nigra

Cigonya negra

Estatus Migrador regular però escàs, més comú al pas de tardor que al primaveral. Hivernant excepcional.

Al 2008 s'ha rebut un total de 56 citacions repartides en 20 comarques que comptabilitzen un total de 68 exemplars. Totes elles s'han produït durant els pasos migratoris. Curiosament les primeres i darreres citacions en ambdós passos han resultat força extremes amb dades al mes de febrer, juny, juliol i novembre, mesos poc habituals en la migració de la cigonya negra a Catalunya (Ferrer *et al.* 1986). Cal destacar també la citació de la Segarra amb 9 exemplars junts, que constitueix el grup més gran documentat en l'Anuari d'Ornitologia de

Catalunya i, possiblement el major que s'ha-gist vist mai al nostre país.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 1 ex. a Lliurona el 24.II (GJPA i ILXB); (F).

Cantallops 1 ex. el 28.VI (ACJA); probable darrera citació prenupcial (G, F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un juvenil a l'estany del Cortalet el 19.VIII (MAXH, PCXE i JMAA); primera citació postnupcial (F).

Pedret i Marzà 1 ex. a l'abocador el 31.VIII (JGXL); (B).

BAIX EMPORDÀ

Bellaire d'Empordà Diverses observacions a Sobrestany: 1 ex. el 27.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. del 26.X (JPCA) al 13.XI (JCXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre cal Tet el 6.III (CFXB); primera citació prenupcial (F).

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. en pas pel puig d'Olorda el 31.VII (DDDA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou Barris el 27.X i el 14 i el 19.XI (XLBA); darrera citació prenupcial (G, F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. el 21.V (ISSB); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. al coll d'Ares el 16.III (FGPA i AFAA); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Massoteres 9 exs. remuntant sobre Talteüll el 25.III (FSVA); (N).

SEGRIÀ

Lleida Un juvenil sobre el CRFS de Vallcalent el 29.IX (CBXD i STXA); darrera citació postnupcial (F).

Montoliu de Lleida 1 ex. a l'abocador comarcal entre un grup de cigonya blanca *Ciconia ciconia* entre el 19 (JPXC i JIXB) i el 24.II (MBXL); primera citació prenupcial (F, B).

SELVA

Maçanet de la Selva 1 ex en pas l'1.V (JAPB, IOSA, JPMC, CSAA i MRCA); darrera citació prenupcial (F).

Sils Un adult als estanys entre el 8 (JTJA) i el 20.VII (MVCA i JVCB); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius 2 exs. en vol sobre Brics el 24.II (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Ciconia ciconia

Cigonya blanca

Estatus Resident i estival nidificant a les comarques de Ponent, i als aiguamolls de l'Empordà, on ha estat reintroduïda. Regular en migració per tot el territori, més comuna al pas de tardor. Darrerament, regular a l'hivern a les zones de cria i irregular a altres zones, fenomen que sembla en augment.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 205 exs. als dormidors el 10.I (JMAA i MRMB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 46 parelles, amb 61 joves envolats (JMAA); (R). 278 exs. als estanys del Matà el 3.IX (JMAA); màxim anual (N).

ALT PENEDEÈS

Olèrdola 79 exs. en migració al turó dels Tres Partions el 23.VIII (CGGA, XBGA i HSCA); primera citació postnupcial (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 16 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu entre el Prat i Sant Boi del 17.VI (SBXC i TRXD) al 12.VII (RBVA); individu estiuejant (F).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. sobre l'autovia A-2 el 9.II (MNPA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 146 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 130 exs. el 4.IX. Dates extremes: 4.IX i 17.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en vol sobre la Devesa en direcció a Montjuïc el 23.I (GDBA); possible primera citació prenupcial o citació hivernal (F).

MARESME

Arenys de Munt 2 exs. sobrevolen la zona agroforestal i continuen amunt en sentit nord-est el 17.II (PABA); primera citació prenupcial (F).

Vilassar de Dalt 1 ex. sobrevolant la C-31 el 4.VIII (LTBB); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb Uns 40 exs. el 18.VIII (JBCB); primera citació postnupcial (F).

Les Masies de Voltregà 1 ex. sobre la Gleva el 17.I (OPXB); possible primera citació prenupcial o citació hivernal (F).

Manlleu 297 exs. en 3 grups de 135, 97 i 65 exs. el vespre del 28.VIII (AGRB, SAXD i JPRA); màxim anual (N). 1 ex. sobre la Devesa el 17.XII (NRXB); citació hivernal (F).

Sant Hipòlit de Voltregà 15-20 exs. sobre el Ter l'1.VII (JRXH); possible darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a Palau de Noguera el 24.II (JSNA); primera citació prenupcial (F). Una parella que no arriba a criar s'observa pel municipi entre el 26.IV i finals de maig (JCCD i MVEB); (G, F).

RIBERA D'EBRE

Flix Es reproduïen 13 parelles de les que en sobreviuen 13 polls de 7 nius a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 12.I (PJMB); (R, N).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 250 exs. a l'abocador comarcal el 19.I (ALXB i TRXE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Plegadis falcinellus

Capó reial

Estatus Nidificant resident al delta de l'Ebre, on es troba en augment (més de 300 ocells presents de forma regular). A la resta del país es comporta com un migrador escàs, un hivernant rar i amb presència molt ocasional d'estiuejants alguns anys en algun dels nuclis on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 38 exs. a l'estany d'en Pericus l'1 i el 2.III (PSGA); màxim anual (N). 1 ex. a

l'estany del Cortalet el 3.V (RBBC, DOOA, RAAA, JAAB, PBBC, JBBC, BAAB, CAAB, DBBA, SHHA i FHHA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. adults als estanys del Matà el 20.VI (JMAA); possible primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 893 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions als arrossars de Pals: 1 ex. el 5.IX (AOTA); (G). 1 ex. a l'aeroclub del 6 al 14.IX (JPCA); (G). 2 exs. del 10.IX al 20.X, un dels quals resta fins el 13.XII (AOTA i ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. del 4 (PBGA) al 29.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). 7 exs. el 26.III (AVDA) i 7 exs. a cal Tet el 19.IV (FLSA i SBXC); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la maresma del Remolar el 12.V (RMXH); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 5.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 12 exs. a la maresma el 19.VIII (RMXH); màxim anual i darrera citació postnupcial (F, N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 8.IV (EBMA); (G).

Platalea leucorodia

Becplaner

Estatus Regular en migració, especialment pel litoral i les zones humides, més comú al pas de tardor que al de primavera. Hivernant escàs. Al delta de l'Ebre presència regular tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 17.III (GDBA); primera citació prenupcial (F). Observacions regulars entre març i juny amb un màxim de 5 exs. a l'estany del Cortalet el 14.VI i 2 exs. del 2 al 4.VII (JMAA); (F, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 67 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 43 exs. a la Bombita l'11.I (CJMA, ISSB, YBSA i MCBB); (N). 31 exs. a la punta de la Banyà el 29.X (RGBA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars el 24.X (AOTA); (G).

Torroella de Montgrí 2 exs. sobrevolen la platja a prop de la desembocadura del rec del Molí i baixen a les basses d'en Coll el 19.X (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Es continuen observant fins el 17.II (STVB); (F). Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. entre el 19.IV (FLSA) i el 13.V (PBGA); (F). 3 exs. el 20 i 21.V (RMXH i VSXA); (F). 2 exs. durant el mes de juny (FLSA i RMXH); (F). 6 exs. el 23.VI (RMXH i PBGA); (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 29.VIII (MMXK); (F). 3 exs. a la mateixa localitat el 8.IX (PBGA); (F). 17 exs. en pas per la platja del Remolar el 17.IX (JCMC i RMXH); màxim anual (N). De nou diverses observacions a la maresma del Remolar: 4 exs. del 7 (RMXH) al 29.X (STXB); (F). 1 ex. del 14.XI (FLSA i SBXC) fins l'1.XII (PBGA); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà Un adult a les Rocasses el 7.IV (JCRC); (G). 1 ex. sobre la Gleva el 2.VII (RPEA); (G).

Sant Quirze de Besora 2 exs. sobre el meandre de l'illa, dels quals probablement un és el mateix de la citació anterior, el 3.VII (JCB i CMGA); (G). 1 ex. sobre el nucli urbà el 19.VII (JEPB); (G).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. sobre la Farga de Bebiè, probablement el mateix de la citació de la Gleva, el 3.VII (JEPB); (G).

Phoenicopterus roseus**Flamenc**

Estatus Resident comú tot l'any al delta de l'Ebre, on nidifica de forma regular. Migrant regular al litoral i alguns punts del prelitoral. Hivernant escàs en les altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 180 exs, en pas cap al nord per davant de Punta Falconera el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); màxim anual (N). 30 exs. aturats a la badia de Portlligat, a causa de la forta tramuntana el 16.IV (JTGC); (B).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 34 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 100 exs. en vol davant la gola del Fluvià (AOTA i JGIA); (N). 158 exs. a l'estany del Cortalet i d'en Túrries el 4.IV (AOTA, CGXD i JMAA); (N). Mínim de 240 exs. en pas per l'estany de Palau el 7.IV (SSAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8.646 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 54 exs. en vol sobre el port el 20.IV (MDSA); (N, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la platja de ca l'Arana l'1.III (XLBA); primera citació de l'any (F). Estol de 56 exs. sobre la platja de ca l'Arana el 19.III (FLSA); màxim anual (N). 2 exs. a la maresma el 20.XII (PBGA i JBOL); darrera citació de l'any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 7 i 8.III (PGXG); (G).

GARRAF

Sitges 5 adults en vol sud al davant del port de Garraf l'1.III (FMVA); (G).

GIRONÈS

Girona 150 exs. a les Pedreres cap a les 11 de la nit en un gran grup en formació en direcció al nord el 18.I (ACHA); (N, G).

MARESME

Santa Susanna 37 exs. en vol nord per sobre del mar el 28.III (FMVA); (N, G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 22.VII (JEBA); primera citació postnupcial (F). Mínim de 355 exs. el 26.XI (JEBA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca Un juvenil a la torre d'en Dolça el 25.X (EGTA); (G).

Pernis apivorus

Aligot vesper

Estatus Estival nidificant escàs i localitzat, especialment a la Catalunya humida. Comú en migració per tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. a les closes del Cortalet el 13.III (BMBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració sobre el turó de les Tortes el 27.X (PTEA i FCFA); darrera citació postnupcial (F).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al parc del Foix el 23.VIII (CGGA, XBGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 12.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Feliu de Llobregat 2 adults i un juvenil en pas pel puig d'Olorda el 29.VII (DDDA); primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Berga Diverses observacions a l'embassament de la Baells: 30 exs. el 16.VIII (MBVA); primera citació postnupcial (F). 150 exs. el 28.VIII (MBVA); màxim postnupcial (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 290 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 65 exs. el 13.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al torrent de la Garriga el 16.VI (PFLB i GVXC); darrera cita-

ció prenupcial o citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria segura (F).

Sarrià de Ter 1 ex. el 19.VIII (PFLB, PFSa i MSFA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella 1 ex. recollit amb una ala fracturada, segurament per col·lisió amb cables d'alta tensió, al coll de Font Cera el 9.VI (JPSA); (B).

Dosrius 1 ex. a l'estació PERNIS 55, turó de Sant Sebastià, el 20.X (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. pujant al puig Clarà el 19.X (JBVB i PVXC); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.III (AVPA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 12 exs. el 23.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

Riba-roja d'Ebre 1 ex. sobrevolant la presa de l'embassament el 9.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries Uns 700 exs. en migració entre les 18:00 i les 19:00 h al coll del Sitjar el 16.V (JVNA); (N).

VAL D'ARAN

Bossost 36 exs. en migració direcció sud el 20.VIII (JRCD i SMMD); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 4 exs. remuntant una tèrmica a l'alçada del CIM Vallès el 21.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Elanus caeruleus

Esparver d'espatlles negres

Estatus Nidificant regular, tot i que encara en molt baix nombre, a l'interior de Catalunya que probablement també ho hagi fet a l'Alt Empordà. Accidental, amb dades recents de divagants (que poden romanre durant un temps), en diferents punts del territori. Sembla confirmar-se una lenta consolidació de la població nidificant. La seva àrea de distribució s'estén pel centre i el sud-oest de la península Ibèrica, l'Àfrica (excepte el Sàhara) i des del Pakistan fins a Nova Guinea.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de can Comes el 28.IV (LSLB, CAUA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. aturat en un pal d'alta tensió durant el SOCC 341, la Sentiu de Sió-Camarasa, el 22.I (JEBA); (G). No tramesa al CAC.

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l'Aire, sobre Fervosa, el 29.III (AGRB); (G). No tramesa al CAC.

Milvus migrans

Milà negre

Estatus Nidificant estival regular en comarques de la Catalunya occidental. Comú en migració per tot el territori. Hivernant excepcional.

Les observacions prenupcialis de 2008 van des de l'1.III (Segrià) fins l'1.VI (Segrià) i les postnupcialis del 23.VII (Cerdanya), data força primerenca, fins al 27.X (Alt Penedès). Més interessants son les dades

d'exemplars hivernants a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, l'Alt Urgell i el Ripollès que es produeixen després d'anys sense citacions durant aquest període. Cal destacar les poques dades que fan referència al pas postnupcial i les que fan referència a la possibilitat de cria en noves UTM 10×10 no registrades fins ara.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 parelles nidificants al parc, de les quals s'envolen 2 i un poll respectivament (AOTA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Pedret i Marzà Diverses observacions a l'abocador de Pedret: 1 ex. de 1r any el 29.XI (AOTA, ACTA i MPSB); citació hivernal (F). Un adult el 4.XII (AOTA); citació hivernal (F). 1 ex. el 7.XII (OPPB); citació hivernal (F).

Rabós Diverses observacions a coll de Plaça: 1 ex. en direcció nord el 2.III (MBFA); primera citació prenupcial (F). 160 exs. en direcció nord el 21.III (MBFA); màxim prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. en migració al turó de les Tres Partions el 27.X (RJRA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 1 ex. entre un nombrós grup de milans reials *Milvus milvus* a les rodalies de l'abocador comarcal el 24.I (JNVA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. l'1 i el 13.I (JEJA i VEDA); citacions hivernals (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 7.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Meranges 1 ex. volant a 2.800 m el 23.VII (JPCA i JCMF); primera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Pontils 1 ex. a mas Tous el 19.X (JMFC i MSXF); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l'abocador de Solius: 1 ex. portant branques a arbres propers a l'abocador el 26.IV i el 14.VI (CACB); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR). Establiment d'un abocador dins de l'abocador entre l'abril i el juny amb un màxim de 35 exs. el 27.IV (CACB); (N, B).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu Uns 200 exs. en pas a Llavore entre les 14:00 i les 14:30 h el 3.IV (JGXJ); (N).

Llavorsí 5 exs. en vol coincidint amb una nevada el 4.III (JPPE i RPXD); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 150 exs al dormidor de corbs marins *Phalacrocorax carbo* de la resclosa de Serinyà el 20.III (SCIA); (N).

PRIORAT

Capçanes Un niu en un pi blanc *Pinus halepensis* a la cua del pantà de Guiamets el 7.V. El 18.V ja es veuen els polls (TMPB); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. al meandre de l'Ebre el 4.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. sobrevolant la zona de la Barriana l'1.XII (OPPB); citació hivernal (F).

SEGRIÀ

Alfés 38 exs. migrant cap al nord l'1.VI (FATA); darrera citació prenupcial (F).

Montoliu de Lleida 14 exs. a l'abocador comarcal l'1.III (OLGA); primera citació prenupcial (F).

Milvus milvus**Milà reial**

Estatus Migrant i hivernant rar i escàs a la Catalunya litoral i oriental, més regular i comú a la part occidental i, especialment, a les comarques pirinenques occidentals on nidifica de forma escassa i es pot veure tot l'any.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en vol per sobre de Quermançó el 6.XII (PFLB, PFSA i MSFB); citació hivernal (F).

Rabós 1 ex. a mas Fils el 23.II (MBFA i ECFA); primera citació prenupcial o citació hivernal (F).

ALT PENEDÈS

Sant Cugat Sesgarrigues 1 ex. en migració al torrent de les Gunyoles el 4.XI (MPMB); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Montferrer i Castellbó Diverses observacions al dormidor de l'abocador de Ballestà: 121 exs. el 4.I (JNVA i JDAB); (N). 156 exs. el 24.I (JNVA i JDAB); màxim anual (N). 109 exs. el 29.XII (JNVA i JDAB); (N). 119 exs. el 30.XII (JNVA i JDAB); (N).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 1 ex. a la plana de Sant Jordi el 27.IX (ACTA i MPSA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. sobre els arrossars entre Amposta i Deltebre el 31.X (MHHA, ISSB, NSSB i CJMA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. al puig de Rigau, vora la planta potabilitzadora de Montfullà el 24.II (MFRA i MCBC); primera citació prenupcial (F).

Girona 1 ex. el 10.VII (TMXC); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

NOGUERA

Balaguer 6 exs. a l'abocador el 18.XII (CGGA, MCMF i XBGA); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. a can Baldiri el 4.XII (RPEA); citació hivernal (F).

Orís 1 ex. a l'abocador el 12 (RJNA) i el 19.I (JEPB); citacions hivernals (F).

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex sobre la Quintana (MRFA i RJNA) i 1 ex., possiblement el mateix, a Sant Marc el 28.IX (RPEA); primera citació postnupcial (F).

Sant Quirze de Besora 1 ex. sobre el nucli urbà el 8.V (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 28 exs. a l'abocador comarcal el 19.XII (JSNA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a Planes de Son el 14.V (CNPA); darrera citació prenupcial (F).

Sort 1 ex. als Vinyers cercant aliment de forma activa el 25.IX (EMFA); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Palol de Revardit 1 ex. el 18.XI (JBXH); darrera citació postnupcial o citació hivernal (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 10.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. en vol a Salardú el 15.III (MAMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. al Besòs el 24.IX (XLBA); primera citació prenupcial (G).

Gypaetus barbatus

Trencalòs

Estatus Resident localitzat escàs a les serres pirinenques i prepirinenques, amb el nucli principal a la part occidental de la seva àrea de distribució a Catalunya. A la resta del territori és accidental.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 3 exs. a la serra de Corsavell el 6.II (GHXB i CDXC); (G).

GARROTXA

Montagut Un adult, marcat de poll a l'Aragó l'any 2000, al solell de Comanegra el 26.X (PABA); (G).



Neophron percnopterus

Aufrany

Estatus Nidifica regularment al Pirineu i Prepirineu occidental. Actualment és un nidificant molt localitzat en alguns punts allunyats del nucli principal, com per exemple a Osona. Migrador escàs i irregular, més comú a la zona de Lleida i a les serres prepirinenques i pirinenques occidentals. Divagant des de o cap a les zones de cria, a la façana litoral, i a la part oriental del territori. No hi ha dades d'hivernants.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Bunyola el 27.III (MSSB); (G, F).

CONCA DE BARBERÀ

Sarral 1 ex. al coll de les Deogràcies el 7.II (JMFC i MSXF); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. sobre la Comella el 6.III (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Besora Un adult portant una presa viva pinçada al bec, del tipus i mida d'una merla o semblant, a Llaers el 24.VI (JRCD i SMMD); (B).

Tavertet 1 ex. a l'Avenc el 6.III (GCXD); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt Un adult a la Roca Santa el 23.II (XGPB); primera citació prenupcial (F).

Tremp Fins a 30 exs. alimentant-se simultàniament al punt d'alimentació suplementària de la serra de Lleràs durant tot l'estiu (JCCD i MVEB); (N).

RIPOLLÈS

Gombrèn Una parella aconseguí criar amb èxit (FGPA, AFAA i JGMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. sobrevoiant l'antic abocador el 24.VII (ADGA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un adult a Salardú el 9.V (MAMA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (G).

Gyps fulvus

Voltor comú

Estatus Nidificant regular, localitzat i escàs, majoritàriament al Prepirineu, i als Ports de Beseit. A la resta del territori es pot veure durant tot l'any, especialment al Pirineu i Prepirineu, on cada vegada és més comú però encara sense nidificar. Darrerament hi ha casos de parelles reproductores allunyades del nucli tradicional, com ara el Berguedà i el Solsonès. A la resta del territori és un visitant irregular.

L'any 2008 s'han rebut 30 citacions fora de les àrees habituals de cria que comptabilitzen 130 exs. De la mateixa manera que el 2007 (Anton 2008) el 80% d'elles es concentren al període que va de gener a juny amb màxims entre març i maig, en plena època de nidificació de l'espècie, i es concentren majoritàriament al sector nord-oriental del Principat. Molt probablement aquests moviments els realitzen exemplars juvenils o immadurs en dispersió. Per aquest motiu seria molt interessant conèixer detalls d'aquestes citacions per poder determinar les causes d'aquests desplaçaments que semblen habituals. D'altra banda, la dada de cria al Ripollès és la primera des dels anys 70 del segle passat. - MARC.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 2 exs. prop de l'Hostal de la Muga el 15.III (BMBA, TMMA, EUXA, PSGA, IMXA, MBFA, ECFA, SNXC i AOTA); primera citació de l'any (G, F). 1 ex. al Bassegodà el 3 (MBFA) i el 19.V (SCIA); (G).

Maçanet de Cabrenys 3 exs. a roc de Fraussa el 13.IV (MBXH i EPMC); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. sobrevolant la Roca Miralles, entre un grup d'arpelles *Circus aeruginosus* el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Vilaüt el 3.VI (JGIA); (G, F). Un juvenil a Empuriabrava del 3 al 5.IX (CREA, BMBA i AOTA); (G, F).

Rabós 2 exs. a coll de Plaja el 16.III (MBFA i BMBA); (G). 5 exs. a Delfià el 26.IV (SEOB); (G).

ANOIA

Cabrera d'Igualada 1 ex. a can Feixes el 21.I (XBGA); (G).

El Bruc 2 exs. prop del refugi Vicenç Barbé de Montserrat el 13.III (XSPA); (G). 1 ex. sobrevolant el Vermell del Xincarro el 15.III (FCTA); (G).

BAGES

Marganell 3 exs. a Montserrat a la zona de Frares el 29.IV (XSPA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 8 exs. el 6.V (JXCX, PPFA i AMXC); (G).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. volant a baixa alçada a la Plana el 14.XI (JGXF); (G).

Collbató 1 ex. sobre la Santa Cova el 4.III (MLMB); (G). 1 ex. sobrevolant les coves de Salnitre el 23.XII (JCGF i GLAA); (G).

BAIX PENEDÈS

La Bisbal de Penedès 1 ex. sobre la serra de Bonastre el 30.IV (XPCA); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Savallà del Comtat 1 ex. a les Serres el 13.V (XBGA); (G).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. a l'Estanyol el 13.IX (XSMA); (G).

Sant Gregori 1 ex. a Sant Grau el 14.IV (QBCA); (G).

Sant Martí de Llémena 1 ex. al collet de Bastarra el 5.IV (ACHA); (G).

OSONA

Orís 248 exs. ajocats prop de l'abocador el 30.V (JEPB); (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'abocador de Puigaltes el 18.V (SCIA); (G, B).

RIBERA D'EBRE

Ascó 7 exs. el 23.IV (PJAA); màxim anual (N).

RIPOLLÈS

Gombrèn Una parella cria amb èxit un poll (FGPA, AFAA i JGMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

SEGRIÀ

Alfés 4 exs. en vol baix sobre l'aeròdrom l'1.V (RBBC, DOOA, RAAA, JAAB, PBBC, JBBC, BAAB, CAAB, DBBA, SHHA i FHHA); (G).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 1 ex. sobre el pla de les Arenes l'1.V (ADGA i MGSA); (G).

Sils 1 ex. sobrevola els estanys el 4.V (JCXT, JMXT i MOXC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Castellbisbal 1 ex. en vol en direcció sud-oest el 24.I (JPSA); (G).

Llinars del Vallès 1 ex. sobrevolant la plana del Vallès el 14.IX (JSPC); (G).

Aegypius monachus

Voltor negre

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes dades homologades pel CAC. Hi ha una població introduïda a la muntanya d'Alinyà i a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, que pot ser que s'estableixi com a resident de forma autosostenible.

Al llarg de 2008 les observacions de voltors negres a Catalunya han augmentat com a conseqüència de dos factors: 1) el projecte de reintroducció al Prepirineu català (Boumort i Alinyà), i 2) el pas natural de Puigcerdà que funciona com a corredor que uneix les poblacions ibèriques i franceses, aquestes darreres en augment. En aquest sentit l'àrea de reintroducció es troba en un punt entremig on es sedimenten temporalment exemplars francesos i ibèrics. Pel que fa als voltors alliberats fins al 2008, el 50% (n=7), es troben fixats a l'àrea de reintroducció. Tot i això han visitat nombrosos indrets de Catalunya (observacions directes i localitzacions GPS i ràdiotracking) que comprenen, com a mínim, les següents comarques: Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Noguera, Cerdanya, Val d'Aran, Alta Ribagorça, Segrià, Segarra, Garrigues, Alt Camp, Alt Penedès, Conca de Barberà, i Priorat. Cal esperar que les observacions continuïn en augment els propers anys.-MGMA.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. amb una anella groga a la pota dreta procedent del projecte de reintroducció de l'espècie a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, posat en un tronc sobre l'aigua a la cua de l'embassament del Foix el 5.V (PTEA, JCRE i XPCA); (G).



ALT URGELL

Montferrer i Castellbó 1 ex. no marcat a Aravell menjant restes en una granja de pollastres el 25.I (ABRA); (G). No tramesa al CAC.

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort Un subadult sense cap mena de marca sedimentat entre el 15.IV i el 13.V (MAXG, BBBA, MGMA, MJXD i JRXB); (G). Homologada pel CAC. Un juvenil de l'any, nascut en llibertat i anellat a França els dies 22.XI i 3 i 11.XII (MAXG, BBBA, MGMA, MJXD i JRXB); (G). Un subadult, anellat a França en el marc dels projectes de reintroducció de l'espècie entre els dies 1 i 19.XII (MAXG, BBBA, MGMA, MJXD i JRXB); (G). No tramesa al CAC.

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. sense marcar al roc de Benavent el 27.V (JSNA); (G). No tramesa al CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. sense marques alimentant-se en un canyet a Buseu el 14.XI (JCBC); (G). No tramesa al CAC.

Sort Observat 1 ex. a Llaverri durant el mostreig de l'atles d'hivern el 25.I (APSA); (G). No tramesa al CAC.

Circaetus gallicus

Àguila marcenca

Estatus Estival nidificant regular i ben distribuït per tot el territori. Comú en migració per tot el territori amb algunes dades molt puntuals de migrants tardans en dates que podrien suggerir algun intent d'hivernada.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. barallant-se amb una àguila cuabarrada *Hieraaetus fasciatus* al Pujolar el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); (B). 2 adults i un juvenil al puig de sa Cruïlla el 2.VIII (JTGC); primera dada de juvenils de l'any (R).

Pont de Molins 1 ex. el 17.II (BMBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 10.X (CGGA, XBGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 82 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 65 exs. els dies 12 i 13.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a can Canyet el 15.II (ADGA); primera citació prenupcial (F).

MONTSIÀ

Mas de Barberans 36 exs. a l'estació PERNIS 42, Mirador dels Tossals, entre el 15.VIII i el 18.X (CBCB); màxim al projecte (N).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. entre Montgai i la Sentiu el 6.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Orís Diverses observacions al Collet de les Gargantes: 90 exs. en 90 minuts el 8.III (JCRC i JEPB); (N). 26 exs. en 90 minuts el 16.III (JEPB i MMSC); (N).

Taradell 1 ex. a l'estació PERNIS 8, l'Enclusa, l'11.X (JPEA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. el 12.III (EVAA); primera citació prenupcial (F).

Vall de Cardós 1 ex. volant sobre el bosc a la borda de Bernardina el 6.X (RPXB); darrera citació postnupcial (F).

PRIORAT

El Masroig 1 ex. el 8.II (RSBA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 8.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 27 exs. en pas pel coll d'Ares el 16.III (FGPA i AFAA); (N).

URGELL

Els Omells de na Gaia Una parella tira endavant un poll (TBSA i ADSA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Circus aeruginosus

Arpella vulgar

Estatus Nidificant localitzat, regularment, als aiguamolls de l'Empordà i a les zones humides de l'interior, com per exemple a Utxesa, el pantà de Cellers o l'embassament de Flix. Cal destacar l'absència com a nidificant al delta de l'Ebre. Nidificant irregular a altres àrees, com per exemple el delta del Llobregat, tot i que els darrers anys sembla fer-ho més regularment. Estiu-ejant irregular a les zones on no es reproduïx. Migrador regular i comú, més nombros a la façana litoral que a l'interior, i hivernant comú a les zones humides, tant de l'interior com del litoral.

A tota Catalunya es censen 63 parelles nidificants: 6 a Girona, 53 a Lleida i 3 a Tarragona. Continua l'increment poblacional dels últims anys, sobretot a Lleida on nidifica als canyissars de les basses de reg. Cal destacar el nombre molt alt d'hivernants al delta de l'Ebre.- MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Capmany Un mascle en direcció nord a l'estany de la Cardonera el 23.II (MBFA i ECFA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 4 parelles de les quals només s'observen polls volanders en una (JMAA, AOTA i SRDA); (R).

Rabós 60 exs. en direcció nord a coll de Plaja el 22.III (MBFA i BMBA); màxim prenupcial (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sobre les vinyes del corral d'en Rafeques el 6.VIII (FCFA); primera citació postnupcial (F).

ANOIA

Castellfolit de Riubregós Observacions regulars d'una femella durant tot el mes

de maig i juny a la zona de Millars (XSPA); citació estival (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 440 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Es localitzen 2 nius a la comarca (ABRA i RFRA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. de 1r any en pas pel puig d'Olorda el 3.VIII (DDDA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou Barris el 27.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 102 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA); (N).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Una femella a Serinyà el 9.III (ADGA i MGSA).; primera citació prenupcial (F). Una femella a Sangosta el 18.V (ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial (F).



Girona Una femella o juvenil a les hortes de Santa Eugenia el 7.X (ACHA i RJXA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Tiana Una femella en migració a la Conreria el 18.V (MGVA); darrera citació pre-nupcial (F).

NOGUERA

S'han censat 3 nius amb posta segura en 3 localitats: un niu al pantà de Sant Llorenç de Montgai, un al partididor de Gerb i un en una petit canyissar. Aquesta darrera localitat és nova per l'espècie. S'han comptabilitzat un total de 5 polls volanders (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

OSONA

Gurb 1 ex. a la Cabra el 15.V (RPEA); darrera citació prenupcial (F).

Taradell 1 ex. a l'Enclusa el 19.X (JPEA); darrera citació postnupcial (F).

Torelló 1 ex. a Madiroles el 4.III (MMSA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

S'han censat 3 nius amb posta segura que van fracassar al pantà de Cellers (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

PLA D'URGELL

S'han censat 2 nius amb posta segura que van fracassar a l'estany d'Ivars i Vila-sana (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Estany d'Ivars i Vila-sana 32 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

RIBERA D'EBRE

Es localitzen 3 parelles a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, de les quals van volar 6 polls (PJMB); (R).

SEGARRA

S'han censat 2 parelles amb posta segura en 2 localitats, una d'elles nova per l'espècie. S'han comptabilitzat un total de 5 polls volanders (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

SEGRIÀ

S'han censat 40 nius amb posta segura en 19 localitats. 20 postes han fracassat i s'han comptabilitzat un total de 42 polls volanders. D'aquests nius, 19 estaven a l'embassament d'Utxesa amb 17 polls volanders, un a la part catalana de l'aiguabarreig Segre-Cinca i 20 en 17 petites basses de rec i altres petits canyissars. Dues d'aquestes darreres localitats són noves per l'espècie (LCBB, AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Lleida 56 exs. als embassaments de Sucs el 15 i 19.I (MGMA, RGXF, JAXB, JBSA, CMXA, i FFCA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 41 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA, MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca Una femella adulta a la torre d'en Dolça el 8.II (ACTA, AMOA i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

URGELL

S'han censat 3 parelles amb posta segura en 2 localitats, una d'elles nova per l'espècie. Un niu ha fracassat i s'han comptabilitzat un total de 6 polls volanders (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Circus cyaneus

Arpella pàl·lida

Estatus Nidificant molt escàs, al Pirineu i Prepirineu, on es desconeix amb precisió el nombre d'efectius, que deuen ser molt reduïts. Sembla que aquesta població ha

patit una davallada en les últimes dècades, aspecte que s'hauria de confirmar. El 1997, per primer cop, va criar en un secà cerealista de la plana de Lleida, on posteriorment sembla que s'ha anat consolidant una petita població. Migrador i hivernant regular, més abundant a l'interior.

El 2008 es van localitzar 4 parelles nidificants al nord-est de la plana de Lleida. La situació d'aquesta espècie a Catalunya continua en estat crític i, novament, no es va detectar cap parella nidificant al Pirineu, tot i que la citació de la Val d'Aran en un hàbitat favorable podria indicar que n'hi ha criat alguna.- MPCB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. als dormidors el 7.I (JMAA); cens d'ocells hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. en migració al port del Fangar el 18.III (XBGA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil vora Amposta el 31.X (ISSB, CJMA i ALTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abreira 1 ex. sobre el Llobregat el 18.IX (XLBA, JPMC, PMBE, IJXA, JPXL i RGLA); primera citació postnupcial (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 8.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 4 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 13.IX i 23.IX (FTCA); (N, F).

NOGUERA

Es localitzen 3 nius, 2 en camps de civada i un en un camp d'ordi. Dos dels nius són predats i de l'altre s'envolen 2 polls. També es localitza una altra parella formada per exemplars joves que no sembla que acabi criant (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

OSONA

Santa Cecília de Voltregà 1 ex. al pla de Sant Gil el 24.VIII (CMGA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella o juvenil el 24.IV (AVPA); darrera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Es localitza un niu del qual s'envolen 4 polls en un canyissar. En aquest indret ja hi va nidificar una parella el 2006, es van trobar indicis de cria el 2007 i el 2008, a més a més, hi nidifica una parella d'arpe-lla vulgar *Circus aeruginosus* i dues d'esparver cendrós *Circus pygargus* (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGIÀ

Torres de Segre 3 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA, MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran Una femella caçant a les landes alpines entre el pic de Montpius i el tuc de Letassi a 2.000-2.100 m d'altitud l'11.V (LTBB); (R).

Circus macrourus

Arpella pàl·lida russa

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. Cria a les estepes, des del mar Negre fins al centre d'Àsia. Hiverna principalment a l'Àfrica al sud del Sàhara, l'Índia i el sud de la Xina; també en alguns punts de la costa est del Mediterrani i a Tunísia.

ALT EMPORDÀ

Garriguella 1 ex. als camps de can Costoja el 21.III (JBRC); (G). No tramesa al CAC.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle de 3r any de calendari i una femella d'almenys 3r any de calendari a l'Estanyol el 2.IV (AOTA); (G). Homologada pel CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un mascle de 1r any de calendari als conreus del mas Pla, Pals, del 8 al 10.XI (AOTA i ABRA); (G). Homologada pel CAC.

Circus pygargus

Esparver cendrós

Estatus Estival nidificant localitzat, molt escàs, repartit entre el Baix i Alt Empordà, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i el Montsià. Havia nidificat al Bages fins a l'any 1999, comarca que podria colonitzar en un futur. Migrador regular però escàs.

A Catalunya el 2008 es localitzen un total de 71 parelles nidificants i s'envolen 102 polls. Aquestes dades signifiquen un lleuger augment respecte l'any anterior, a més, es troben 14 parelles, de les quals no es localitza el niu o no acaben realitzant cap posta. Del conjunt de nius, 28



son en vegetació natural (garriga o canyissar) i 43 en camps de conreu. D'aquests últims, 28 estan ubicats en regadiu i 15 en secà. Es protegeixen 22 nius indemnitzant als propietaris per l'endarreriment o la pèrdua de la collita. Tal com ha passat durant els darrers anys, la baixíssima pluviometria a l'inici del creixement del cereal en els camps de secà, ha provocat que aquest no hagi assolit prou alçada ni densitat suficient per garantir la protecció dels nius. Per tant, la majoria de parelles han escollit per criar camps de regadiu, tant de cereal com de farratgeres. Per contra, les pluges tardanes i abundoses han permès que, en quasi un 20% dels nius en conreu a Lleida, els polls poguessin volar abans de la sega. - MPCB i JBFA.

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 7 nius, 2 en vegetació natural (garriga) i 5 en camps de cereal, d'on s'envolen un total de 17 polls (RFRA); (R).

Armentera Un mascle el 3.III (MIXA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un juvenil al Clot el 4.X (CJMA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Un juvenil amb marques a les ales en uns camps a mas Pla el 18.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat Un juvenil en pas pel puig d'Olorda el 7.VII (DDDA); primera citació postnupcial (F).

CONCA DE BARBERÀ

Les Piles 1 ex. el 17.III (JMFC i MSXF); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 4 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 28.VIII i 8.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Un mascle a la Gotarra el 20.VIII (XVGA); primera citació postnupcial (F).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 21 nius situats tots en vegetació natural (garriga) dels quals s'envolen 40 polls (DMMC, CMSB, ESTA, CBCB, JMQA i MSSA); (R).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 10 nius, 9 en camps de farratge i un en cereal. Se'n protegeixen 7 i s'envolen 12 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

OSONA

Taradell 1 ex al Colomer l'1.V (JBCB); darrera citació prenupcial (F).

Tavernoles 1 ex. a Savassona el 2.IV (JCSA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 2 exs. a Arcalís el 27.VIII (JRSB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 3 nius, 2 en camps de farratge i un en cereal, que són protegits. Els 3 nius fracassen (JBSA, FPTA, AVPA i CRPB).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 5 nius en vegetació natural (canyissar) ubicats en dues localitats diferents, dels quals s'envolen 9 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 4 nius situats en camps de cereal, 3 dels quals són protegits. Tots els nius fracassen (JBSA, FPTA, AVPA i CRSA); (R).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 21 nius, 15 en camps de farratge i 6 en camps de cereal. Se'n protegeixen 14 i s'envolen 24 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRUA); (R).

Accipiter gentilis

Astor

Estatus Resident nidificant en bon nombre a les comarques interiors de la depressió Central, al Prepirineu, i al sector septentrional de la serralada Prelitoral. Més escàs en altres zones com el litoral, o la depressió de l'Ebre. Migrador i hivernant escàs a les zones on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Una femella al puig Alt Gros el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JWSA); darrera citació prenupcial



(F). 1 ex. a Montjoi el dia 18.X (MFRA i JBCD); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la maresma del Remolar el 3.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 2.X (FLSA, ARMC i SBXC); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera Dos atacs reeixits a gavians argentats *Larus michahellis* joves el 22.XI. Podrien ser dos individus diferents perquè la tàctica de caça no té res a veure l'un amb l'altre. El primer es llença des de bona alçada sobre l'estol embogit de gavians, mentre que el segon és clàssic, a baixa alçada i per sorpresa (CACB); (B).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'abocador de Puigpalter l'1.II (JMGD); (B).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 24.III (DCFB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 1 ex. a can Cirera amb una garsa *Pica pica* a les urpes el 8.IV (HFSA); (B).

Accipiter nisus

Esparver vulgar

Estatus Resident nidificant comú arreu de Catalunya. Migrador i hivernant comú. Hi ha un pas apreciable pel litoral d'individus centre i nord-europeus, tot i que pot migrar per tot el territori en bon nombre.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=77).
Índex 2008=2,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=190).
Índex 2008=1,9

ALT PENEDES

Olèrdola 106 exs. al turó dels Tres Partions durant el seguiment de la migració postnupcial entre el 16.VIII i el 15.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de depuració el 26.III (FLSA i EDBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'aeroport l'1.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou Barris el 18.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 84 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 ex. atropellat a la C-13 a uns 500 m del nucli urbà el 13.X (NEXA i JFXE); (B).

Buteo buteo

Aligot comú

Estatus Resident nidificant comú a tot el territori. Migrador i hivernant comú i àmpliament distribuït. Les poblacions hivernants centre i nord-europees es distribueixen àmpliament, tot i que són més evidents en les zones on no nidifica com algunes zones humides litorals i sectors desforestats de la plana de Lleida.

De les dades de 2008 en destaquen l'alt nombre de migrants el 19 de novembre al Barcelonès, que representa la xifra més alta publicada en un anuari, així com la dada de pas prenupcial el 2 de març a l'Alt Empordà.- PJAA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=161).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=297).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 2 exs. en direcció sud el 8.IX (MBFA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 4 parelles (JMAA); (R).

Rabós 10 exs. en direcció nord el 2.III (MBFA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a cal Tet: 1 ex. el 19.IV (STVB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella l'11.XII (JGGD); (G). 56 exs. en migració sobre Nou Barris el 19.XI (XLBA); (N).

GARROTXA

Olot 2 polls amb plumó en un niu a Rocabrúna el 13.V (FTCA); primera citació de juvenils de l'any (R).

Sant Joan les Fonts 53 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Llagostera 12 exs. durant un recorregut de 60 km per la plana de la Selva el 8.XI (PFLB, MRXA, XVFA i AAXD); (N).

Aquila clanga

Àguila cridanera

Estatus Accidental. Diverses homologacions a Catalunya pel CR/SEO, alguna d'elles d'exemplars hivernants. Es distribueix per una franja que va des de l'est d'Europa fins a l'est d'Àsia. Com a hivernant, s'observa a la Camarga (França), i també al sud-est d'Europa, al nord-est d'Àfrica, d'Àrabia, i del Pakistan fins al sud i l'est de la Xina i Indoxina.

Curiosa citació d'un exemplar que va creuar el nostre país entre el 16 i el 18 de novembre sense ser vist per cap observador i que només s'ha conegut gràcies al radioseguiment (www.looduskalender.ee/en/node/2219).- MARC.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Un jove passa la nit del 17 al 18.XI (USSA); (G). No tramesa al CAC.

OSONA

Gurb 1 ex., el mateix que l'anterior, passa per sobre Puigllong el 16.XI i passa la nit al pla de Sant Roc. Marxa de la zona

passant prop de Muntanyola el matí del 17.XI (USSA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÉS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex., el mateix que l'anterior el 17.XI (USSA); (G). No tramesa al CAC.

Aquila chrysaetos

Àguila daurada

Estatus *A. c. chrysaetos* resident nidificant, més nombrós a les serres prepirinenques i pirinenques, i molt més escàs a l'àrea d'influència mediterrània. Migrador regular, però escàs, detectat en zones on no nidifica, i hivernant en zones de la depressió Central, on es poden veure regularment subadults. *A. c. homeyeri* resident nidificant en baix nombre a l'àrea d'influència mediterrània. Migrador regular, però escàs, detectat en zones on no nidifica, i hivernant en zones de la depressió Central, on es poden veure regularment subadults.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en vol sobre el cap Norfeu el 20.III (ACBA i ALTA); (G). Un subadult a la vall de Montjoi el 22.IV (LSLB, PPXE i PGXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. sobrevoiant el bosc de can Canals l'11.IV (VSSA); (G):

OSONA

Gurb Un jove o immadur sobre Granollers de la Plana el 27.IX (DCXC); (G).

Orís 1 ex. al coll de les Gargantes l'1 (JEPB) i el 15.III (JCRB); (G).

Tavernoles 1 ex. a Fussimanya el 12.I (JAIA); (G).

Vilanova de Sau Un immadur al camí de Vallclara el 27.I (ADGA); (G).



SELVA

Sant Hilari Sacalm Un subadult prop de les Arenes el 27.I (ADGA i MGSA); (G).

URGELL

Els Omells de na Gaia Una parella tira endavant un poll en un niu situat en un pi blanc *Pinus halepensis* (TBSA i ADSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran Un adult alimentant el poll en un niu a la vall d'Horno. El 23.VIII, el poll ja vola (MAMA); (R).

Hieraetus pennatus

Àguila calçada

Estatus Estival nidificant escàs, especialment al Prepirineu occidental i a l'interior de Catalunya (Bages, Solsonès...). Actualment està expandint la seva àrea de reproducció cap a l'interior de Catalunya. Migrador regular, però escàs. Hivernant regular però localitzat, especialment a les zones humides litorals.

Les citacions aportades datades en època reproductora semblen indicar que continua l'expansió de l'espècie en quadrats propers a les zones amb poblacions consolidades. D'altra banda, cal destacar les

citacions de Vallromanes, Santa Coloma de Gramenet i Montroig del Camp, que apuntarien a la possibilitat de que l'espècie ja estigués colonitzant zones costaneres d'on mancava completament en el període de prospecció de l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 (Estrada *et al.* 2004). El 2008 s'han rebut moltes citacions hivernals que permeten suposar que es consolida un petit contingent hivernant confinat a zones palustres de l'interior (Banyoles, Utxesa, Ivars, etc) i, especialment, de la costa (aiguamolls de l'Empordà, delta de l'Ebre, etc), així com també a les conques de rius importants com l'Ebre, el Segre, el Fluvià i el Ter, zones que augmenten les seves possibilitats tròfiques donada la major productivitat i biodiversitat d'aquests ambients en l'època desfavorable.- JBPB.

ALT EMPORDÀ

L'Escala 1 ex. a Riells el 17.V (GDDB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.VIII (AOTA i BMBA); primera citació postnupcial (F).

Pedret i Marzà 1 ex. l'abocador el 6.XII (ACTA, AOTA i MPSA); citació hivernal (F).

ALT URGELL

Oliana Diverses observacions al tossal de Carissols: 1 ex. de fase fosca el 19.VI i 1 ex. de fase clara el 20.VI (FSVA); citacions estivals en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (G).

BAIX CAMP

Montroig del Camp 1 ex. de fase clara en vol direcció sud el 3.VI (FMVA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. entre el 6 i el 16.I

(PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. el 23.II (JEJA, MJXE i VEDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX Penedès

La Bisbal de Penedès 1 ex. de fase clara el 16.II (CODA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. en migració sobre Nou Barris entre el 5 i el 19.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (N, F).

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. caçant al monestir de la Murtra el 3.VI (RGLA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. de fase clara a Dosquers l'1.XI (FTCA); darrera citació postnupcial (F).

Sales de Llierca 1 ex. a can Puig el 18.VIII (RCFA); primera citació postnupcial (F).

Sant Joan les Fonts 9 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 25.VIII i 12.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al pont de Pedra el 7.VI (ACHA), 1 ex. a sant Daniel el 23.VI (MFRA), 1 ex. a les Pedreres el 24.VI (MFRA) i 1 ex. a la pujada als Àngels el 2.VII (PFLB); citacions estivals en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà el 15.II (GBCA); primera citació prenupcial (F).

Bellmunt d'Urgell 1 ex. de fase fosca i 1 ex. de fase clara a la serra de les Quadres l'1.VI (DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHÀ, MFSA, AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA); darrera citació prenupcial o citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 12.V (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

Taradell 1 ex. a l'Enclusa el 24.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 adults i un poll a un niu sobre un trèmol *Populus tremula* el 10.IX (XRMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la punta Freixenet el 17.VII (ICPA, MCLA i MLLA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

Sant Martí de Campmajor 1 ex. de fase clara observat dues vegades a poca alçada sobre la fageda des del cim de Golany, Rocacorba, el 12 (XVPA) i el 27.VII (CFQA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

Serinyà 1 ex. de fase clara al pla de Martí l'1.XII (FTCA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'1.XII (FMSA); citació hivernal (F).

RIBERA D'EBRE

La Torre de l'Espanyol 1 ex. en actitud de caça a les crestes de la muntanya l'11.II (RGLA); primera citació prenupcial o citació hivernal (F).

SEGRITÀ

Alfés 1 ex. al secà d'Alfés-Mas de Melons

el 5.II (DGJA); primera citació postnupcial o citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de fase clara menjant una gavina capnegra *Larus melanocephalus* adulta al port el 2.II (ACTA); citació hivernal (F, B).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 1 ex. volant sobre el castell i el turó de Sant Miquel el 7.VI (JPSA); darrera citació prenupcial tardana o citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

Hieraetus fasciatus

Àguila cuabarrada

Estival Resident nidificant no gaire nombros i localitzat a les serres d'àmbit mediterrani del litoral i prelitoral. Més escàs a les serres prepirinenques de Lleida. Migrador molt escàs que es pot veure arreu del territori, sobretot en la dispersió dels joves, i hivernant irregular o accidental en zones litorals, alguns anys en aiguamolls (sobretot exemplars juvenils i subadults).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles crien amb èxit un total de 3 polls (PFLB); (R). Un adult i un poll al niu el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE); primers polls de l'any (R).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de 1r any calendari a les closes de Mornau el 3.XI (AOTA i JGIA); primera citació postnupcial (F, G).

Serra de l'Albera Diverses observacions d'exs. diferents dels de la parella habitual entrant als nius de la zona sense que hi hagi indicis de reproducció: un immadur el 6.III i un adult o subadult el 26.IV (XVPA); (B).

GIRONÈS

Llagostera Un immadur a l'abocador de Solius els dies 19.VII i 23.VIII (CACB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Un juvenil fent atacs a tudons *Columba palumbus* l'1.XII (FMVA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Un adult el 10.XI (PJAA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions a Gallecs: un adult el 24.IV (FMVA); (G). Un juvenil depredant un colom domèstic *Columba livia* el 14.IX (FMVA); (G).

Palau-Solità i de Plegamans Un adult sobrevolant una bassa amb ànecs al parc de l'Hostal del Fum el 19.IV (FMVA); (G).

Pandion haliaetus**Àguila pescadora**

Estatus Migrador regular, no gaire nombros, tant pel litoral com pels cursos fluvials de l'interior. Hivernant molt localitzat, encara que darrerament sembla regular a les zones humides del litoral, especialment al delta de l'Ebre. Estiu ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. hiverna al tram baix del riu Fluvià durant el mes de gener (JMAA); (F). 1 ex. als arrossars de la Gallinera el 30.VI (EMMA); citació estival (F).

ALT URGELL

Oliana 1 ex. a l'embassament el 30.VIII (DDDA, FHVA, MSGB, MMRB, OGPA i CCVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la badia del Fangar: 1 ex. el 22.V (CJMA, ISSB i ALTA); darrera citació prenupcial (F). 7 exs. a la badia del Fangar el 22.X (ISSB i ALTA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a mas Pla el 18.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 16.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. que s'observa entre aquesta mateixa localitat i la maresma del Remolar de l'1.IV (FLSA) al 26.V (RMXH); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 22.VIII (RMXH); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració sobre Nou Barris el 29.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 12 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 7a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 3.IX i 21.IX (FTCA); (N, F).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. al riu Ter el 19.III (MPSC); única citació prenupcial (G, F).

MARESME

Mataró 1 ex. posat en una torre elèctrica al costat de la C-31 el 5.VII (LTBB); citació estival (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu Diverses observacions a la mollera d'Escalarre: 2 exs. el 12.III (MPXJ); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 17.V (RMOA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre el puig de Sant Martíria el 19.XI (JBXH i JVLA); darrera citació postnupcial o citació hivernal (F). 1 ex. a l' Abocador de Puigpalter l'1.XII (ECXD); citació hivernal (F).

Serinyà 1 ex. a la reserva de l'illa de Fares el 9.IX (SCIA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.VI (ERVA) i 1 ex. el 22.VII (JEBA); citacions estivals (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 23 i el 24.VII (PJMB); citacions estivals (F).

Falco naumanni**Xoriguer petit**

Estatus Reintroduït com a estival nidificant en alguns punts de la depressió Central i de l'Alt Empordà, on actualment sembla que la colonització encara s'està consolidant. Migrador molt rar.

El 2008 ha estat un any molt dolent per a la nidificació del xoriguer petit a Catalunya. El nombre de parelles nidificants ha sofert una important davallada, comptabilitzant-se un total de 87 parelles, xifra que representa un 25% menys que l'any 2007. A més, s'han constatat casos de depredació en algunes colònies importants i l'è-



xit reproductor ha estat dels mes baixos des que es monitoritza l'espècie, volant uns 150 polls amb una mitjana de 1,7 polls /niu. La situació ha resultat especialment greu a l'Alt Empordà, comarca en la qual les dues principals colònies han estat pre-dades o abandonades, de manera que el percentatge de fracassos s'ha situat en un 52%. D'altra banda, cal destacar que per primera vegada no s'ha alliberat cap nou exemplar a Lleida.- MPCB, JBSA i FCBA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 42 parelles nidificants en 8 colònies al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de més de 46 polls (3 nius són inaccessibles i desconeixem el nombre de polls volats). Cal destacar la depredació de tots els nius de la colònia amb major nombre de parelles i l'abandonament a mitja posta de la majoria de parelles del cap de Creus, possiblement a causa de condicions atmosfèriques adverses durant el període de posta. Aquest any es reintrodueixen a la comarca 45 polls (42 per hacking i 3 per fosting) criats en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (FCBA i GMCB); (R).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 28 exs. en un dormider a Vilaüt el 9.VII (ABRA); (N).

Rabós 3 exs. a Delfià el 8.III (BMBA); primera citació prenupcial (F).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós Un mascle en un pal de llum a Millars el 2.IX (XSPA); darrera citació postnupcial (G, F).

GARRIGUES

Es localitza una parella en una cabana al terme de Castellans, que envola 3 polls. És el primer cop que es té constància de la nidificació de l'espècie a la comarca (MGMA, FPTA i JBSA); (R).

MARESME

Argentona 5 juvenils capturant llagostes a l'Espinal entre el 15 i el 21.IX (JGMA); (G, F).

NOGUERA

Es localitzen 32 parelles nidificants en 8 colònies al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 81 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

Balaguer 2 exs. al secà el 8.III (EFGA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Es localitzen 8 parelles nidificants en una colònia al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 10 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

URGELL

Es localitzen 4 parelles nidificants en una colònia al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 6 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

Falco tinnunculus

Xoriguer comú

Estival Resident i nidificant comú, en tot tipus d'ambients, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya. Migrant i hivernant molt comú a tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=105).
Índex 2008=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=240).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Una femella en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA); primera citació en pas prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 139 exs. al turó dels Tres Partions durant el seguiment de la migració postnupcial entre el 16.VIII i el 15.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. captura 4 canaris *Serinus canaria* d'una terrassa del casc antic el 23.X (PABA); (B).



Mataró Una parella fa niu en una grua de construcció al nucli urbà i fracassa la posta al desmuntar-se la grua abans que finalitzi la reproducció (HFSA); (R). Un niu amb 6 polls a l'ampit d'una finestra el 13.V (HFSA); (R).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. al pui d'Unha el 19.III (MAMA); primera citació prenupcial (F).

Falco vespertinus

Falcó cama-roig

Estatus Migrador regular, però escàs i localitzat, molt més comú al pas prenupcial, quan és especialment observat a l'Alt Empordà i a les comarques de la plana de Lleida, i més rar al postnupcial.

El pas prenupcial del falcó cama-roig durant l'any 2008 va ser inusualment intens. En aquest marc s'han rebut un total de 122 citacions en pas prenupcial entre març i juny que es distribueixen en 23 citacions de 53 exemplars a l'abril, 86 citacions de 449 exemplars al maig i 13 citacions de 56 exemplars al juny. Afecten a 27 comarques, entre les quals destaquen l'Alt Empordà amb 44 registres de 276 exemplars i les comarques de Ponent. Algunes observacions corresponen a grups sedimentats durant alguns dies, fet habitual en aquesta espècie (Legendre 2005). L'excepcionalitat del pas també es va detectar per la façana oriental de la península Ibèrica (www.rarebirdspain.net) i, molt probablement, deuria estar associat a les peculiaritats meteorològiques de la primavera del 2008. De fet, aquest fenomen també va afectar a altres espècies amb vies migratòries orientals com la bosqueta icterina *Hippolais icterina* o el mosquiter xiulaire *Phylloscopus sibilatrix*. Es publica un resum de les citacions més destacades i

les poques observacions fora del període esmentat.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Una femella als Tres Ponts el 22.VI (ACXI, RJNA i MRFB); darrera citació prenupcial (F).

Rabós 1 ex. a coll de Plaja el 5.IV (MBFA); primera citació prenupcial (F). 44 exs. entre Delfià i Mollet de Peralada el 6.V (MBRA, EMSA i ECFA); (N).

ALT Penedès

Sant Martí Sarroca Un mascle de 2n any el 17.V (MNPA); (G).

ALT URGELL

Organyà 1 ex. al SOCC 320, Forn i Caferna, el 15.V (AMSC); (G).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós Un mascle a la zona de Millars el 21.V (XSPA); (G).

BAIX CAMP

Reus 2 mascles, un d'ells de 2n any a l'aeroport el 15.V (ABBB); (G).

BAIX EBRE

Tortosa Un mascle vora Jesús el 25.V (ISSB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle sobre Deltebre el 26.IV (ACHA, OCVA, PFLB, JSVA, JGCB, XLBA, RGBA, SSAA i ARMC); primera citació prenupcial (F). Un mascle i una femella als erms de la Tancada el 17.V (JTOA i RSBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-Sator 2 exs. a Fontclara el 14.VI (PFLB i MSFB); darrera citació prenupcial (F).

Torroella de Montgrí Una femella adul-

ta a mas Pla el 19.IV (JPCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 6.V (XLBA, JMXU i FSJA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'A-rana el 20.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

BERGUEDA

Avià Un mascle i 2 femelles a l'estany de Graugés el 24.V (PABB i JSPB); (G). 2 femelles, un mascle adult i un mascle de 2n any el 26.V (PABB); (G).

CERDANYA

Llívia 4 exs. al SOCC 220, Llívia, el 14.VI (XRPA); (G).

GARRIGUES

Castellans 2 exs. a Mas de Melons el 10.VI (FSVA); (G).

GARROTXA

Olot Una femella caçant als prats de Coma-negra el 13.V (FTCA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. als camps de la Gotarra el 4.IX (TMXC); citació postnupcial (F).

Cassà de la Selva Un mascle a can Sacot el 6.V (ADGA i MGSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. recollit ferit i portat al CRFS de Torreferrussa el 9.VI (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Palafolls Un juvenil el 19.VII (XRCA); darrera citació prenupcial molt tardana o citació estival (F).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 3 exs. al secà el 17.VI (CBCA); darrera citació prenupcial (F).

La Sentiu de Sió 1 ex. al SOCC 341, la

Sentiu de Sió-Camarasa, el 30.IV (JEBA); primera citació prenupcial (F).

Montgai 10 mascles i 4 femelles al secà l'1.VI (DDDA, FHVA, EFCA, CLSA, MSGB, NGHA, MFSA, AZCA, CPEA, PLDA, EMGC, JMVE i MBAA); (N).

OSONA

Tavèrnoles Un mascle de 2n any al Reguer el 7.VI (RPEA); darrera citació prenupcial (F).

Viladrau Un mascle a l'urbanització de la Guineu el 29.IV (JPFB, APPA i EPPB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Esponella-Serinyà Diverses observacions al pla de Martís: 5 exs. en un camp segat ple de talpons el 10.V (JBVB); primera citació prenupcial (F). 17 exs. el 13.V (HMPA); (N). 2 exs. el 23.V (ACHA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 22.IX (ECXD i JBXH); citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Linyola 2 femelles el 29.IV (OLGA); (G).

RIBERA D'EBRE

Miravet 3 exs. menjant formigues alades en uns camps prop del límit amb el terme municipal amb el Pinell de Brai el 19.X (RACC); citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries Dues femelles caçant insectes als voltants de can Mariner el 15.V (FTCA); (G).

SEGARRA

Els Plans de Sió 15 exs. en un guaret prop de la localitat el 31.V (CGFA); (N).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. al SOCC 428, Torres de Segre, el 8.VI (LPBA); darrera citació prenupcial (F).

Almenar 15 exs. al clot de la Unilla el 15.V (FSVA i PGXF); (N).

Aspa 1 ex. el 7.IV (MBXL); primera citació prenupcial (E, F).

TARRAGONÈS

El Morell Un mascle adult al Francolí el 27.IV (RACC); (G).

URGELL

Tàrrega 15 mascles, 13 femelles i un juvenil en un guaret vora Riudovelles el 28.V (MPOB); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Una femella a la vall de Sant Pere de Reixac el 5.V (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una femella a Gallecs el 24.V (OBDA); darrera citació prenupcial (F).

Tagamanent Una femella adulta al pla de la Calma prop de ca l'Agustí l'1.V (EBMA i EGXH); primera citació prenupcial (F).

Falco columbarius

Esmerla

Estatus Migrant i hivernant regular, no gaire nombrós, però ben distribuït especialment pels ambients de la depressió Central i la Catalunya interior (sobretot a l'altiplà del Bages), i més localitzat i escàs al litoral, on és més normal trobar-lo a prop de zones planes i extenses, com per exemple les zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 19.IV (ABBB); darrera citació prenupcial (F). 1-2 exs. als camps entre el Cortalet i l'estany Europa el 29.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 13 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'illa de Buda i 1 ex. a Riet Vell el 23.IX (JBAB, MGTA i ALTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Nani el 12.X (XLBA, MGVA i JPMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el pont de Sarajevo al barri de Sant Martí el 13.I (RRSB); (G).

OSONA

Tona 1 ex. a l'Estabanell el 14.IV (PBCA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a Buseu el 21.III (JCBC); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'11.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Almatret 1 ex. el 28.IX (PJAA); primera citació postnupcial (F).

Lleida 1 ex. a Torreribera el 14.IV (DGJA); darrera citació prenupcial (F).

Falco subbuteo

Falcó mostatxut

Estatus Estival nidificant ben distribuït per tot el territori, tot i que es reproduïx localment. Migrant regular a tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 5.IV (MOVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 1 ex. a cal Nani el 28.V (FLSA, FSEB i SBXC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí de València el 22.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. sobre cal Tet el 19.X (PBGA i JBOL); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. caçant al Parc Nou el 13.X (FTCA); darrera citació postnupcial (N, F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. el 8.IV (PJAA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. a can França el 12.IV (FTCA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 14.IV (DGJA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar 1 ex. als plans de Vilobí el 4.XI (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. sobrevolant el Parc Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

Falco eleonora**Falcó de la reina**

Estatus Regular durant els períodes migratoris (maig-juny, setembre-octubre) i l'època prereproductora (juny-juliol), sobretot al

litoral. Presència més irregular d'individus estiuejants, la major part dels quals deuen ser no reproductors, entre la segona meitat de juliol i la primera de setembre.

Enguany són remarcables la primera i última data d'observació (10 d'abril i 11 de novembre), extremes per a la fenologia de l'espècie. La major part d'observacions corresponen al pas prenupcial i al període prereproductor (en especial juny), època en què l'espècie també apareix més sovint en zones interiors. Lúnica dada de 2008 que sembla clarament atribuïble a grups d'individus no reproductors estiuejants és la d'agost al Pallars Jussà. No s'observen concentracions durant períodes llargs en determinades zones, com les detectades la segona meitat dels anys 1990 al Berguedà (Copete 1998, Copete 2000) i la primera dels 2000 al Solsonès (Aymí & Herrando 2003, Aymí & Herrando 2005, Sales 2006), degudes a l'alta disponibilitat temporal d'aliment (insectes xilòfags) derivada de dos grans incendis forestals. Les dades de setembre es concentren prop del litoral i són d'interpretació incerta, ja que tant podrien correspondre a estiuejants com a desplaçaments cinegètics de reproductors balears o a primers migrants.- PABB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA, XVXB, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); (B).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Sant Joan Sescloses el 3.V (ABRA); primera citació de l'any (F). 1 ex. de fase clara al sector del Matà el 19.X (GDBA); darrera citació de l'any (F).

BAIX CAMP

Colldejou 1 ex. de fase clara al cim de la Miranda, serra de Llaberia, el 26.VI (XPVA, JRXD i RBXD); (G).

Reus 1 ex. prop de l'aeroport el 20.VII (PJAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. de fase clara a mas Pla el 31.V (JPCA); primera citació de l'any (F).

Verges 1 ex. el 2.VIII (RJNA i MRFB); darrera citació de l'any (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de fase clara a cal Tet el 12.V (CODA); primera citació de l'any (F). 2 exs. a la maresma del Remolar el 27.IX (CCTA); darrera citació de l'any (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant sobre el turó del Putxet l'11.XI (RRSB); darrera citació de l'any a Catalunya molt tardana (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. volant cap al sud sobre la costa a prop del Castellet el 17.VII (RGLA); (G).

GARROTXA

Olot Un jove o femella a Sant Miquel del Mont el 23.VI (FTCA); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diverses observacions a Serinyà: 1 ex. de fase fosca el 10.VI (RMGA); primera citació de l'any (F). 4 exs. al casc urbà el 23.IX (ADGA i MGSA); darrera citació de l'any (F, N).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 ex. el 23.IX (DCFA); darrera citació de l'any (F).

Sant Pol de Mar 1 ex. el 12.VI (JCXO); primera citació de l'any (F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. al Montsià el 26.VI (CJMA i ISBB); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. de fase clara caçant insectes en vol en un guaret al secà 21.V (JEBA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Mínim de 14 exs. a Buseu el 21.VIII (JCBC, EBMA, MIXA i TBTA); (G, N).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor Una femella o jove a Campmajor el 24.VI (FTCA); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. de fase fosca a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 10.IV (PJAA); primera citació de l'any a Catalunya molt primerenca (F).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. el 17.X (DCFA); (F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a la Torregassa el 24.VII (GBCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Martorelles 2 exs. al turó de Galzeran el 8.IX (FMVA); (G).

Falco peregrinus

Falcó pelegrí

Estatus *F. p. brookei* resident que nidifica a tot el territori, en ambients rupícoles, des dels penya-segats marins a l'alta muntanya. Migrador i hivernant regular, però escàs fora de les zones on no nidifica. *F. p. calidus* migrador i hivernant probablement regular, però escàs. *F. p. peregrinus* resident al nord (i potser al vessant sud) dels Pirineus, que nidifica localment en ambients rupícoles, distribuït per tot el territori des

dels penya-segats marins fins a l'alta muntanya, de forma més aviat localitzada. Migrant i hivernant regular, especialment en zones humides i estepàries.

La citació de Sant Pere de Ribes d'un cas de poligínia, fenomen molt rar en aquesta espècie, és molt interessant. Cramp 1980, només cita dos casos reportats al Paleàrtic.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex., probablement de la subespècie nòrdica *calidus*, identificat en base a fotografia per part de DFFB i FMVA, a la punta dels Forallons el 20.I (PFLB, MSFB, ALXE, JSVA, ASLB, LMPA i MCXM); (T). 2 joves i un adult als penya-segats litorals de Sa Planassa l'11.VI (PFLB); primers juvenils de l'any (R). Estimació d'un mínim de 4 parelles reproductores en l'àmbit del parc natural (PFLB i ALTA); (R, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 16 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un juvenil de la subespècie *calidus* el 4.X (CJMA); (T).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. amb caràcters de la subespècie *calidus* el 4.X (JPCA); (T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Sant Pere de Ribes Nucli reproductor format per un mascle i 2 femelles a la mateixa penya (RGLA); (R, B).

MARESME

Argentona 1 ex. intentada en diverses ocasions capturar sense èxit un xoriguer *Fal-*

co tinnunculus que caça llagostes, a l'Espinal, el 17.IX (JGMA); (B).

PLA D'URGELL

Bell-lloc d'Urgell 1 ex. fent fins a 6 atacs consecutius a una fredeluga *Vanellus vanellus* al pla de Vencilló el 12.XII (FMSA); (B).

SEGRÀ

Lleida 1 ex. sobre el castell el 23.V (FMSA); (G).

SOLSONÈS

Riner Un adult sobrevolant Su el 20.VI i 1 ex. al pantà de l'Alzina el 22.VI (RBVA); citacions estivals en un sector sense dades de cria (G).

Rallus aquaticus

Rascló

Estatus Resident i nidificant comú, en totes les zones humides sempre que trobi prou cobertura vegetal per instal·lar-s'hi. Migrant i hivernant regular, no excessivament nombros, que pot aperseixer en zones on no nidifica. En aquestes és també perceptible l'entrada d'individus transpirinencs a l'hivern, així com moviments de caire local segons la cruesa de l'hivern.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 2 exs. a la cua el 9.IV (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sentit el 31.X (XPCA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 2 exs. al riu Segre entre el pont de la Palanca i el riu de Cerc el 18.I (JNVA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 12 exs. el 12.I (FLSA,

FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la riba esquerra de la desembocadura de la Tordera el 27.II (PABA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 4 exs. al Ter a Malars el 10.X (MRFA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 8-10 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. el 19.I (VPRA); (G).

Porzana porzana

Polla pintada

Estatus Migrant regular als dos passos, més nombrós al prenupcial. Hivernant rar. No hi ha dades recents de la seva nidificació.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 10.III (EDDB i IDDB); primera citació prenupcial (F). Un mínim de 10 exs. durant tota la migració prenupcial (PAEB); (N). 1 ex. anellat a l'estany de Palau el 22.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el 12.VIII (JMAA i AOTA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a l'estany de Palau el 27.XI (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 23.III (ACTA); primera citació prenupcial (F). Un mínim de 10 exs. més a l'Alfacada, la Tançada i Canal Vell durant la migració pre-

nupcial (JBGC, JXXB, PGXF, CDBA i OCVA); (N). 1 ex. a l'Alfacada el 20.IV (JBGC i OCVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyissar de la maresma el 22.II (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al camp de futbol el 3.IV (RMXH); (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 10.IV (RMXH); darrera citació prenupcial (F).

Torrelles de Llobregat 1 ex. a la riera el 21 i 22.III (VRVA i JMXC); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 31.III (XLBA); (G).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 9 (FMVA) i l'11.III (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 8 i el 15.IV (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra Diverses observacions als Salats i Muntanyans: 2 exs. el 8.II (PABA); (G). 1 ex. el 8.III (AVDA i JVDA); (G).

Porzana parva

Rasclotó

Estatus Regular en migració, però escàs, més conspicu al pas prenupcial. Hi ha hagut casos d'exemplars estiujants a la dècada dels 80 al delta del Llobregat, on ha nidificat excepcionalment els darrers anys. No existeixen evidències de la seva hivernada recent.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle a les cel·les de l'estany Europa el 7.III (AOTA i ABRA); pri-

mera citació prenupcial (E, F). Un total de 4 exs. en tota la migració prenupcial (PAEB); (E, N). Una femella a la closa d'en Puig el 6.V (AOTA); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a Riet Vell: 2 mascles el 7 (PHXA, JBAB, LEEA i IRXA) i el 9.III (ISSB, JBAB, JFOB, ECRA i ALTA); primera citació prenupcial (E, F). Un mínim de 4 mascles i 2 femelles durant la migració prenupcial (JFOB, JBAB, CJMA, VPXB, NPXC, LPXJ, JTXG, EHXA, MGXJ, JTOA, RSBB, LEEA, REEA, RGBA, AGGC i MVVA); (E, N). Una femella l'1.V (RGBA, HAXA, GGAB i AGAC); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a la Vidala, capturat posteriorment per a l'anellament l'11.III (MGTA i JCMC); (E).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle a la desembocadura de la Tordera el 26.III (XRCA); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17 i el 19.IV (PGXF); (E). Una femella el 29.IV (SBXC, CCXD, FLSA, NUTA, EDBB, PFXD i ATXD); (E).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys del 10 (AGRB i JMOB) al 20.IV (MCXE); (E).

Porzana pusilla

Rasclet

Estatus Nidificant molt rar i irregular. No hi ha evidències recents ni de la seva reproducció ni de la hivernada. Migrant regular, però molt escàs, més nombrós al

pas prenupcial, amb algunes dades homologades pel CAC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al Cortalet el 21.IV (AOSA); (G). 1 ex. a la closa del Puig l'11.VII (MJXC); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 26 (JBAB i PGXF) i el 27.IV (JBAB, RGBA, AGGC i ALTA); (G). 2 exs. a l'Alfacada entre el 10 i el 19.IV (JBGC); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el 2.IV (FARB); (G). No tramesa al CAC.

Crex crex

Guatlla maresa

Estatus Migrador molt rar i hivernant excepcional. Hi ha diverses dades homologades. Es reproduïx des del nord-oest d'Europa fins al nord-est de la Xina i el centre de Sibèria, i hiverna al sud-est de l'Àfrica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la platja dels Eucaliptus el 26.IV (JTOA i RSBB); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. creua la passeira del sabogal el 26.VI (JFOD); (G). No tramesa al CAC.

MARESME

Mataró Un mascle ingressa al CRFS de Torreferrussa provinent del parc de can Marchal el 16.IV. Presenta fractures irrecuperables i mor al poc temps (APVB); (G). No tramesa al CAC.

Gallinula chloropus

Polla d'aigua

Estatus Resident i nidificant molt comú arreu del territori, que pot fer moviments de diversa consideració segons els nivells d'aigua on habita. Migrador i hivernant regular, tot i que és difícil que es detecti entre el nombrós contingent sedentari.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=76).

Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=83).

Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 112 exs. el 7.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Pollets a la bassa de la Draga el 14.V (CFQA); primera dada de polls de l'any (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 15-20 parcelles nidificants (JEBa); (R, N).

SEGRIÀ

Lleida 161 exs. al riu Segre el 18 i 19.I (ESMA, EFSA, JPXM, RRJB i CRSa); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 127 exs. a l'aiguabarreig Besòs-Ripoll l'11.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Porphyrio porphyrio

Polla blava

Estatus Població resident, inicialment introduïda a l'Alt Empordà, que s'ha anat expandint i fins i tot ha produït moviments cap a França, tot i que després ha patit una contracció, essent en l'actualitat molt escassa. Al delta de l'Ebre hi ha també una població resident que ha colonitzat recentment la zona de forma natural, probablement per exemplars provinents del sud i que ha augmentat de forma espectacular, amb centenars d'ocells presents avui dia; molt més localitzat i escàs al delta del Llobregat, on és regular.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Mínim de 9 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant estimada en 17 parcelles (JMAA); (R, N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix del 27.V (CGGA, PTEA, FCFA i XPCA) fins a finals d'any (CGGA, XBGA i HSCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Uns 230 exs. en 3 camps a Riet Vell el 29.XII (RBVA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals Alguns exs. observats al golf Serres de Pals durant tot l'any (CBLA); nou quadrat UTM 10×10 de reproducció possible (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 20 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. amb 2 polls d'unes dues setmanes als calaixos de depuració el 20.III (FLSA); primers polls de l'any (R). 6 parcelles nidificants (FLSA); (R, N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 6 exs. el 17 i 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3-5 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 3 exs. al meandre el 14.I (PJMB); primera citació de l'any (F). 1 ex. a la llacuna el 25.IV (PJMB); darrera citació de l'any (F).

SEGRÀ

Torres de Segre 1-2 exs. a l'embassament d'Utxesa entre els mesos de març i juny (JGGD); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la torre d'en Dolça: 1 ex. el 6.I (ACTA, AMOA i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex el 4.V (ACTA i MPSA); darrera citació prenupcial (F).

Porphyrio alleni**Polla blava d'Allen**

D'homologar-se aquesta citació, seria la primera per a Catalunya.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un juvenil als estanys del Matà del 12 al 24.VIII (JMAA, AOTA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Fulica atra**Fotja vulgar**

Estatus Resident i nidificant comú a totes les zones humides catalanes, encara que siguin de dimensions reduïdes. Migrant i hivernant comú a totes les zones humi-



des del territori, amb el principal contingent al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés, Port de la Selva, del 16.III al 16.IV (PFLB); (G).
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 191 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 38 parelles (JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 30.960 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 605 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 parelles amb pollets als calaixos de depuració el 12.III (FLSA); primera dada de polls de l'any (R). 71 parelles nidificants (FLSA); (R, N).

OSONA

Gurb Un jove o 1r hivern al Reixac, riu Gurri, el 7 (RJNA) i el 8.VIII (RJNA i MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 325 exs. a l'estany el 13.I (CFQA, JBVB, JSXJ, MCLA i PCSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 30-50 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. als entorns del riu Besòs entre el 5 i l'11.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Fulica cristata**Fotja banyuda**

Estatus Visitant ocasional al delta de l'Ebre. Va ser introduït al delta del Llobregat l'any 2003 i hi va arribar a nidificar de forma accidental. Actualment manté observacions regulars dels exemplars introduïts, sense que hi nidifiquin. També hi ha dades en altres zones, inclosa el delta de l'Ebre, de la presència d'exemplars introduïts a les comarques valencianes.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyisada entre el 4 (CJMA, JTTE i ALTA) i el 12.I (PGXF i JXXA); (G). 1 ex. a Canal Vell entre el 9.III (JTOA i RSBB) i el 20.IV (JBAB, LEEA i FRXD); (G). 1 ex. a la Tancada el 3.V (JLGA); (G). 1 ex. sense marques al Clot entre el 7 (JTOA i RSBB) i el 24.V (ISSB, CJMA i ALTA); (G). No tramesa al CAC. 1 ex. amb collar al Clot el 23.IX (MGTA, JBAB i ALTA); (G). 1 ex. amb collar a Canal Vell el 13.X (PJAA i CJMA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Es continua observant als calaixos de depuració entre l'1.II i el 30.VI 1 ex. amb collar blanc i codi UT on fins i tot arriba a fer un parell de nius (RSPA, JCPA, FLSA i DMMB); (G). 1 ex. sense collar a la Vidala des del 17.VII (JLGA) fins el 2.XII (FLSA); (G). No tramesa al CAC.

Grus grus**Grua**

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, més comú al pas postnupcial. Hivernant ocasional.

El 2008 s'han rebut 70 citacions corresponents a 1.501-1.506 exemplars, dels quals 1.173 van ser detectats durant el pas prenupcial en un total de 47 citacions i la resta al pas postnupcial. Aquests nombre i els que es van obtenir l'any 2007 (Anton 2008) indiquen que l'hivern 2007-2008 es va comptabilitzar un dels majors nombres de grues que s'han documentat els darrers anys al nostre país durant aquest període de l'any.- MARC.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 11 exs. sobrevolant el puig de Calmelles el 8.XI (JBRC); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 8.I (JMAA, AOTA, TMJA, ECFA, BMBA i ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Mínim de 288 exs. en pas a la RNI II el 4.III (BMBA, ECFA, AOTA i JMAA); (N). 7 adults i 2 juvenils a Tres Ponts el 4.IV (RBBC, DOOA, RAAA, JAAB, PBBC, JBBC, BAAB, CAAB, DBBA, SHHA i FHHA); darrera citació prenupcial (F).

Rabós 135 exs. a coll de Playa el 21.III (MBFA); màxim prenupcial (N).

ALT URGELL

Oliana 13 exs. al tossal de Carissols el 12.VII (FSVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. a l'Alfacada (JBGC) i 8 exs. a la

gola de Migjorn el 24.III (VPXB, NPMC i CJMA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels pollancrel el 23.III (JCMC); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 94-96 exs. sobrevolant el volcà Cros-cat el 30.VIII (MNPA); primera citació postnupcial (F, N).

OSONA

Malla 66 exs. prop de Torrellebreta el 4.III (JBCB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Esterrí d'Àneu 1 ex. aturat en un prat de dall a la mollera d'Escalarre i el prat de Santa Maria entre el 4 i el 5.IV (EVAA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 4 exs. el 15.IX (ERVA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 3 exs. a l'embassament d'Uttxesa el 18-19.I (MGMA, RGXF, QGXA, MTXB, CSXD, LCBB, JBSA, CMXA, BIPA i JCMG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un estol d'uns 40 exs. volant sobre Salardú en formació en V, dels quals 2 exs. es posen en un prat a la sortida del poble de Gesa el 26.III (XNPA); darrera citació prenupcial (F).

Tetrax tetrax

Sisó

Estatus Resident nidificant localment comú a la depressió de l'Ebre, amb moviments

hivernals dins de l'àrea que el porten a sectors on no nidifica. Rar a la resta del territori com a hivernant i en migració.

Al 2008 sorprèn la quantitat de citacions fora de l'àrea de cria habitual de l'espècie. Les corresponents als mesos de març, abril, octubre i, possiblement, la de novembre, cal considerar-les d'exemplars migrants, probablement originaris de la població francesa (Cramp 1980, García de la Morena *et al.* 2006). La del mes de juny a l'Empordà és de difícil interpretació, mentre que el mascle d'Osona al juliol es situaria en el període de dispersió postnupcial. Cal destacar que al parc del Foix es registra la primera observació des del 1972 (Bayer *et al.* 2009) i que a l'Anoia, malgrat les observacions continuades durant el període de nidificació en un hàbitat adequat, no es pot assegurar la reproducció i, possiblement, es tracta d'un mascle territorial que no ha tingut accés a cap femella. - MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=17).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -32% (*, n=13).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Fortià 1 ex. en uns guarets el 25.VI (RFRA); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 mascles en vol als estanys del Matà el 13.IV (AOTA, TMJA, ACJA, MBFA i JMAA); (G). Un mascle als conreus del mas Bellesguard el 25.IV (AOTA); (G). 1 ex. a l'estany Pallejà el 22.X (GDBA, JBCD, GBXA i RDXB); (G). 1 ex. a la platja de can Comes el 12.XI (GSSA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en vol sobre la

cua de l'embassament del Foix el 9.III (MPMB); (G).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós Diverses observacions a Millars: una parella a mitjans del mes de maig. Un mascle que semblava mantenir un territori la resta d'aquest mes i tot el mes de juny (XSPA i CRAB); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

BAIX CAMP

Reus Un mascle cantant a l'aeroport el 13.IV (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar el 16.X (MGVA i MRFB); (G).

OSONA

Folgueroles Un mascle a can Paiàs l'11.VII (SBXD); (G).

PLA D'URGELL

Linyola 866 exs. a Linyola el 30.I (XLBA); (N).

URGELL

Preixens 33 exs. al SOCC 92, secà de Montgai, el 22.IV (JEBA); (N).

Otis tarda**Pioc salvatge**

Estatus Accidental. Alguna dada homologada pel CAC. Es distribueix pel nord del Marroc, part de la península Ibèrica, Alemanya, Hongria i el sud d'Ucraïna.

MONTSIÀ

Ulldecona Es troben les restes d'un ex. mort a sota d'una línia elèctrica d'alta tensió a la ZEPA de la serra de Godall el 25.VI (LPXI i MCB); (G, B). Homologada pel CAC.

Haematopus ostralegus**Garsa de mar**

Estatus Estival nidificant escàs al delta de l'Ebre, única localitat on es pot veure regularment tot l'any. Recentment intents de nidificació al delta del Llobregat, on encara no ha consolidat la cria. Regular en migració, però escàs, al litoral. Hivernant irregular i rar a les zones on no nidifica.

La cria al delta del Llobregat constitueix la primera dada de cria en aquest espai (López 2008b) i representa el primer indicatiu de nidificació segura d'aquesta espècie fora del delta de l'Ebre, única localitat de cria segura que es coneix al conjunt de Catalunya (Estrada *et al.* 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'illa de Caramany el 17.II (JSVA i ASLB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de Sant Pere Pescador el 2.VI (AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 19.VIII (JMAA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. en vol per la platja de can Comes el 29.IX (RBVA i SSXC); darrera citació postnupcial (F).

Roses 1 ex. a l'espigó de Santa Margarida el 31.III (JAXB i AGXD); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 13 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a la Platera el 8.III (ABRA i JXCJ); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. l'1.III (CFXB i XLBA); primera citació prenupcial (F). Un adult covant en un niu que segurament és depredat per gavines, entre el 20 i el 22.V (FLSA); primera dada històrica de reproducció en aquest espai natural (R). 1 ex. el 4.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. volant ran de costa en direcció nord-est el 20.II (PABA i EBMA); (G, F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 12.V (ACTA i CAFA); (G, F).

Himantopus himantopus

Cames llargues

Estival Nidificant estival regular, molt nombrós al delta de l'Ebre, moderat als aiguamolls de l'Empordà i delta del Llobregat i escàs a la resta de zones humides, tant de l'interior com del litoral. Migrant regular i nombrós per totes les zones humides del territori. Hivernant escàs.

Dins el període de migració prenupcial cal destacar la primera observació força primerenca al febrer, la concentració al pla d'Urgell i l'allargament del pas fins la primera meitat del juny, tal i com indiquen els exemplars de Flix. Les observacions a sectors on no nidifica durant la segona meitat del juny s'emmarcarien més en un patró de dispersió posterior a la reproducció. Respecte a la migració postnupcial, és remarcable la dada d'Allella, atès que les darreres citacions es recullen habitualment al delta del Llobregat i de l'Ebre. Continua la hivernada en baix nombre al delta de l'Ebre, i

també la reproducció a l'estany d'Ivars i Vilasana i a la conca del Besòs, amb una aportació simbòlica dins el global de parelles nidificants a Catalunya, però que confirma tímidament el procés d'expansió areal de l'espècie (Estrada et al. 2004).- FMVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 60 parelles (JMAA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a la cua de l'embassament del Foix: 3 exs. el 15.VI (PTEA); citació estival (F). 5 exs. el 22.VII (CGGA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, F). 1 ex. a l'illa de Buda el 29.XII (RBVA i SSSA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. a la platja l'1.III (PFLB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma del Remolar el 23.II (IIRB); primera citació prenupcial (F). 74 parelles nidificants (FLSA); (R). 1 ex. a la maresma del Remolar el 25.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella 1 ex. sobrevolant el nucli urbà a la 1:00 el 22.XI (SGRA); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 9 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 13.III (CFQA, JBVB, MVXB i RCXA); primera citació prenupcial (F).

Porqueres 7 exs. a la llacuna de can Margarit el 26.VI (CFQA); primera citació postnupcial primerenca (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una parella nidificant (JEBa); (R, N). 199 exs. l'11.IV (SSAA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Flix 5 adults remuntant el riu Ebre el 9.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRÀ

Lleida 3 exs. als aiguamolls de Torreribera el 13.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers-Montmeló Un màxim de 13 parelles amb comportament reproductor, de les quals 9 arriben a posar ous i únicament 2 tenen èxit reproductor amb una llocada d'un i dos polls respectivament. La resta fracassa per molèsties humanes (FMVA); (R).

Martorelles 4 parelles amb comportament reproductor al riu Besòs que no arriben a nidificar a causa de l'eliminació de l'àrea de cria de l'any anterior per les obres de l'AVE (FMVA); (R).

Recurvirostra avosetta

Bec d'alena

Estatus Resident i nidificant relativament abundant al delta de l'Ebre, on roman tot l'any i hi ha una població hivernant considerable. Nidificant recent i escàs al delta del Llobregat. Migrant escàs, però regular, a les zones humides on no nidifica, al litoral, i més rarament als aiguamolls de l'interior. Hivernant regular escàs als aiguamolls de l'Empordà, i molt rar i irregular en la resta d'àrees. Alguns hiverns varia el

nombre segons la cruesa de les temperatures.

La cria al delta del Llobregat constitueix la primera dada de cria en aquest espai (López 2008b) i representa el primer índex de nidificació segura d'aquesta espècie fora del delta de l'Ebre, única localitat de cria segura que es coneix al conjunt de Catalunya (Estrada *et al.* 2004).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany d'en Pericus el 8.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). 8 exs. als arrossars de la Gallinera el 14.VI (GDBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 31.VII (JMAA); primera citació postnupcial (F). 13 exs. a la Massona el 9.IX (AOTA); màxim anual i darrera citació postnupcial (N, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.223 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 8 exs. a la platja el 7.VI (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 3 exs. el 9.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 13 exs. el 27.VI (FLSA); màxim prenupcial (N). Una parella covant al niu el 13.V (ARMC i SBXC); primera dada històrica de reproducció en aquest espai natural (R). 3 parelles amb polls el 18.VI (FLSA); primers polls detectats (R). 3 parelles nidificants segures i una parella possible (FLSA); (R). 13 exs. el 3.IX (RMXH); màxim postnupcial (N). 2 exs. sobre el mar en direcció sud a la platja del Prat el 4.XII (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 3.X (XLBA); (G).

TARRAGONÈS

Salou 7 exs. en vol direcció nord al cap de Salou el 2.VIII (ACTA i ISAA); (G, F).

Torredembarra Diverses observacions als Salats i Muntanyans: 1 ex. el 20.VIII (AVDA, EBRC i JVDA); (G). 1 ex. el 17.IX (ACTA); (G).

***Burhinus oedicephalus*****Torlit**

Estatus Resident nidificant a la depressió Central i rodalies, a l'Empordà i a un petit nucli a la Cerdanya compost per unes poques parcel·les. Pot comportar-se com a migrador parcial. Migrador i hivernant, de forma local al litoral, i més àmpliament distribuït a l'interior.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=27).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Garriguella 318 exs. a les vinyes de mas Hortús el 15.I (ECFA); (N).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 6 exs. en un camp llaurat al costat del polígon de Roca el 31.X (RJRA); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 147 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. prop d'Amposta el 25.X (ISSD i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hiber-

nants (N). Es detecten, com a mínim, fins el 4.III (EPXE i FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 24.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. durant la nit al parc zoològic el 5.IV (JGGD); (G, F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 2 exs., un d'ells covant ous a Mosqueroles el 12.IV en un camp que es va llaurar més tard perdent-se un mínim de 2 ous (ADGA); (R). 3 exs. a Sangosta el 28.IX (ADGA i MGSA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. al coll de les Gargantes el 16.III (JEPB i MMSC); darrera citació prenupcial (F).

Torelló 3 exs. als camps al sud de Rocaprevera el 26.II (RACA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries 4 exs. a les planes del Mariner el 19.X (JVNA); (G, F).

SELVA

Caldes de Malavella Una parella amb un poll als plans de Caldes el 31.VII (ADGA);

nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Vilobí d'Onyar Una parella amb un poll de poques setmanes el 15.VII (ADGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 6 exs. a Gallecs el 3.XI (FMVA); màxim anual (N).

Montcada i Reixac 1 ex. el 3.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Esteve de Palautordera 1 ex. volant sobre el castell de Montclús el 13.III (RGLA); primera citació prenupcial (F).

Glareola pratincola

Perdiu de mar

Estatus Migrador escàs, sobretot al litoral, i més rara a l'interior. Actualment estival nidificant regular només al delta de l'Ebre, on encara nidifica colonialment de forma localitzada, tot i que amb un contingent no gaire nombrós. Nidificant irregular al delta del Llobregat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als estanys del Matà: 3 exs. el 9.IV (AOTA, PFLB, OCVA, RSSC i AFXF); primera citació prenupcial (F). 13 exs. el 22.IV (LSLB, PPXE, PGXA i JMAA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 10.VI (TSXB); possible darrera citació prenupcial (F). 4 exs. el 27.VI (AOTA i JMAA); possible primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 31.VII (AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. en migració direcció nord el 15.V a l'aeroport (ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Garxal el 2.IV (JBAB i ABBG); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 6.IV (MGVA); primera citació prenupcial (F). 30 exs. el 2.V (VSXA); màxim anual (N). Una parella amb un niu amb 2 ous el 16.VI (FLSA i STVB); primera dada de reproducció de l'any (R). 2 parelles nidificants (FLSA); (R).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. al Remei, veïnats de Sangosta, el 12.IV (ADGA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un adult aturat a la barra de sorra de la desembocadura de la Torreda el 22.IV (PABA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'11.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); màxim anual (N). 4 exs. el 2.VI (ERVA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 10.IV (AGRB, LMMA, JMOB i CSPA); (G). 1 ex. el 24.IV (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 10 i el 12.IV (ACTA, CAFA i MPSA); (G).

Charadrius dubius

Corriol petit

Estatus Estival nidificant a zones humides i cursos fluvials, tot i que no repartit de forma homogènia per tota Catalunya. Migrador regular i comú per tot el territori. Hivernant escàs en zones humides de la depressió Central, al delta de l'Ebre i puntualment en alguns punts del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Continuen els 2 exs. detectats el 13.XII.07 als estanys del Matà com a mínim fins el 13.II (PBGA i JBOL); citació hivernal (F). Població nidificant avaluada en 12 parelles (AOTA, JGIA, XCSA i JMAA); (R, N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal No s'ha comprovat la seva nidificació a la cua de l'embassament del Foix, segurament a causa de les molèsties humanes (CGGA, XBGA i HSCA); (R).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 25.II (ACTA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. a l'estany de Pals el 6.I (ABRA i JCXJ); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 35 exs. a la maresma del Remolar el 29.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). 63 exs. a la platja de ca l'A-rana el 21.VIII (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Una parella cria a la platja del Camp de la Bota (RRSB); (R).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. en un solar industrial el 6.IV (FTCA); (F).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. a la desemboca-

dura de la Tordera el 23.V (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Cornellà de Terri Una parella criant amb 3 pollets de 2 o 3 dies en una zona de conreus i boscos amb moviments de terres per les obres del tren d'alta velocitat l'11.VII (PFLB); (R).

Porqueres 1 ex. a la llacuna d'en Margarit el 27.II (JBVB); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 38 exs. el 28.III (AVPA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Soses 3 exs. al pantà del pla de les Trotes el 19.II (MGMA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 28.II (JVLA); primera citació prenupcial (F). 25 exs. el 4.V (DCFB i XRCA); màxim anual (N). 1 ex. el 17.V (ADGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 25.X (EGTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 7.I (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l'1.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Charadrius hiaticula

Corriol gros

Estatus Migrador regular i força comú a les zones humides del litoral, especialment al pas prenupcial, i més escàs a les de l'interior. Hivernant variable, però regular, al delta de l'Ebre, i més rar o ocasional a altres zones humides. Va criar al delta de l'Ebre el 1994.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a les closes de Sant Joan el 17.VII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 308 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Diverses observacions al mas de la Pageda: un mínim de 70 exs. el 2.V (JPCA); (N). 1 ex. el 21.VI (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l'Arana l'1.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 160 exs. a la maresma del Remolar el 2.V (MGVA); màxim anual (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 16.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. el 29.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar Un juvenil a la platja el 5.X (JSPC i CPMB); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 10.III (CGPC); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.III (GBCA); primera citació prenupcial (F). 22 exs. l'11.V (EFSA); màxim anual (F, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. al meandre el 23.IV (PJAA); (G).

SEGRIÀ

Aitona 5 exs. als arrossars del Fondo de la Llitera el 19.I (MRB i RGXF); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 22.VII (ACTA); primera citació postnupcial (F).

Vila-seca 3 exs. a la platja dels Prats el 31.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Charadrius alexandrinus

Corriol camanegre

Estatus Resident nidificant local en algunes zones litorals. Al delta de l'Ebre és un nidificant molt comú, on manté la principal població ibèrica. Així mateix, és un migrador regular i comú pel litoral, amb presència d'estols hivernants, regularment de forma local, i molt més nombrosos al delta de l'Ebre. Ocasional a l'interior, durant els passos.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 2, mancances.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 16 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 26-28 parelles (AOTA, JGIA, XCSA i JMAA); (R). Un niu amb

posta completa a la Rubina el 31.III (AOTA i JGIA); data de posta molt primerenca (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 468 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 9 exs. el 5.III (FLSA); primera citació prenupcial segura (F). 22 parelles nidificants segures més 6 parelles probables (TMPA); cens de nidificants de l'espècie (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 22.IX (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 8.IV (PABA); primera citació prenupcial (F).

Premià de Mar 1 ex. a la platja el 5.X (JSPC i CPMB); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 16.IV (JEBBA); (G, F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 12.IV (ACTA i MPSA); primera citació prenupcial (F).

Torredembarra 2-3 parelles nidificants als Salats i Muntanyans el 20.VIII (AVDA); (N, R).

Charadrius morinellus

Corriol pit-roig

Estatus Estival nidificant, molt escàs i localitzat, en alguns massissos pirinencs, enca-

ra que regular sempre que l'excés de neu no impedeixi la nidificació. Migrador molt escàs però regular, que es pot veure de forma local en algunes àrees adients, que semblen tradicionals per a aquesta espècie, especialment al pas postnupcial. Hivernant molt rar i irregular a l'interior de Catalunya.

BAIX CAMP

Reus 2 joves i 5 adults a l'aeroport el 27.VIII (ABBB); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Belcaire d'Empordà Diverses observacions a Sobrestany: Un mínim de 8 exs. sedimentats el 6.IX (JPCA); (E). 2 juvenils l'11.IX (JPCA); (E).

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la Rajoleria el 30.VIII (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions als camps de la Ricarda: 9 exs. el 3.IX (RBVA); (E). 7 exs. el 4.IX (FLSA i ARMC); (E). 3 exs. el 24.IX (RBVA); (E). 1 ex. el 29.X (RBVA); (E).

CERDANYA

Meranges 2 adults, 2 juvenils i 1 ex. d'edat indeterminada al Puigpedrós el 28.VIII (LTBB); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex., probablement femella, a Serinyà els dies 10 (ADGA i MGSA) i 11.VIII (JGPA i GDBA); primera citació postnupcial a Catalunya (E, F).

NOGUERA

Balaguer 24 exs. al secà el 26.VIII (MPOA); (E, N).

OSONA

El Brull 1 ex. als ginebrars del Matagalls el 13.IX (MCSB); (E).

RIPOLLÈS

Querallbs 1 ex. al Puigmal el 2.V (ERRB); primera citació prenupcial (E, F).

Setcases 2 adults al pic de la Dona el 31.VIII (JPMC i JBDA); (E).

SEGRITÀ

Alfès Continuen un mínim de 8 exs., dels 13 detectats el 2.XII.2007, fins el 2.IV (MGMA); darrera citació prenupcial (E, F, N). 20 exs. el 3.IX (PPXD); (E, N). 18 exs. el 24.IX (JBGA); (E, N). Un juvenil a la timoneda el 28.IX (ASPA); (E). 4 exs. el 22.XI (MVCA, DDDA, FHXA, CLXA, EGXI i JRGB); darrera citació postnupcial a Catalunya (E, F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions a Gallecs: 2 exs. el 18 i el 22.VIII (FMVA); (E). 2 juvenils el 28.VIII (FMVA); (E). 2 adults i 2 juvenils el 30.VIII (JBDA); (E). 2 juvenils l'11 i el 13.IX (FMVA); (E).

Pluvialis apricaria

Daurada grossa

Estatus Hivernant regular i nombrós localment, que també es pot veure en migració en àrees on no hiverna. Més comú a les planes litorals, com l'Empordà, delta del Llobregat i delta de l'Ebre, i més escàs a la depressió de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 126 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 14.III (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.086 exs. entre el 6 i el

16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'Alfacada el 24.III (JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 986 exs. el 13.I (ABRA, JCXJ i DBRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 220 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Roc el 28.III (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 26.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Sant Andreu de Salou 1 ex. al veïnat de Baix el 14.XII (ACHA); (G).

SEGRITÀ

Alcarràs-Alpicat 260 exs. als pantans del plans del Xama i de Lleida el 19.I (FFCA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 20.I (SEOB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. als camps de Santa Agnès de Malanyanes els dies 29 i 30.XI (JMOB); (G).

Pluvialis squatarola

Pigre gris

Estatus Migrador regular, tot i que no especialment comú, sobretot al litoral, i molt més escàs a l'interior. Hivernant comú al delta de l'Ebre, principal àrea de Catalunya, regular però escàs als aiguamolls de l'Empordà, i ocasional a les zones humides de la depressió de l'Ebre. Al delta de l'Ebre hi ha també individus estiuejants en

nombre reduït, la qual cosa fa que es pugui veure pràcticament tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 15 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 953 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 13 exs. el 28.IV i el 27 i 29.V (FLSA); màxims anuals (N). 3 exs. l'11.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 18.IX i el 3.X (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 30.IX (XRCA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 6.XI (CAFA); (G).

Vanellus gregarius

Fredeluga gregària

Estatus Accidental a l'hivern. Diverses dades homologades. Es pot trobar com a reproductor al sud de Rússia i al Kazakh-

tan, i com a hivernant al Sudan i Eritrea, Israel, Aràbia, Pakistan, i el nord-oest de l'Índia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 19.X (GDBA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Pals Diverses observacions als arrossars: 1 ex. del 25.X al 31.XII (JPCA i JCMF); (G). Un segon ex. en companyia de l'anterior del 8 al 10.XI (ABRA i AOTA); (G). No tramesa al CAC.

Vanellus vanellus

Fredeluga

Estatus Nidificant puntual i en molt baix nombre a Catalunya. Migrador i hivernant comú a les planes agrícoles de tot el territori. Presència d'individus estiuejants irregularment en algunes zones humides, sense que arribin a nidificar, i d'exemplars a l'estiu, potser en dispersió després de la nidificació, abans de l'entrada general dels hivernants, en zones concretes de la depressió Central o els aiguamolls de l'Empordà, on sembla que arriben per mudar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5.627 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 2-3 parelles (JMAA i AOTA); (R).

BAGES

Cardona 1 ex. a la Coromina el 20.VI (RBVA i DGCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 15.946 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hiver-

nants (N). 1 ex. a la finca la Palma el 4.VII (CJMA i ISBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7.782 exs. el 13.I (ABRA, JCXJ i DBRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

Torroella de Montgrí A finals de maig i començaments de juny s'observen vols territorials al mas de la Pageda amb un màxim de 6 exs. el 7.VI. Posteriorment es registren 2 adults i dos pollets de dies el 14.VI, 5 adults i un pollet de dies el 21.VI i 4 adults i un pollet de dies el 22.VI (JPCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 10.IV (FLSA); possible darrera citació prenupcial (F). 1 ex. coix a cal Tet i ca l'Ayola entre els mesos de juny i setembre (FLSA); individu estiuejant (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Reixac, riu Gurri, el 7.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva el 13.IV (AGRB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. als camps d'Escarlà el 5.XI (JSNA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. a la mollera d'Escalarre el 29.VIII (PABB); primera citació postnupcial (G, F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2.000 exs. entre el 17 i el 19.I (JEBA, GBCA, TCXB, RGXF, AVPA, CMXA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una parella nidificant (JEBA); (R, N).

SEGRÀ

Lleida 2.250 exs. als embassaments de Sucs el 15 i 19.I (MGMA, RGXF, JAXB, JBSA, CMXA, i FFCA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SILVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 12.IV (MVCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.VII (MVCA i FHVA); primera citació postnupcial (F).

Calidris canutus

Territ gros

Estatus Migrador regular, però escàs, al litoral, i molt més escàs a l'interior. Més freqüent al pas prenupcial. Hivernant ocasional al delta de l'Ebre, en baix nombre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions a la platja de can Comes: 1 ex. el 14.V (AOTA i JGIA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 19.V (AOTA, JGIA i JMAA); màxim prenupcial (F). 1 ex. el 30.V (AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el 9.IX (GDBA); primera citació postnupcial (F). Un juvenil a la Rogera el 22.IX (JMAA); possible darrera citació postnupcial (F). 1 ex. de 1r hivern a la Rogera des de l'11.XI (ABRA, AOTA, JVLA, BMBA, ECFA, JGMD i JMAA) a l'1.XII (JMAA); possible darrera citació postnupcial o citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 7 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 2 exs. el 28.IV

(FLSA); primera citació prenupcial (F). 14 exs. l'11.V (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 3.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. des del 18.VIII fins el 25.VIII (FLSA); única citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 8.III (AVDA i JVDA); (G).

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el l'11 i el 12.V (ACTA i CAFA); (G).

Calidris alba

Territ tresdits

Estatus Migrador freqüent i regular pel litoral, especialment al pas prenupcial. Hivernant regular al delta de l'Ebre, i hivernant irregular en altres localitats del litoral. Accidental, o molt rar, a l'interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la platja de can Comes l'11.VI (AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil a la Massona l'11.IX (AOTA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. a la platja de can Comes el 14.XII (AOTA); màxim anual (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la platja el 9.I (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 651 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgri 3 exs. a la platja del Cul de les Senyores el 31.V (JPCA); (F, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: màxim de 70 exs. l'11.V (XLBA); màxim anual (N). 4 exs. el 4.VI (FLSA i FSEB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDES

El Vendrell 1 ex. a la platja de Sant Salvador el 22.XII (FMVA); (G).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 7 exs. a la platja de Ribes Roges el 19.IV i el 10.V (VPRA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 10 exs. a la desembocadura de la Tordera el 12.V (EBMA); (G).

Premià de Mar 1 ex. a la platja el 5.X (JSPC i CPMB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 12.IV (ACTA i MPESA); (G).

Calidris minuta

Territ menut

Estatus Migrant regular i comú per tot el territori. Hivernant regular i nombrós al delta de l'Ebre, on manté una de les principals poblacions hivernals europees, i molt més escàs o irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-

pardà 12 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6.346 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al Trabucador el 13.VII (RGA, HAXA, GGAB i AGAC); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 7 exs. a la bassa del golf Serres de Pals el 6.VIII (CBLA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 2 exs. el 6.II (SGBB); primera citació prenupcial (F). Màxim de 100 exs. l'11.V (XLBA); màxim anual (N). 2 exs. el 16.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 25.VII (FSEB i JGMB); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a can Dimoni el 2.XII (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Vicenç dels Horts 3 exs. al riu Llobregat el 16.I (SSAA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 8.I (XLBA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 12.V (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 19.III (DCFB); única citació prenupcial (F). 3 exs. el 29.VII (TMXC); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port: 1 ex. el 27.VII (ACTA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 18.X (ACTA); darrera citació postnupcial (F).

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 31.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Calidris temminckii

Territ de Temminck

Estatus Migrador regular, però escàs, per les zones humides tant del litoral com de l'interior. Hivernant molt escàs, però darrerament regular, al Segrià i al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als estanys del Matà: 1 ex. el 4.IV (JMAA); primera citació prenupcial (F). 21 exs. el 4.V (AOTA, MLMB i ABRA); màxim anual (N). 1 ex. el 18.V (JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial (F). Un adult el 20.VII (JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als arrossars de l'Illa de Riu el 14.V (CJMA, ISSB, CSSB i CSSC); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. als arrossars de Riet Vell el 26.VII (RRXD); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. en un camp inundat el 21.IX (JPCA); (G).

Pals 2 exs. als aiguamolls de Boada l'1.V (JPCA); (G). Diverses observacions als arrossars: 1 ex. l'11.V (JPCA); (G). 2 juvenils el 19 i 20.IX (AOTA i ABRA); (G). Un juvenil el 23.IX (AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abreira 1 ex. al riu Llobregat l'11.VIII (XLBA, FSJA i LPXE); (G).

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 4 exs. el 26.II (PBGA, JBOL i FLSA); primera citació prenupcial (F). 9 exs. l'1.V (JCMC); màxim anual (N). 1 ex. a cal Roc el 17.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 16.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. a la maresma del Remolar el 22.XII (RBVA); darrera citació de l'any (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 7.VIII (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.V (EBMA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 4.IV (MPLA, SSAA i EMXC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació prenupcial (F). Un adult el 16.XI (RBVA); única citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 16.V (ACTA i CAFA); (G).

Calidris melanotos**Territ pectoral**

Estatus Accidental que gairebé és regular anualment. Diverses citacions homologades. La seva distribució s'estén pel nord de Sibèria, d'Alaska i del Canadà, i com a hivernant al sud d'Amèrica del Sud, Nova Zelanda i el sud-est d' Austràlia.

L'observació de diferents exemplars al PNAE i en diferents localitzacions dins del parc,

fa que com a mínim es puguin diferenciar els anteriorment esmentats per diferències estructurals o de coloració, però és més que probable que alguns individus diferents/hous, hagin quedat exclosos per no ser fiable la seva separació.- PNAE.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà de l'1 al 4.V (JFOB, JAGB, AOTA, PSGA, TMJA i ALTA); (G). 3 juvenils als estanys del Matà del 7 al 25.IX (JMAA, AOTA i ALTA); (G). 3 juvenils als prats d'en Senillosa els dies 12 i 13.IX i posteriorment als estanys del Matà del 16 al 25.IX (PSGA i ALTA); (G). Un juvenil als estanys del Matà del 15 al 19.X (JMAA, RGBA i ALTA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als arrossars del mas de la Comandanta del 5 (JAGB) al 7.I (APXK, AGXF i CJMA); (G). Entre 1 i 2 exs. a la badia dels Fangar del 9 (MLMB) al 18.II (JFBB); (G). 1 ex. en un arrossar vora el bar els Bascos el 20.II (RGBA); (G). 1 ex. a l'Alfacada el 20 i el 26.IV (JBGC); (G). Diverses observacions a Riet Vell: 1 ex. entre el 26.VII (RRXD) i el 12.VIII (JTOA i RSSB); (G). 2 exs. el 13 (JTOA i RSSB) i el 14.VIII (CJMA i JCN); (G). 1 ex. el 15.VIII (CJMA); (G). 2 juvenils el 6.IX (MGTA, MTBA, JBGC, JBXO, DOCA i VETA); (G). 4 exs. el 13.IX (MRFA, EYYA i ISSB); (G). 1 ex. a un arrossar vora Sant Jaume d'Enveja el 23.IX (RLLB, ISSB, JCMG i ALTA); (G). 4 exs. en un arrossar vora l'Alfacada el 29.IX (CJMA i ISSB); (G). No trameses al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgri 2 exs. el 18.V (JPCA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar el 25.III (JCMC); (G). No tramesa al CAC. 1 ex. a la platja de ca l'Arana des del 13.VII (RBVA) fins el 18.VIII (FLSA); (G). Homologada pel CAC. 1 ex. en companyia de Fredelugues *Vanellus vanellus* a la platja de ca l'Arana el 15.XI (RRSB i JJMB); (G). No tramesa al CAC.

*Calidris ferruginea***Territ beclarg**

Estatus Migrador regular per tot el territori, tot i que no molt nombrós, excepte al delta de l'Ebre, on és comú, especialment al pas de tardor. Hivernant molt rar al mateix delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als estanys del Matà: 1 ex. el 12.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F). 48 exs. el 10.V (AOTA); màxim prenupcial (F). 1 ex. el 29.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). Un mascle adult el 20.VII (JMAA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. el 7.X (AOTA i JMAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 10 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la gola de Migjorn el 30.VI (RGBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 26.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 26.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. el 17.VII (FSEB i JGMB); primera citació postnupcial (F). 160 exs. el 30.VII (XLBA); màxim anual (N). 20 exs.

el 24.IX (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 15.IV (EBMA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu Un jove al Ter, a la zona esportiva, entre el 28 (RJNA, JEPB, OCVA i MRFA) i el 30.IX (RPEA i GMCC); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'11.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 9 exs. el 24.IV (JEBA); màxim prenupcial (N). 2 exs. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 27.VII (ACTA); primera citació postnupcial (F).
Vila-seca 6 exs. a la platja dels Prats el 12.V (ACTA i CAFA); darrera citació prenupcial (F).

*Calidris alpina***Territ variant**

Estatus *C. a. alpina* migrador regular i comú, especialment pel litoral. Hivernant regular i molt comú al delta de l'Ebre, i molt més escàs a la resta de zones humides, especialment als aiguamolls de l'Empordà, al delta del Llobregat i als arrossars del Segrià. *C. a. schinzii* migrador i/o hivernant escàs. Cal clarificar l'estatus real d'aquesta subespècie que nidifica de forma molt local al Bàltic, SE de Groenlàndia, Islàndia i les Illes Britàniques.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 74 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un adult als estanys del Matà el 31.VII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 27.153 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. a mas Pla el 8.XII (JPCA i JCMF); citació hivernal (F). 2 exs. al mas de la Pagesa el 31.XII (JPCA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 13 exs. el 4.III (FLSA); possible primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 25.VII (FSEB i JGMB); primera citació postnupcial (F). 28 exs. el 22.IX (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 26.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 3.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar Un juvenil a la platja el 5.X (JSPC i CPMB); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 5 exs. el 28.III (JMPOA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 12.VIII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la platja dels Prats: 1 ex. l'11.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. el 6.XI (CAFA); darrera citació postnupcial (F).

Limicola falcinellus

Territ becadell

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. La subespècie *falcinellus*, que és la que arriba a Catalunya, es distribueix per Escandinàvia i el nord de Rússia, hivernant des del sud i l'est d'Àfrica a través d'Àrabia fins al sud de l'Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions al Goleró: 1 ex. el 14.IV (SWWA); (G). 1 ex. entre el 2 (JTOA i RSBB) i el 16.V (JFFB); (G). No trameses al CAC.

Tryngites subruficollis

Territ rogenç

Estatus Accidental. Diverses citacions homologades. Cria al nord d'Alaska, del Canadà i a l'extrem nord-est de Sibèria. Hiverna a Amèrica del Sud.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. en una propietat privada entre el 19 (DBCA, JFBB, JFXE i ISSB) i el 29.IX (CJMA); (G). No tramesa al CAC.

Philomachus pugnax

Batallaire

Estatus Migrador regular i comú, tant al litoral com a l'interior, sobretot al pas prenupcial. Hivernant regular localment comú al delta de l'Ebre, i menys abundant als aiguamolls de l'Empordà i al Segrià, on sembla que la població hivernant es consolida, i més irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un adult als estanys del Matà el 15.VII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 475 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. al Fangar el 15.VII (CLLA, ISSB i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 10 exs. a les basses d'en Coll l'11.III (CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. a la bassa dels Pollancres el 3.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). Uns 50 exs. a la mateixa localitat el 5.IV (MGVA); màxim anual (N). Un adult amb plomatge quasi nupcial el 28.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 25.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 14.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 10.V (JRBB); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 8 exs. el 2.III (MPLA); primera citació prenupcial (F). Mínim de 90 exs. el 29.IV (JEBA); màxim anual (N). 7 exs. l'11.V (EFSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.X (JEBA, VPRA i MLMB); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 4 exs. el 9.III (DCFB, MVCA i JVLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost el 23.III (JMOB, FMVA i EFXA); primera citació prenupcial (F).

Lymnocyptes minimus

Becadell sord

Estatus Migrador i hivernant escàs, però regular, arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions als estanys del Matà: 6 exs. l'1.II (AOTA); (N). 1 ex. el 4.V (MFRA i GJPA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. alça el vol a la cua de l'embassament del Foix el 28.III (CGGA, XBGA i HSCA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfaca el 1.IV (JBGC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex.

en un arrossar vora l'Illa de Riu el 17.X (CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro Diverses observacions als estanys de les Escoles: 1 ex. el 2.II (CACB); (G). 1 ex. el 8.XI (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 28.III (MGTA, JCMC i MSSB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 24.I (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a l'embarcador el 19.III (AGRB); darrera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. en un camp inundat prop del mas Corominas el 16.XI (AGRB); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. als Salats i Muntanyans el 8.II (PABA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 4 exs. el 21.I (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 31.III (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.X (FMVA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost al seu pas pel nucli urbà el 8.XI (FMVA); (G).

Gallinago gallinago

Becadell comú

Estatus Migrador i hivernant comú tant al litoral com a l'interior en tota mena d'ambients palustres, arribant a les valls pirinenques on troba ambients adequats.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 237 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'estany de Mornau el 4.V (MOVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.797 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'Alfacada el 8.V (JBGC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la gola de Migjorn el 15.VII (CLLA, ISSB i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 6.V (FLSA i SBXC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 20.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. a la bassa de l'abocador el 9.VIII (JEPB); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 2 exs. alimentant-se a 2.454 m en una zona de prats humits a l'entorn de l'estany del Port Vell l'1.IX (DSXC); (F, G).



La Guingueta d'Àneu 5 exs. a l'embassament de la Torrassa el 15 (JCBC) i el 16.I (EVAA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 13 exs. el 27.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 30.VII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

Gallinago media

Becadell gros

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades, essent els aiguamolls de l'Empordà la zona amb més dades. La seva àrea de reproducció s'estén per Escandinàvia, Polònia, els països Bàltics, i l'oest de Rússia. Hiverna a l'Àfrica al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Palau els dies 7 i 8.IV (SSAA, JMAA i AOTA); (G). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 10.IV (RSSC i AFFB); (G). Diverses observacions als estanys del Matà: 1 ex. del 27.IV a l'1.V (JMAA, LSLB, TMJA, MBXD i ALTA); (G). Un segon ex. del 29.IV al 2.V (JMAA, LSLB, CAUA i ALTA); (G). Un tercer ex. del 30.IV al 4.V (LSLB i ALTA); (G). Un quart i darrer ex. del 30.IV al 4.V (MFRA i ALTA); (G). 1 ex. de 2n any de calendari a l'estany de Palau, capturat per a l'anellament durant el primer dia d'observació, els dies 13 i 14.V (SSAA i ALTA); (G). No trameses al CAC.

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries els dies 11 (JRBB) i 12.V (GDBA); (G). No tramesa al CAC.

Scolopax rusticola

Becada

Estatus Nidificant escàs al Pirineu, Prepirineu i part de la Catalunya humida, on nidifica regularment una minsa població, molt mal coneguda. Migrador i hivernant freqüent per tot el territori, però més comú a la Catalunya humida.

ALT CAMP

El Pont d'Armentera 1 ex. a les Sorts, riu Gaià, el 18.XI (CGGA i MCMF); (G).

Vila-rodona 1 ex. a la Farga, riu Gaià, el 18.XI (CGGA i MCMF); (G).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 17.XI (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 19.XI (JCCA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Olivella 1 ex. al Fondo de Jafre el 27.XI (RGLA); (G).

GIRONÈS

Cervià de Ter 1 ex. sobre el nucli urbà el 8.IV (LBXB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. el 15.X (PVPA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la font dels Capellans el 8.III (JSNA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins Diverses observacions al bosc de Virós: 1 ex. cantant a les 4:00 h el 4.VI (MBXI i XGPB); (R). 1 ex. cantant el 9.VI (RLXA i XGPB); (R).

La Guingueta d'Àneu 1 ex. en prats abandonats a Estaron en un dia amb climatologia molt adversa el 31.X (MBXK); possible primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. al coll d'Alablau el 12.XI (PLSA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. a Freixenet el 30.XI (PLSA); (N).

Limosa limosa

Tètol cuanegre

Estatus Migrador i hivernant comú, especialment al delta de l'Ebre, on ateny grans quantitats a l'hivern; a la resta de zones humides és més escàs, o ocasional, com a hivernant. Més comú al litoral que a l'interior, on és més rar. Estiuant al delta de l'Ebre, on es pot veure tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany d'en Pericus el 5.II (AOTA i JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.413 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 4.II (PBGA i JBOL); primera citació prenupcial (F). 15 exs. el 13.II (PBGA i JBOL); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 26.VI (PBGA i JBOL); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VII (PBGA i JBOL); primera citació postnupcial (F). 4 exs. el 20.IX (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. el 12.II

(JEBÀ); primera citació prenupcial (F). 42 exs. el 5.III (SSAA); màxim prenupcial (N). 3 exs. el 24.IV (AVPA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys entre el 9 (JVLA i ALAA) i el 24.III (TMXC); (G).

Limosa lapponica

Tètol cuabarrat

Estatus Migrador regular, però poc freqüent, especialment al litoral, i molt més escàs a l'interior. Hivernant localitzat sobretot al delta de l'Ebre, on hi ha una població petita però regular en aquesta estació. Així mateix, la presència d'exemplars estiuejants fa que també es pugui veure pràcticament tot l'any al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Massona el 2.IX (AOTA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 16.X (RGA i JMAA); darrera citació postnupcial (F). 1 ex. a la platja de can Comes el 13.XII (GDBA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 32 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana l'11.V (XLBA); única citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja del Prat el 14.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F) 3 exs. el 22 i el 24.IX (FLSA); màxim anual (N). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 8.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a la platja el 14.IX (JSPC i CPMB); (G).

Numenius phaeopus**Polit cantaire**

Estatus Migrador regular, però poc comú, per tot el territori. Ocasionalment, amb circumstàncies meteorològiques determinades, es poden veure grans estols pel litoral. Hivernant molt rar, amb alguns casos darrerament al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany Europa el 29.III (MRFB i OCVA); primera citació prenupcial (F). 7 exs. als prats de can Comes el 6 i el 9.IV (JMAA i AOTA); màxim anual (N). 2 exs. a la gola del Fluvià el 23.IV (JRRF); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. als estanys del Matà l'1.VIII (AOTA i JMAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 23.VIII (AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 17.III (JBCG i OCVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Goleró el 5.VII (JTOA i RSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la Pagesa el 21.VIII (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del Remolar el 15.III (CCTA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 79 exs. el 15.IV (FLSA); màxim anual (N). 2 exs. el 18.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. el 5.VII (XLBA); primera citació postnupcial

(F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 12.IX (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs entre el 24.IV i el 6.V (XLBA i MCVA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 9 (RPEA, DCXC i GMCC) i el 10.IV (APFA i GMCC); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 27.IV (LTBB); (G).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 12.IV (PGXF); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 23.VIII (JVDA); (G).

Numenius arquata**Becut**

Estatus Migrador regular i freqüent per tot el territori, amb bons contingents al delta de l'Ebre. Hivernant més localitzat, com per exemple al delta de l'Ebre, on manté el principal nucli, i als aiguamolls de l'Empordà. A la resta de zones humides és un hivernant molt escàs. Estiuejant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 69 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 371 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 14 exs. al Goleró el 12.VII (NNXA,

MCXM, RGXC, AGXI i CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 24 exs. a l'estany de Pals el 31.X (CBLA); (N).

Torroella de Montgrí 1 ex. a mas Pla el 20.VIII (JPCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja del Remolar el 15.III (CCTA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana entre el 3.IV (FLSA i DBRA) i el 12.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 28.VI (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la maresma del 22.XI (STXB) fins a finals d'any (FLSA); citació hivernal (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 27.XII (EBMA); citació hivernal (G, F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 24.VIII (AVDA i JVDA); (G).

Tringa erythropus

Gamba roja pintada

Estatus Migrador regular i freqüent a les zones humides d'aigua dolça, tant pel litoral com de l'interior. Hivernant localitzat al delta de l'Ebre, on hi ha la major part de la població del territori, en menor nombre als aiguamolls de l'Empordà, i més testimonialment a d'altres zones, com a la depressió Central.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 11 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA);

cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. adults a l'estany del Cortalet el 29.VI (JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 421 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. al golf Serres de Pals el 26.III (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. a la bassa dels Pollancrel el 21.II (FLSA i NUTA); primera citació prenupcial (F). 18 exs. a cal Tet el 6.IV (RBVA); màxim anual (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 19.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la maresma del Remolar el 2.VII (RMXH); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 9.IV (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 15 (EBMA) i el 16.IV (PABA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la nova llacuna de Casa Nostra del 8 al 10.III (CFQA i CGPC); (G).

Porqueres 1 ex. a la llacuna d'en Margarit des del 27 (HMPA) fins el 29.IV (CGPC); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.III (GBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 2 exs. el 27.III (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. el 19.IV (AAGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 12.VII (DCFB); única citació postnupcial (F).

Tringa totanus**Gamba roja vulgar**

Estatus Nidificant regular, tot i que no gaire comú, al delta de l'Ebre. Migrador comú i regular arreu del territori. Hivernant molt localitzat al delta de l'Ebre, on es troben la majoria dels individus hivernants, i més testimonialment a la resta de zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la Rogera el 27.II (JMAA i AOTA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Basella 1 ex. a l'embassament de Rialb el 14.II (RBVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 859 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 123 exs. el 12.V (JJMB); màxim anual (N). 1 ex. el 8.VIII (FLSA); possible primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1

ex. el 31.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. mort per botulisme el 24.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F, B).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 5 exs. el 2.II (EBMA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.V (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. el 21.V (JEBA i ERVA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIA

Lleida 1 ex. al riu Segre el 18 i 19.I (ESMA, EFSA, JPXM, RRJB i CRSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 14.II (JVLA, TMXC, TSCA, MGXA, ACPA i RNVA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Entre 200 i 220 exs. a la platja dels Prats el 12.V (ACTA i CAFA); màxim nombre comptabilitzat a la zona (N). 1 ex. a la mateixa localitat el 31.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

Tringa stagnatilis**Siseta**

Estatus Migrador regular, però escàs, que els darrers anys sembla cada cop més nombrós al pas de tardor, especialment al delta de l'Ebre. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als estanys

del Matà: 1 ex. el 4.IV (JMAA); primera citació prenupcial (E, F). 1 ex. el 30.IV (JMAA i LSLB); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a l'Alfaceda el 19.III (JBCG); (E, F); primera citació prenupcial (F). Posteriorment 3 citacions corresponents a 5 exs. en període prenupcial al Garxal i la Tancada (JBAB, ABBG, LEEA, JTOA i RSBB); (E, F, N). 2 exs. al Garxal el 20.IV (JBAB, LEEA i FRXD); darrera citació prenupcial (E, F). 3 exs. al Goleró el 16.VI (CJMA, JMXS i ITXB); primera citació postnupcial (E, F). Posteriorment 6 citacions corresponents a 8 exs. en període postnupcial (CJMA, JMXS, ITXB, ISSB, MRFA, JTOA, RSBB i ALTA); (E, F, N). 1 ex. a la Tancada i 1 ex. a Riet Vell el 25.X (JFFD, AFFC, MZZA i ACTA); darrera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 2 exs. a l'estany de Boada del 6 (ABRA) al 8.IV (RFRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 3.IV (FLSA); primera citació prenupcial (E, F). 4 exs. entre el 4.IV (MGVA i RBVA) i el 7.IV (FLSA i JCMC); màxim anual (E, N). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 7.X (ARMC); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.IV (MPLA i MPOA); (E).

Tringa nebularia

Gamba verda

Estatus Migrador comú per tot el territori, tot i que més comú al litoral. Hivernant escàs al delta de l'Ebre i molt més escàs als aiguamolls de l'Empordà, on sembla que hiverna recentment de manera regular. A

la resta del territori és un hivernant molt rar o ocasional. Estiuejant molt rar o ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 9 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a les basses de la pedrera de la Uniland el 27 (PTEA i PARA) i el 31.VIII (PTEA i JCRE); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 347 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 40 exs. a la platja de ca l'Arana el 19.IV (RBVA); màxim anual (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 6.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 13.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Sant Joan Despi 1 ex. al riu Llobregat l'1.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 7.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 29.III (MPOA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.IV (JEBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 14.X (JEBA); única citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 31.III (JVLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 20.V (TMXC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.VII (TMXC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 2.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. a l'embassament de l'alzina el 9.IV (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 12.V (ACTA i CAFA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l'1.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Tringa flavipes**Gamba groga petita**

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades. Cria a Alaska i el sud del Canadà. Hiverna des del sud dels Estats Units fins a l'extrem sud d'Amèrica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. al Garxal els dies 3 i 4.IV (JHHA i TRRA); (G). No tramesa al CAC.

Tringa ochropus**Xivita**

Estatus Migrador freqüent i regular per tot el territori, on pot ocupar molts ambients d'aigua dolça. Es pot veure pràcticament tot l'any a determinades localitats, per la presència d'exemplars estiuuejants, i el solapament entre aquests i els migrants i hiber-

nants. Més escàs com a hivernant, tot i que regular, tant al delta de l'Ebre i aiguamolls de l'Empordà, com al Segrià.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a la cua de l'embassament del Foix: 2 exs. el 12.III (PTEA i FCFA); primera citació prenupcial (F). 7 exs. el 26.IV (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 13.XII (PTEA); darrera citació de l'any (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 248 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a el Goleró el 18.VI (CJMA, ISSC, MMMC i CMMB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la Pagesa el 14.VI (JPCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 14 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA); possible primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 13.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac (MRFA) i 1 ex. al molí d'en Valls el 27.VI (MRFA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella 1 ex. en una bassa sota el port de Filià a uns 2.000 m d'altitud el 23.VII (JCBC); (B).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a l'estany del Ras a 2.300 m d'altitud, capçalera del torrent de Llacanes, el 17.VII (PABB); (B).

La Guingueta d'Àneu 2 exs. a la mollera d'Escalarre el 14.V (MGLA, XGPB i JPKK); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna d'en Margarit el 14.VI (XVPA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 19 exs. el 15.IV (AVPA); màxim anual (N). 1 ex. el 30.IV (ERFA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 25 exs als estanys. el 22.III (DCFB i XRCA); primera citació prenupcial i màxim anual (F, N).

Tringa glareola**Valona**

Estatus Migrador comú per tot el territori. Darrerament hivernant regular, però escàs, tant al litoral com a les basses del Segrià encara que varia considerablement en nombre segons els hiverns i fins i tot pot haver-hi anys sense gens d'hivernada.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions als estanys del Matà: 3 exs. el 31.I (JMAA i TMJA); citació hivernal (F). 4 exs. el 14.II (JMAA i AOTA); citació hivernal (F). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 21.XII (RBVA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 199 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a el Goleró el 16.VI (CJMA, JMXS i ITXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 4 exs. a l'estany de Pals el 13.I (ABRA, JCXT i DBRA); citació hivernal (F).

Torroella de Montgrí 1 ex. al mas de la Pagesa el 14.VI (JPCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la maresma del Remolar el 28.VI (RBVA); possible primera citació postnupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 23.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Joan Despí 1 ex. el 9.I (JCCA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs a Sant Adrià el 26.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Torelló 1 ex. al Ter a les Gambires el 10.V (MRFA i RJNA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 13 exs. a la llacuna d'en Margarit el 27.IV (HMPA); màxim anual (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 38 exs. l'11.IV (SSAA); màxim anual (N). 1 ex. el 30.IV (GBCA, EMFA i JFXE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 14.X (JEBA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 26.III (JVCB); primera citació prenupcial (F). 51 exs. el 4.V (DCFB); màxim anual (N). 2 exs. el 13.V (TMXC); darrera citació prenupcial (F).

Actitis hypoleucos**Xivitona**

Estatus Nidificant escàs als cursos fluvials interiors de Catalunya entre els 500 i 1.700 m d'altitud. La presència d'exemplars estiuuejants fa que en moltes àrees no es conegui bé si nidifica o només s'hi troba temporalment. Migrador comú tant a la costa com als cursos fluvials de l'interior, i a totes les zones humides del territori. Hivernant escàs als aiguamolls litorals, també als cursos fluvials interiors, a les basses del Segrià i a la resta de comarques interiors.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 9.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix-Hort del Rector el 23.V (PTEA i FCFA); darrera citació prenupcial (F). Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1 ex. l'11.VII (CGGA, XBGA i HSCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 60 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 50 exs. a la platja de ca l'A-rana el 2.VIII (XLBA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 24.V (RRSB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac el 29.VI (MRFA i RJNA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. a la mollera d'Escalarre a l'alçada del pont de Poldo el 19.IX (JFXE); primera citació postnupcial (F).

Soriguera 1 ex. a Baro el 16.III (JRBSB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. als desmais sobre un tronc el 9.VI (CFQA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.III (GBCA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 6.VII (JEBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.IX (JEBA i ERVA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 26.IX (FRRA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Ripoll el 23.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

Arenaria interpres

Remena-rocs

Estatus Migrador regular, però escàs al litoral, i molt més rar a l'interior. Hivernant regular en baix nombre al delta de l'Ebre i a alguns punts del litoral, i més rar en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedimentat a les roques arran d'aigua a la cala de ses Ielles el 8.XII (PCXE); citació hivernal (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als estanys del Matà: 1 ex. el 30.IV (JMAA i LSLB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.V (MRSA i TMJA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 16.IX (JMAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 6.X (JMAA i JGMD); darrera citació postnupcial (F). 1 ex. a la platja de can Comes el 29.XII (AOTA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 121 exs. entre el 6 i el 16.I

(PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a les illes Medes el 31.VIII (CBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 23.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 5 exs. l'11.V (XLBA); màxim anual (F). 1 ex. el 7.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII (FLSA i SBXC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. davant l'aguait del Sabogal el 13 (PBGA, MVCA, MGTA i OLGA) i el 15.XII (FLSA); citació hivernal (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.XII (FLSA); citació hivernal (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la platja de Ribes Roges el 10.V (VPRA); (G).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a l'interior del port del 30.XI a finals d'any (MCVA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. l'11.V (EFSA); (G). 4 exs. el 12.V (RBVA i OLGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la platja dels Prats el 9 i l'11.V (ACTA); (G).

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson

Estatus Accidental. Una dada homologada pel CR/SEO i alguna dada més encara no homologada.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a cal Tet observat des de l'aguait del Sabogal, present del 19 (PBGA, MVSA i JFXF) al 22.X (JLGA i ALTA); (G) Homologada pel CAC.

Phalaropus lobatus**Escuraflascons bec-fi**

Estatus Migrador regular, però escàs, al delta de l'Ebre. A la resta del territori és molt rar o ocasional, i a l'interior excepcional. Hivernant excepcional al delta de l'Ebre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell els dies 29 (IRXA) i 30.IX (CJMA, SRSA, ISSB i LEEA); (G). No tramesa al CAC.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. de l'11 (SSAA) al 15.IV (SWWA); (G). No tramesa al CAC.

Stercorarius pomarinus**Paràsit cuaample**

Estatus Regular en baix nombre al litoral, especialment mar endins, durant el pas prenupcial. Més escàs durant el pas postnupcial, i excepcionalment a l'hivern.

El gruix d'observacions es donen al mes d'abril i maig, amb registres més primers enguany, fins i tot de primers de març al Baix Empordà. Cal destacar especialment l'observació d'un estol de 14 exs. al delta de l'Ebre i l'absència de dades en pas postnupcial, quan l'espècie és molt escassa al litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes 1 ex. de fase clara empaïtant gavines corses *Larus audouinii* davant

el delta de l'Ebre el 29.V durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA, JAPB i JPMA); (E, F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. cap al sud per la punta de cap de Creus (PFLB, AOVA, MCME i JVSA) i 1 ex. a 6 milles nàutiques de cap de Creus el 5.IV (GGXB i ALXE); primera citació prenupcial (E, F). 4 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA); (E). 1 ex. a 3 milles nàutiques de cap de Creus el 12.IV (GGXB i ALXE); (E). 1 ex. de fase clara a la punta de cap de Creus (CGXB) i 2 exs. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 13.IV (GGXB i ALXE); (E). 1 ex. a l'est de cap Norfeu el 19.IV (ABRA i ALTA); (E). 2 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLA i ALTA); (E). 1 ex. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE); (E). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 25.IV (ACXG i ANXA); (E). 1 ex. a 2 milles nàutiques a l'est de cap de Creus el 3.V (GGXB i ALXE); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 14 exs. davant de la punta del Fangar el 26.IV (XLBA, RGBA, SSAA i ARMC); (E, N).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 exs. en pas per davant la punta d'es Plom l'1.III (ABRA); primera citació prenupcial a Catalunya (E, F).

Palamós 1 ex. de fase fosca davant la punta del Molí el 6.IV (MDSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mirador de cal Francès el 2.V (MGVA); (E). 1 ex. de fase clara en vol cap al nord el 3.V (RBVA); (E). 2 exs. des de la platja de ca l'A-

rana el 18.V (XLBA); darrera citació prenupcial a Catalunya (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions davant de la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 20.IV (XLBA); (E). 1 ex. l'11.V (MGVA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 5.IV (FMVA); (E).

Stercorarius parasiticus

Paràsit cuapunxegut

Estatus Migrador regular per tot el litoral tant al pas prenupcial, quan és més comú, com al postnupcial. Més fàcil d'observar des de la costa que *Stercorarius pomarinus*. Hivernant escàs i molt localitzat, però regular, especialment en zones on hi ha bones poblacions de gavines, com per exemple el delta del Llobregat i el delta de l'Ebre.

Observacions dins el patró habitual primaverenc, amb alguna dada tardana del mes de juliol al litoral barceloní i al Baix Empordà. Novament sobta el fet que la gran majoria d'exemplars observats al litoral empordanès migren en direcció sud a la primavera, a diferència del gruix d'exemplars observats en pas actiu al centre i sud de país. Enguany es compta amb nombrosos registres hivernals al litoral empordanès, tarragoní i al Maresme.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el 12.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 exs., tots ells cap al sud, per a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); (N). 7 exs. en pas per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV

(OCVA); (N). 4 exs. a l'est de cap Norfeu el 20.IV (MRFB, JVLÀ i ALTA); (N). 1 ex. de fase clara en pas per la punta de cap de Creus el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. de fase fosca en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 6.IX (PFLB, SOAA, JLRA i JVSA); única citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. des de la platja de ca l'Arana el 18.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VI (XLBA); citació estival (F). 1 ex. el 5.VII (XLBA); citació estival (F). 1 ex. des de la platja del Prat el 18.X (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. des de la platja de Pals el 7.VI (CBLA); citació estival (F, G).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions a Punta Vella: 1 ex. el 19.I (EBMA); (G). 1 ex. el 5.II (EBMA); (G). 1 ex. el 10.II (EBMA); (G).

Malgrat de Mar Diverses observacions davant la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 2.II (FMVA); (G). 6 exs. en vol sud entre les 20:00 i les 20:15 el 5.IV (FMVA); (N, B).

Premià de Mar 1 ex. en vol direcció nord el 10.II (JSPC); (G, B). 1 ex. de fase fosca en vol direcció nord el 24.II (JSPC); (G, B).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 4.V (ACTA i MPSA); (G, F).

Tarragona 2 exs. al port el 18.XII (ACTA i MPSA); (G).

Stercorarius skua

Paràsit gros

Estatus Presència regular durant l'hivern i durant els passos, més comú mar endins. A l'estiu, alguns ocells no reproductors també romanen a les nostres aigües.

Les dades mostren que l'espècie, com en d'altres anys, es presenta de forma regular al llarg del litoral en baix nombre, amb un patró habitual primaverenc i amb exemplars estiuejants durant el mes de juny, juliol i agost. El 2008 es detecta un pas postnupcial molt tímid, mentre que l'hivernada és l'habitual, escassa i dispersa arreu del litoral català.- PFLB.

Aigües catalanes 1 ex. davant de Vilanova i la Geltrú el 31.V, 1 ex. davant de Barcelona l'1.VI i un tercer ex. a la badia de Roses el 3.VI durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA, JAPB i JPMA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses observacions a la punta de cap de Creus: 4 exs., tots ells en pas cap a sud, el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD); (N). 1 ex. seguint un mascarell *Morus bassanus* a la costa nord, vist des de Grifeu, el 15.III (PFLB, MSFB, DCFB, PFSA, MCME, JBXJ, ACBD, MSXG, MPXF i AOVA); (B). 6 exs., tots ells cap al sud, el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); (N, B). 7 exs. en pas el 12.IV (OCVA); màxim anual (N). 1 ex. a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 26.IV (PFLB, ACHA, JSVA, OCVA i JGCB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. des de la platja de ca l'A-rana el 18.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja del Prat el 14.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de fase fosca a la platja de la Mar Bella el 23.II (RRSB); (G).

GARRAF

Sitges Diverses observacions davant el port de Garraf: 1 ex. en vol l'1.III (FMVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.XII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 2 exs., un dels quals persegueix un gavià argentat *Larus michahe-llis* amb èxit a Punta Vella, l'11.I (EBMA); (B).

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.IV (EBMA i FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Mataró 1 ex. al calador del Filant el 25.VIII (EBMA); citació estival (F).

Larus melanocephalus

Gavina capnegra

Estatus Nidificant irregular des de 1987 al delta de l'Ebre, on 1-2 parelles han nidificat, i a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on l'any 2007 hi va criar una parella. Present durant les migracions, i a l'hivern, de forma nombrosa a la meitat sud del litoral, i més escassa a la meitat nord, essent regular però més rara a l'extrem nord (Alt Empordà). També present, tot i que de forma molt més escassa, entre les migracions, a l'estiu. Accidental a l'interior.



L'espècie es confirma com a nidificant a l'interior del país i es mantenen els elevats nombres de principis de gener al sud del golf de Sant Jordi. És igualment remarcable el pas nombrós en direcció nord observat al cap de Creus a principis d'abril. - ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.000 exs. en pas cap al nord per davant de la punta de cap de Creus el 12.IV (OCVA); màxim anual (N). 15 exs. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 15 exs. adults a 3 milles nàutiques a l'est de cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA, XVXC, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); citació estival (F). 8 exs. a la punta de cap de Creus el 2.VIII (MFRA, GDBA i DFFC); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils Un juvenil el 3.VIII (PJAA); primera citació postnupcial segura (F).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar-L'Ampolla 16.390 exs. el gener (ACTA, RMXI, IBSA i JFBB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 477 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.892 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 4.100 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA); màxim prenupcial (N). Uns 1.700 exs. aturats a la platja de ca l'Arana l'1.XII (FLSA); màxim postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès Més de 100 exs. caçant formigues alades a les masies de Sant Miquel el 25.X (CGGA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 17.VII (RRSB); citació estival (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. de 2n any a la desembocadura de la Tordera el 7.VI (FMVA); citació estival (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3-5 parelles nidificants (JEBJA); (R, N).

Larus atricilla

Gavina capnegra americana

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades, algunes de les quals fan referència a un mateix individu hivernant a Blanes. Cria a les costes d'Amèrica central, a la costa est d'Amèrica del Nord i a les Antilles. Hiverna a Amèrica central i al sud fins al Perú i el nord del Brasil.

És interessant comprovar que l'individu de Blanes segueix visitant l'àrea un any més

(Sales 2005, Anton & Estrada 2005, Anton 2008). Representa un bon exemple de l'alta fidelitat de les gavines a les àrees d'hivernada (Spear 1988, Bengtsson 2001).- ACTA.

MARESME

Arenys de Mar S'observa al port el mateix ex. de la citació de Blanes entre el 14.II (FMVA) i el 14.III (JCTB); (G). Homologada pel CAC.

SELVA

Blanes Es torna a observar el mateix ex. que en anys anteriors al port fins el 14.II (EBMA); (G). Homologada pel CAC.

Larus minutus

Gavina menuda

Estatus Migrant regular al litoral, més nombrosa mar endins, però normalment poc abundant. Més comuna al pas de primavera quan pot produir concentracions importants de forma local, com per exemple al litoral de Barcelona. Ocasional a l'interior. Hivernant escàs, que pot variar sensiblement en nombre segons els hiverns.

Aquest any es tornen a produir citacions a l'interior. De seguir així, la seva presència deixarà de ser remarcable, principalment gràcies a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Per la resta, les dades aportades coincideixen en el patró normal de l'espècie, tot i que cal destacar el gran nombre d'exemplars observats a Palamós.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Més de 200 exs. davant de cap Norfeu el 19.IV (GGXB i ALXE); (N). 40 exs. a 5 milles nàutiques de cap de Creus el 23.IV (GGXB i ALXE); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet del 22.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el 15.VI (JMAA i TMJA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al Ranxo Gran el 23.II (ISSB, NRRA, LEEA i CJMA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1.487 exs. en pas davant la punta de Canyers el 5.IV (MDSA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana del 7.IV fins el 5.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració el 7.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 90 exs. al mar davant la desembocadura de la Tordera el 5.IV (FMVA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 5.III (SSAA) i 1 ex. el 12.III (MGMA); úniques citacions prenupcials (F). 2 exs. el 10.VII (MCXE, RBVA i DMCA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra Un juvenil als Salats i Muntanyans el 15.IX (ABBB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 29.IV (XLBA); (G).

Larus sabini

Gavineta cuaforçada

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades pel CR/SEO. La seva àrea de cria s'estén per l'Àrtic, des del Nord d'Amèrica del Nord al nord-est de Sibèria. Hiverna al litoral occidental d'Àfrica des de l'equador fins a l'extrem sud del continent, i al litoral occidental d'Amèrica des del sud de Panamà fins al tròpic de Capricorn.

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al calador de la Carrana el 3.VII (EBMA); (G). No tramesa al CAC.

Larus ridibundus

Gavina vulgar

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on manté un contingent de més de 2.000 parelles, i en menor nombre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Migrador i hivernant abundant. Es pot veure pràcticament tot l'any, tot i que és durant les migracions i a l'hivern quan té el màxim.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses observacions en pas per la punta de cap de Creus: 3.183 exs. el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); màxim anual (N). Centenars d'exs. el 13.IV (JBCD i MRXD); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 juvenils a l'estany del Cortalet el 27.VI (JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 41.833 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un juvenil a la platja de ca l'Arana el 23.VI (FLSA); primera citació postnupcial segura (F).

BARCELONÈS

Barcelona 8.108 exs. al port entre l'11 i el 12.I (RGA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Gurb Un adult al Terrer de la Teuleria el 15.VII (MRFA); primera citació postnupcial (F).

Vilanova de Sau 5 exs. de 1r estiu a l'embassament de Sau el 30.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 250-300 parelles nidificants (JEBA); (R, N). 1.800 exs. el 31.VII (JEBA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Un adult a l'embassament dels Montblanquets el 28.XII (RACC); primera citació documentada en aquesta localitat (G).

SEGRÀ

Lleida 953 exs. al riu Segre el 18-19.I (ESMA, EFSA, JPXM, ICXF, JIXA i RRJB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 9 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 14.III (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1.996 exs. al port el 12.I (ACTA, MPASA, AMOB i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Larus genei**Gavina capblanca**

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi crien uns quants centenars de parelles. A l'hivern a les zones de cria hi romanen unes quantes desenes d'exemplars. És un visitant regular, però escàs, durant el període migratori en les zones humides del litoral, i molt escàs o ocasional a la resta del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 29.III (MRFB); primera citació prenupcial (F). 6 exs. a l'estany del Matà el 21.V i el 12.VI (JMAA); màxim anual (N). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 4.VII (JMAA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil a l'estany del Cortalet el 19.VIII (AOTA); primera citació postnupcial (F). Un juvenil a la Massona el 7.IX (JMAA i AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 353 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 2.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'A-rana: 10 exs. el 12.VI (FLSA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 14.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. a la platja de Ribes Roges el 7.IV (VPRA, SCBC i SVSA); (G).

Larus audouinii**Gavina corsa**

Estatus Nidificant abundant al delta de l'Ebre, on existeix una important colònia de diversos milers d'exemplars. A la resta del territori és present de forma regular tant a les migracions com al període estival, cada vegada més nombrosa, en paral·lel amb l'increment de les colònies reproductores. Hivernant escàs, sobretot al delta de l'Ebre, i altres exemplars més irregularment disseminats pel litoral. Molt rara a l'interior.

Tot i que aquest any no s'han rebut dades d'hivernada de l'espècie tant al nord com a l'any anterior (desembocadura de la Tordera), se n'han tornat a rebre d'altres punts del Maresme. Pel que fa a l'època de cria, al 2008 s'han produït moltes observacions fora de les àrees típiques i en nombres prou elevats, com és el cas del litoral de Girona. A més, al Baix Llobregat s'ha assolit el màxim històric el 16.VI. Aquest increment dels exemplars vistos fora del delta de l'Ebre podria estar relacionat, entre d'altres factors, amb les fortes tempestes que es van produir durant tota la primavera i amb els canvis en les vedes de pesca dutes a terme al delta de l'Ebre. Aquests dos fets combinats (i possiblement també altres) podrien haver causat l'important fracàs de la població reproductora (Oró *et al.* 2008). La flota de Sant Carles de la Ràpita ha dut a terme la veda d'arrossegament els mesos de maig i juny en comptes de juliol i agost com havia succeït els darrers anys (Ordre AAR/239/2008, de 20 de maig, DOGC núm. 5138).- ACTA.

Aigües catalanes Durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus, esdevé abundant al sud de Barcelona amb una màxima con-

centració de 120 exs. a Torredembarra, i pràcticament absent al nord de Barcelona on només s'observa un adult davant de Blanes el 2.VI (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Es recullen 5 citacions prenupcial que comptabilitzen 9 exs. entre el 12.IV i el 28.VI (PFLB) amb un màxim de 3 exs, dos d'ells aturats a l'Encalladora, a la punta de cap de Creus, el 3.V (MFRA, JBCD i EPMC); (F, N). Un juvenil en pas cap al sud des de Grifeu cap a la costa nord de cap de Creus el dia 19.VIII (PFLB, MSFS, PFSA, ARGC i CFLA); única citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la platja de can Comes el 16.II (GDBA); primera citació prenupcial (F). 13 exs. a la platja de can Comes el 6.VI (AOTA, JGXL i XCSA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 4.VII (JMAA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil a l'estany del Cortalet el 19.VIII (AOTA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la Rogera el 9.IX (JMAA, GDBA i AOTA); darre- ra citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 200 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Fracàs reproductor gairebé total i sense precedents, principalment a causa de les condicions meteorològiques adverses (pluges fortes en plena època de cria). L'alt èxit reproductor estimat en una mitjana de 0,58 polls/parella en els darrers anys, va caure en picat, de manera que dels més de 10.000 polls que cada any hi ha a la colònia de la Punta de la Banya al final de la temporada de cria de 2008 no arribaven als 150 (IMEA/PDEA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 21 exs. a la platja Gran de Palamós el 14.IV (MDSA); (N).

Pals 64 exs. als arrossars el 15.VI (ABRA); màxim anual (N).

Torroella de Montgrí 51 exs. als arrossars de l'aeròdrom l'11.V (DBRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2.437 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.VI (FLSA); màxim anual i record històric en aquest espai (N). 1 ex. a la gola del riu i la platja de ca l'Arana de l'11.XI a finals d'any (FLSA i SBXC); darrera citació de l'any (F).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars durant tot l'any en vol direcció al port del Fòrum, sobre el parc de Diagonal Mar, amb un màxim d'uns 80 exs. el 15.VI (RRSB); (N, G, F).

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 4.II (XLBA); primera citació prenupcial (F). Uns 300 exs. el 31.V (XLBA); màxim anual (N).

GARRAF

Sitges Presència regular d'entre 2 i 7 exs. davant de l'hotel Miramar del 13.X al 17.XII (RBVA); citació hivernal (F). Diverses observacions al port de Garraf: 3 exs. el 13.XII (FMVA); citació hivernal (F). Un adult i un subadult el 17.XII (RBVA); citació hivernal (F).

Vilanova i la Geltrú Mínim de 800 exs. al port el 8.VI (VPRA); (N).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. de 2n estiu a l'abocador de Solius el 21.VI (CACB); (G, B).

MARESME

Arenys de Mar Diverses observacions al port: 1 ex. el 6.I (EBDA); primera citació de l'any (F). 250 exs. a la platja el 26.V (EBDA); màxim anual i darrera citació prenupcial

(N, F). 1 ex. entre el 21 i el 29.XII (EBDA); citació hivernal (F).

Malgrat de Mar 7 exs. a la desembocadura de la Tordera l'11.III (PABA); primera citació prenupcial (F).

Montgat 1 ex. el 28.I (XLBA i JMXU); citació hivernal (F).

TRIBERA D'EBRE

Flix Un adult baixant per l'Ebre al capvespre el 8.VI (RBVA); (G).

Larus canus

Gavina cendrosa

Estatus Rar com a hivernant i en migració, però regular. Accidental a les comarques de l'interior.

Com l'any passat (Anton 2008), totes les observacions d'aquesta espècie s'han produït a la franja litoral i seguint el patró temporal descrit per l'espècie (Ferrer *et al.* 1986, Clavell 2002). Igualment ha continuat l'increment espectacular del nombre de citacions.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses Diverses observacions al port de Roses: 1 ex. de 1r hivern el 17.I (AOTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 28.I (AOTA i TMJA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 29.XI (AOTA, ACTA i MPSB); (E). Un adult el 29.XII (AOTA); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 24.IV (LSLB); (E). 1 ex. a la platja de can Comes el 13.XII (GDBA); (E). 1 ex. de 1r hivern a la gola de la Muga el 18.XII (JMAA); (E).

BAIX CAMP

Cambrils Diverses observacions al port: 2 adults i 2 exs. de 1r hivern el 9.I (PJAA); màxim anual (E, N). Un adult i 1 ex. de 1r hivern el 29.I (PJAA); (E). 2 exs. de 1r

hivern i 1 ex. de 2n hivern el 15.II (ACTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 25.III (RRXD); (E).

Riudecanyes Un adult i 1 ex. de 1r hivern a l'embassament el 28.II (ACTA i PJAA); (E).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 2 exs. el 17.I (ACTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al Fangar el 7.I (APXK, AGXF i CJMA); (E). Un adult a la platja de les Olles el 12.I (JCPB, ESLA i RRSB); (E). 1 ex. al Gargal el 14.I (CJMA i YBSA); (E). 1 ex. de 1r hivern al Ranxo Gran el 17.I (DBCA i ACTA); (E). 1 ex. de 1r hivern a la badia dels Alfacs el 21.I (CJMA i JBAB); (E). 1 ex. de 1r hivern en un arrossar a prop del mas de Masos l'1.V (ACTA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r estiu a la platja de ca l'Arana des del 7 al 9.IV (FLSA); (E). 1 ex. a la maresma del Remolar el 3.V (MGVA); (E). 1 ex. a la platja de ca l'Arana des del 12 al 17.VI (FLSA); darrera citació prenupcial a Catalunya (E, F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet-Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 1r hivern al Parc Fluvial del Besòs de primers d'any fins el 17.III (JTOA); (E).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. de 2n any de calendari a la desembocadura del Besòs el 3.XI (MCVA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. de 2n any al port de Garraf el 6.IX (FMVA); primera citació postnupcial a Catalunya (E).

Vilanova i la Geltrú Diverses observacions a la platja de Ribes Roges: un adult el 10.I (MOVA); (E). 1 ex. de 2n any el 8.IV

(VPRA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 30.XII (VPRA); (E).

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l'abocador de Solius: un adult el 27.IV (CACB); (E). 1 ex. de 1r hivern el 26.X (CACB); (E). 1 ex. de 1r hivern el 7.XII (CACB); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la platja de l'11.III (EBMA) al 14.IV (JCTB); (E).

Premià de Mar 1 ex. de 1r hivern l'11.II (MCVA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port: 1 ex. de 1r hivern l'11.II (ACTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 30.III (ACTA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. de 1r hivern el 28.IX (ACTA i MPSA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 14.XII (ACTA, MPSA i JFOD); (E).

Larus fuscus

Gavià fosc

Estatus *L. f. graellsii* nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi crien més de 100 parelles. Migrador i hivernant comú, especialment al litoral al sud del delta del Llobregat, i més escàs al litoral nord. Es pot veure pràcticament tot l'any pel litoral, tot i que de forma molt escassa a l'estiu entre les migracions. Present de forma regular i en increment també a l'interior, tot i ser més aviat escassa però localment freqüent en alguns abocadors. *L. f. intermedius* hivernant i migrador, probablement arreu del territori, tot i que més comú al litoral. Calen dades per determinar amb precisió el seu estatus.

D'entre totes les observacions rebudes cal destacar una bona representació de dades de l'interior del país, on normalment s'hi

recullen poques citacions. Per la resta cal destacar l'observació molt primerenca d'un jove a l'Alt Empordà.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un juvenil als conreus de mas Llobet el 13.VII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.559 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 140 exs. a la platja de ca l'Arana el 8.III (RBVA); màxim prenupcial (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant de la desembocadura del Besòs el 12.VI (XLBA); citació estival (F).

GIRONÈS

Llagostera 14 exs. a l'abocador de Solius el 12.IV (CACB); màxim anual (G).

MARESME

Malgrat de Mar 10 exs. el 14.IV (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

Mataró 10 exs. al calador del Filant el 25.VIII (EBMA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teulades de la General Cable: 13 exs., 6 adults, un de 2n hivern i 6 de 1r hivern el 8.II (MRFA, RPEA, GMCC, DCXC i AGRB); màxim anual (N). 2 exs, un de 2n hivern i un de 1r hivern el 12.IV (MRFA); darrera citació

prenupcial (F). 2 exs., un adult i un de 1r estiu, al mas Bruguera el 10.VII (RJNA i MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.VI (JEBA); citació estival (F). 1 ex. el 7.X (JEBA); primera citació postnupcial (F). 18 exs. el 21.XI (SSAA); màxim anual (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener Un adult a l'em-bassament de Sant Ponç el 14.III (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.250 exs. al port el 12.I (ACTA, MPSA, AMOB i ISAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Diverses observacions al nucli urbà: 1 ex. de 2n any el 8.III (FMVA); (G). Un adult, 1 ex. de 2n any i 1 ex. de 3r o 4t any el 23.III (FMVA); (G).

Larus argentatus

Gavià argentat de potes roses

Estatus *L. a. argentatus* accidental. Una dada homologada pel CAC. Es reproduïx a Dinamarca i Escandinàvia, i hiverna al nord i l'oest d'Europa. *L. a. argenteus* accidental. Diverses dades que es poden atribuir a aquest taxó homologades pel CAC. El seguiment fet en alguns llocs, especialment al port de Tarragona, indica presència regular en molt baix nombre. Es distribueix per Islàndia, les Illes Feroes, les illes Britàniques, i de l'oest de França a l'oest d'Alemanya, i a l'hivern fins al nord de la península Ibèrica.

Aquest any el nombre de dades i de localitats en les que s'observa és major que en

els anys anteriors, possiblement per un augment en l'esforç d'observació. Es detecta un pas migratori de l'espècie a Catalunya, principalment a la primavera, tot i que també s'observa en baix nombre com a hivernant. L'enviament de les observacions al CAC podria permetre establir-ne un estatus més acurat.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marçà 2 exs., un de 2n any de calendari i un de 3r any de calendari a l'abocador de Pedret el 12.III (AOTA); (G). Homologada pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un jove de l'any a la planta de Transvasament de Viladecans el 8.XI (RBVA); (G). 1 ex. de 2n hivern a la maresma del Remolar el 22.XII (RBVA); (G). No trameses al CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al port pesquer el 4.III (JFOD); (G). 1 ex. al parc de Diagonal Mar l'11.XI (RRSB); (G). No tramesa al CAC.

GIRONÈS

Llagostera Diverses observacions a l'abocador de Solius: un adult el 12.IV (CACB); (G). Un adult el 9.XI (CACB); (G). Homologades pel CAC.

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teulades de la General del Cable: 1 ex. de 1r hivern del 2 (MRFA i RJNA) al 17.II (MRFA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 3.II (MRFA i AGRB) al 22.III (MRFA); (G). No trameses al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port: 1 ex. de 2n hivern el 17.I (ACTA); (G). Continua l'adult, present des del 25.VIII.07,

fins el 10.II (ACTA); (G). Un adult el 10.II (ACTA i JFOD); (G). 1 ex. de 1r hivern del 16.II al 2.III (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern els dies 8 i 9.III (ACTA i CAFA); (G). Continua l'ex. de 1r hivern, present des del 16.XII.07 fins el 9.III (ACTA i MPSA); (G). 1 ex. de 2n hivern del 16.II al 9.III (ACTA); (G). 1 ex. de 3r hivern els dies 27 i 28.IX (ACTA i MPSA); (G). Un adult del 28.IX fins a finals d'any (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern el 19.X (ACTA i MPSA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 15.XI fins a finals d'any (JFOD i MPSA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 6.XII fins a finals d'any (ACTA); (G). Homologades pel CAC.

Larus michahellis

Gavià argentat

Estatus Resident molt comú i en increment, tant al litoral com a l'interior. També és un migrador regular, tot i que és difícil de detectar els moviments amb els nombrosos residents al llarg de tot el territori. Les principals colònies de parelles reproductores es troben a les illes Medes i al delta de l'Ebre. A la resta del territori nidifica de forma més localitzada, i en menor nombre, tant a l'interior, com al litoral, on ho fa regularment en àrees urbanes.

La colònia del delta de l'Ebre, amb el major nombre de parelles reproductores del país, ha experimentat un creixement anual molt elevat (20,2%), amb 1.965 parelles més que al 2007. L'augment notable dels efectius ja ve succeint en anys anteriors, de manera que el nombre de parelles gairebé s'ha duplicat des del 2004. A les illes Medes el creixement és moderat (5,6%), per sobre del 3,3% dels darrers 11 anys. La població hivernant ha variat poc respecte 2008 en indrets com ara Banyoles o el mateix delta de l'Ebre (Anton 2008); destaquen els 1.190 exemplars de Manlleu, a 50 km de la costa. Pel que fa a l'alimentació cal

destacar la captura a Barcelona ciutat d'un xoriguer, però es desconeix com es va produir i si la presa estava viva en ser capturada; la manca de bibliografia sobre depredació de larids a xoriguers fa pensar que possiblement estigués mort.- MBMA.

Aigües catalanes Observat a tota la costa catalana en una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus. Presenta abundàncies màximes de 20-30 exs. a la costa central i sud i mínimes d'1-5 exs. al nord de Barcelona (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.010 exs. els dies 12 i 20.I (PFLB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 22.092 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 11.709 parelles nidificants (PDEA); (R, N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 13.459 exs. el 17.I (RGBA, ELXE i QAXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7.700 parelles nidificants a les illes Medes (MBMA); (R).

BARCELONÈS

Barcelona 2.145 exs. al port entre l'11 i el 12.I (RGBA, EGPA, FLSA i XSPA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la cruïlla passeig de Gràcia amb Diagonal que porta un xoriguer *Falco tinnunculus* al bec el 2.III (SHOA); (B).

OSONA

Manlleu 1.190 exs. ajocats a les teulades de la General Cable el 10.I (MRFA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2.491 exs. a l'estany el 16.IX (CFQA); màxim anual (N).

Larus cachinnans**Gavià caspi**

Estatus Accidental. Les citacions a Catalunya no han estat homologades.

Malgrat que el CR/SEO encara no ha fet pública cap homologació a nivell d'estat espanyol, doncs n'està revisant els criteris d'identificació (de Juana *et al.* 2007, Dies *et al.* 2008), el CAC sí ha començat a homologar-ne. En el cas que s'homologuin noves citacions, podria confirmar-se que la situació d'aquesta espècie a Catalunya respon a una presència regular com a hivernant i en migració, encara que en nombre molt escàs. Com els altres anys, la immensa majoria dels exemplars detectats són joves en el seu primer any de vida. Seria interessant saber si això respon a la realitat o si és perquè la identificació d'aquesta espècie en plomatge de primer hivern és menys complicada que en plomatges d'edats més avançades.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzá 1 ex. de 2n any de calendari a l'abocador de Pedret el 8.III (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l'embassament el 2.III (ACTA, JFOB, PJAA i MPSA); (G). Homologada pel CAC.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al port pesquer el 4.III (JFOB); (G). No tramesa pel CAC.

OSONA

Manlleu Diverses observacions a les teulades de la General del Cable: continua l'ex. de 1r hivern localitzat el 22.XII.2007 fins el 2.II (MRFA, RJNA i AGRB); (G). 1 ex de 2n hivern el 3.II (MRFA i RJNA); (G). 1 ex de 1r hivern el 10.II (MRFA, DCXC i GMCC); (G). No trameses al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port: 1 ex. de 1r hivern el 9.II (ACTA i MGTA); (G). 1 ex. el 17.II (ACTA); (G). Homologades pel CAC.

Larus marinus**Gavinot**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC. La seva distribució s'estén per la costa est d'Amèrica del Nord i per les costes atlàntiques d'Europa.

Tot i que aquesta és una espècie amb molts pocs registres homologats a Catalunya, aquest és el quart any consecutiu amb dades enviades a l'anuari. Possiblement, aquest fet és conseqüència d'un augment en l'esforç d'observació, tot i que caldrà estar atents a l'evolució que es pugui dur a terme els pròxims anys.- ACTA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a la platja de ca l'Arana el 16.I (FLSA, SBXC i ARMC); (G). Homologada pel CAC.

Rissa tridactyla**Gavineta de tres dits**

Estatus Regular com a hivernant i en migració, en abundància variable segons els anys, generalment escàs. Molt més comú mar endins que a la costa. Accidental a l'inte-

rior, excepte en anys excepcionals d'arribada massiva.

L'any 2008 totes les observacions arreu del litoral català són de pocs individus i sempre entre gener i febrer, a excepció de cap de Creus, on s'observen nombrosos exemplars, -fins a 16 en un sol dia- entre gener i març. Les darreres citacions prenupcials s'han enregistrat al mes d'abril, patró habitual de l'espècie a les zones més pelàgiques de l'Empordà i al conjunt del país. Les primeres observacions postnupcials són a primers d'octubre, registre prou primerenc respecte anys anteriors.- PFLB.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs. adults entre el 12 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 2 exs., un d'ells jove i l'altre adult a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD); (E). 14 exs., 12 d'ells joves en pas cap al sud a la mateixa localitat el 8.III (PFLB, MCME, SOAA i JVSA); (E). 1 ex. al llarg d'una sortida en barca per la costa nord de cap de Creus el 29.III (MRFB, JMMA, ABRA, RFRA, JVLA, MBFA, BMBA, TMJA, ECFA i ALTA); (E). 2 joves en pas per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); (E). Un jove entrant des del far de Roses fins a l'interior del port el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE); darrera citació prenupcial (E, F). 2 exs., un d'ells jove i l'altre adult en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r hivern el 9.I (PJAA); (E).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 1 ex. el 17.I (ACTA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 5 exs. en pas per la punta d'es Plom el 12.I (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la costa de Gavà el 14.I (LTBB); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 1r hivern entre el 10 (MOVA) i el 12.I (VPRA, PARA i PTEA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona Un adult dins del port el 10.II (ACTA i JFOD); (E).

Sterna nilotica

Curroc

Estatus Estival nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi ha més de 300 parelles, sembla que en augment. A la resta del territori és un migrant escàs, però regular, al litoral, i més ocasional a l'interior. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.IV (RSSC i AFXF); primera citació prenupcial (F). 11 exs. als arrossars de la Gallinera el 15.VI (JMMA i TMJA); màxim anual (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la desembocadura de la riera de Riudecanyes el 16.VII (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Canal Vell el 30.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 12 exs. a l'aeroclub Empordà l'11.V (JPCA); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 9.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 14 exs. a la mateixa localitat, més 1 ex. a la maresma del Remolar el 27.VI (FLSA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 9.IV (XLBA); (G, F). 1 ex. el 5 i el 12.VI (XLBA); (G, F).

OSONA

Vilanova de Sau 1 ex. a l'embassament de Sau el 19.VIII (RJNA i MRFA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA); primera citació prenupcial (F). Mínim de 2 exs. el 22.VII (JEBA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 exs. sobre l'embassament l'11.VI (MGTA i JCMG); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.VIII (ADGA i MGSA); (G).

Sterna caspia

Xatrac gros

Estatus Estival reproductor excepcional al delta de l'Ebre. Migrador regular al litoral, molt escàs excepte al delta de l'Ebre. El

pas postnupcial és més conspicu que el prenupcial. Hivernant ocasional al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la gola del Fluvià el 18.III (AOTA i JGIA); primera citació prenupcial (F, G). 1 ex. als estanys del Matà el 5.IV (JMAA, TMJA i PCXE). (G). 1 ex. a can Martinet el 14.IV (AOTA); (G). 1 ex. a la Massona el 12.VI (JMAA); (G). Un adult en vol pels conreus del Cortalet el 3.IX (RGBA); darrera citació postnupcial (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 16 exs. a la badia del Fangar i les Olles el 21.III (JBAB, JMXH, MVCA i ALTA); (N). 1 ex. a la badia del Fangar el 31.XII (RBVA, SSXA, JBXL i VFXA); darrera citació de l'any (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma del Remolar el 4.IV (MGVA); primera citació prenupcial (F). 21 exs. a la mateixa localitat el 6.IV (MGVA i STVB); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana entre el 9.IV (FLSA, SBXC i ARMC) i el 23.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la maresma del Remolar: 2 exs. el 30.VIII (STVB); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la Vidala el 6.X (STXB); darrera citació postnupcial (F).

***Sterna bengalensis* ×
*Sterna sandvicensis***

Xatrac bengalí × Xatrac becllarg

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sense cap anella a la platja de ca l'Arana del 16 (CFXB)

al 23.V (FLSA i FSEB); (M). 1 ex. aturat a la platja de ca l'Arana amb anella de PVC de color groc a la pota dreta del 29.V (XLBA, DBRA i ABRA) al 7.VI (XLBA); (M). 1 ex. a la platja de ca l'Arana l'11 i el 12.VIII (FLSA); (M). No tramesa al CAC.

Sterna sandvicensis

Xatrac becllarg

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on es reproduïxen prop de 2.000 parelles. Present tot l'any pel litoral, especialment durant les migracions i a l'hivern. Accidental, amb algunes citacions a l'interior.

Aigües catalanes Present només entre el delta de l'Ebre i Tarragona amb un màxim de 3 exs. davant el delta el 29.V durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 19 exs. el 9.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural de Cap de Creus Diverses observacions en pas per la punta de cap de Creus: 14 exs. el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 8 exs. el 5.VII (PFLB, PBXB, SOAA i SJJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 35 exs. 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 452 exs. a la platja de ca l'Arana el 21.V (FLSA i FSEB); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Uns 200 exs. davant de la desembocadura del Besòs el 8.X (XLBA); màxim anual (N).

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. en vol direcció nord-est el 10.IV (PABA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA); (G).

Sterna hirundo

Xatrac comú

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on es reproduïxen diversos milers de parelles. Present durant les migracions i l'estiu per tot el litoral. Rar a l'interior. Hivernant excepcional.

Aigües catalanes Present només entre el delta de l'Ebre i Tarragona amb nombres d'entre 1-3 exs. durant el transcurs d'una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diverses observacions en pas per la punta de cap de Creus: 1 ex. el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); (F). 7 exs. el 12.IV (OCVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Canal Vell el 29.III (JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 exs. per la punta d'es Plom el 5.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 25 exs. el 21.V (FLSA i FSEB); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Observacions regulars al llarg del mes de juny davant de la desembocadura del Besòs amb un màxim de 7 exs. el 14.VI (XLBA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a la Carrana el 3.VII (EBMA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port: 1 ex. el 6.I (ACTA i MPSA); citació hivernal (F). 1 ex. el 18.X (ACTA); darrera citació postnupcial (F).

Sterna anaethetus**Xatrac embridat**

D'homologar-se aquesta citació, seria la primera per a Catalunya.- MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banya el 18.VI (DBCA, JPVE, YBSA, MGTA i JCMG); (G). No tramesa al CAC.

Sterna albifrons**Xatrac menut**

Estatus Nidificant estival localitzat al delta de l'Ebre, on crien uns quants centenars de parelles, entre 300 i 500, i molt recentment al delta del Llobregat, on un petit nucli ha començat a nidificar, però cal veure si es consolida. Present durant les migracions al litoral, tot i que de forma escassa.

La cria al delta del Llobregat constitueix la primera dada de cria en aquest espai (López 2008b) i representa el primer indicatiu de nidificació segura d'aquesta espècie fora del delta de l'Ebre des que va deixar

de criar a l'Empordà a la dècada dels 70 (Muntaner *et al.* 1984).- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a 11 milles nàutiques de cap de Creus el 3.V (GGXB i ALXE); (G, F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 23.IV (JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 12 exs a les salines de Sant Antoni el 17.IV (JBAB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 10 exs. el 12.IV (FLSA, PBGA i ALTA); primera citació prenupcial (F). Una parella covant el 26.VI (FLSA); primera dada de reproducció segura en aquest espai (R). 7 parelles nidificants segures i 2 parelles possibles (FLSA); (R).

GARRAF

Sitges 2 exs. en vol pel mar observats des del port de Garraf el 18.V (FMVA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. volant en direcció nord a la platja del Miracle el 15.VI (ACTA i MPSA); (G).

Chlidonias hybrida**Fumarell carablanc**

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on és comú. Migrador comú, especialment pel litoral, i més conspicu en el pas prenupcial. Hivernant regular, amb alguns centenars d'exemplars al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als estanys del Matà el 26.III (JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 89 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 3 exs. a la bassa del golf Serres de Pals el 26.III (CBLA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 3 exs. el 4.IV (RBVA, MGVA i LOXA); primera citació prenupcial (F). Fins a 147 exs. el 17.IV (ARMC); màxim anual (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 7.VIII (FLSA i SBXC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 5.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar Un adult a la desembarcadura de la Tordera el 22.IV (PABA i EBMA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 5 exs. el 5.IV (MPLA i MPOA); primera citació prenupcial (F). Mínim de 30 exs. el 16.IV (JEBA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. al riu el 23.IV (PJAA); (G).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 7.IV (JRRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.V (EDBB); darrera citació prenupcial (F). 15 exs. el 20.VII (MVCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 27.IX (XRCA i SRXB); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Pineida: 60 exs. el 10.IV (CAFA); màxim anual i primera citació prenupcial (N, F). 2 exs. el 12.V (CAFA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil el 25.VII (ACTA); única citació postnupcial (F).

Chlidonias niger**Fumarell negre**

Estatus Migrador comú, especialment pel litoral, més conspicu en el pas prenupcial. Estiuejant regular al delta de l'Ebre, però sense evidències de nidificació actualment. Hivernant rar.

Aigües catalanes Observat 1 ex. l'1.VI davant de Barcelona durant una campanya pesquera realitzada entre el 29.IV i el 4.VI des del sud del delta de l'Ebre fins al cap de Creus (PASA); (F, N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de can Comes el 25.IV (AOTA), primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la gola del Fluvià el 6.VI (AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil als estanys del Matà el 17.IX (JMAA i AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfaca el 15.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del Ter el 28.IX (JPJA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 9 exs. des del mirador de cal Francès el 2.V (MGVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja

de ca l'Arana el 21.V (FLSA i FSEB); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a el calador del Filant el 25.VIII (EBDA); (G, F).

OSONA

Vilanova de Sau Diverses observacions a l'embassament de Sau: un adult en plomatge nupcial el 7.IV (MRFA); primera citació prenupcial (F, G). Un adult en plomatge nupcial el 4.V (MRFA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a la zona nord de l'estany el 30.IV (CFQA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.IV (AVPA); primera citació prenupcial (F). Mínim de 15 exs. el 28.IV (RBVA); màxim anual (N). 1 ex. el 7.X (JEBA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 26.VIII (TMXC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 18.IX (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou Alguns exs. al cap de Salou el 4.V (ACTA i MPSA); (G).

Chlidonias leucopterus

Fumarell alablanc

Estatus Migrador regular, però escàs, al litoral. Més comú al pas prenupcial, potser per ser més fàcilment identificable en aquesta època. Hivernant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. a l'estany Europa el 28 (LSLB i CAUA) i el 29.IV (JRRF); primera citació prenupcial (F). 3 exs. sobrevolant el mar el 18.V (JSPC i CPMB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix el 19.IX (XPCA); primera citació documentada en aquest espai (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a l'Alfacada: 3 exs. el 19.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 16.V (OCVA i MLCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar del 26.IV (SMXA i JCMC) al 3.V (MGVA); primera citació prenupcial (F). 8 exs. a la platja de ca l'Arana l'11.V (XLBA); màxim prenupcial (N). Diverses observacions a cal Tet: 2 exs. el 4.IX (FLSA i ARMC); primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 6.IX (AOA i MLMB); (F). 2 exs. el 9.IX (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 2 i el 16.V (DCFA i EBMA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. el 27.IV (SBXC, CCXD, FLSA, NUTA, EDBB, PFXD i ATXD); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 12.V (RBVA i OLGA); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Pineida: 1 ex. el 16.IV (CAFA); (G). 1 ex. el 12.V (ACTA i CAFA); (G).

Uria aalge

Somorgollaire

Estatus Accidental. Diverses citacions a Catalunya homologades pel CAC. La subespècie *albionis*, que és la que es detecta a Catalunya, es distribueix per Irlanda, el sud d'Anglaterra, Helgoland, la Bretanya i l'oest de la península Ibèrica. Possiblement hiverna, entre d'altres llocs, al mar Mediterrani.

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per la punta d'es Plom el 5.IV (ABRA); (G). Homologada pel CAC.

Alca torda

Gavot

Estatus Present regularment i en bon nombre durant les migracions, així com a l'hivern, quan es troba més localitzat. Molt més ocasional a finals de primavera i principis d'estiu (de maig a juliol).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. entre el 12 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. a la punta de cap de Creus el 2.II (PFLB, OCVA, SOAA i FMXD); màxim anual (N). 1 ex. a la costa nord de cap de Creus el 9.II (RFRA, JMAA, AOTA i ALTA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Sa Planassa el 5.XII (PFLB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la platja del Prat el 31.XII (XLBA i MGVA); primera citació postnupcial (F).

Fratercula arctica

Fraret

Estatus Regular en baix nombre mar endins, entre mitjans d'hivern i finals de primavera, amb observacions més escasses fins a principis d'estiu, i rarament a la tardor i principis de l'hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. davant de Cadaqués el 16.III (GGXB i ALXE); (E). 2 exs. en pas cap al sud per la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); (E). 1 ex. davant de cap Norfeu el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE); (E). 1 ex. a la punta de cap de Creus el 13.IV (JBCE i MRXD); (E). 1 ex. a 15 milles nàutiques de cap de Creus, enmig d'un grup de dofins llistats *Stenella coeruleoalba* el 3.V (GGXB i ALXE); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 3.X (PFLB); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. en pas per la punta d'es Plom el 5.IV (ABRA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a 20 milles nàutiques davant la ciutat el 16.III (TASA i HBXA); (E).

Pterocles orientalis

Xurra

Estatus Resident nidificant molt localitzat i escàs en alguns secans de la Noguera i el Segrià.

El nombre d'exemplars detectats en el cens simultani hivernal és el més elevat des de l'any 2000. Aquest increment en el nombre d'exemplars respecte anys anteriors podria ser atribuïble a les mesures de gestió de l'hàbitat aplicades al secà de Bala-

guer la primavera anterior i a unes condicions meteorològiques favorables durant el període reproductor. El secà d'Alguaire-Almenar continua sent la zona d'hivernada més important per l'espècie.- ABBB.

NOGUERA

Balaguer 5 exs. al secà el 6.X (MLMB); (G).

NOGUERA/SEGRIÀ

S'estima la població en 29-37 exs. a partir de les dades del cens simultani de febrer (DGJA, GBCA, JSZA, OLGA, MPOB, MLMB, FPTA i IRXD); (N).

SEGRIÀ

Alguaire 25 exs. al pla de Vilanova el 12.II (FGPA); (N).

Pterocles alchata

Ganga

Estatus Resident nidificant molt localitzat i escàs en alguns secans de les Garrigues i el Segrià. Visitant molt rar en algun punt de Catalunya fora de les comarques on no nidifica.

Els resultats obtinguts en el cens simultani hivernal mostren un increment de la població hivernal de ganga respecte l'any anterior, i se situa en nivells similars als hiverns de fa 2 i 3 anys. L'observació d'un exemplar a la Noguera és destacable ja que és la primera citació en aquesta comarca des de l'any 1996 (Copete 1998).- ABBB.

GARRIGUES/SEGRIÀ

S'estima la població en 107-109 exs. a partir de les dades del cens simultani de febrer (DGJA, GBCA, JSZA, MPLA, JBSA, MGMA i FPTA); (N).

NOGUERA

Balaguer Un mínim d'1 ex. al secà el 6.II (JEBA); (G).

Columba livia

Colom roquer

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori. La majoria són d'origen domèstic, però també hi ha poblacions salvatges a les comarques interiors i al litoral en cingleres de l'Empordà i el Garraf. El colom de ciutat (var. *domestica*) prové de coloms roquers domesticats i modificats per selecció artificial que s'han escapat o han estat alliberats i han establert poblacions salvatges pròximes als assentaments humans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 17% (*, n=69).
Índex 2008=3,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 15% (*, n=87).
Índex 2008=2,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 30 exs. purs a l'illa Encalladora el 8.X (ACHA i GDBA); màxim anual (N).

Columba oenas

Xixella

Estatus Resident nidificant no gaire nombros, distribuït de forma més continua a les comarques de l'interior, i molt més escàs o absent en les comarques litorals. En aquestes és més un hivernant regular, localment comú.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=38).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=37).
Índex 2008=6,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 80 exs. al SOCC 328, el Cortalet, el 4.XII (JMAA); (N). 1 ex. als estanys del Matà el 20.IX (PFLB i ALTA); primera citació postnupcial (F).

Rabós 80 exs. en migració a coll de Plaça el 16.III (ABRA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda el 17.X (CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. en uns camps propers a l'Estartit a finals de maig (DBRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 7.II (EPXE); primera citació prenupcial (F). 15 exs. a can Dimoni el 9.III (RBVA); (N). 1 ex. a Reguerons el 20.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. a can Serola l'11.I (SCIA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 24.XI (XRCA); (G).

Columba palumbus

Tudó

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori. Regular en migració arreu de Catalunya on pot comportar-se com a estival, i especialment com a hivernant, segons la zona.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=151).
Índex 2008=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=162).
Índex 2008=0,9

BARCELONÈS

Barcelona 755 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i el 12.XI (MGVA); (N, F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 965 exs. al SOCC 224, estany d'Ivars Nord, el 9.XII (JEBÀ); (N).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2.840 exs. al SOCC 200, Sot del Fuster, el 9.I (SWWA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 50 exs. en vol direcció sud pel riu Besòs el 27.IX (FMVA); primera citació en pas postnupcial (F).

Streptopelia decaocto

Tórtora turca

Estatus Resident nidificant arreu del territori, localment comú tant al litoral com a l'interior, i actualment en expansió. Va colonitzar Catalunya als anys 70.

Cal destacar les citacions en pas pel cap de Creus en una espècie en la que estan

mal coneguts els moviments a llarga distància. Les poques dades que es coneixen corresponen a desplaçaments realitzats per juvenils en dispersió (Cramp 1985, Wernham *et al.* 2002), cas al que es pot atribuir la dada de juny, si en coneguèssim l'edat de l'individu. Les dades de març i abril no es situen en aquest marc i resulten encara més sorprenents. Cal estar atents i afinar les observacions per determinar si es tracta de moviments regulars o observacions purament anecdòtiques.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=155).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=175).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en pas al puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB); (B). Diverses observacions en pas per la punta de cap de Creus: 1 ex. el 6.IV (MPGB); (B). 1 ex. en pas actiu cap al sud el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); (B).

RIBERA D'EBRE

Miravet Almenys 120 exs. als afores del poble el 8.XII (RACC); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un niu amb restes d'ous aparentment depredats el 4.I (OGVA); dada primerenca de cria (R).

Streptopelia turtur

Tórtora

Estatus Estival nidificant de forma regular i estès per tot el territori. Comú en migració. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=192).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau l'11.IV (MOVA); primera citació prenupcial (F). Un juvenil al Cortalet el 29.IX (RBVA i SSSA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Canal Vell l'11.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 26.II (ABBB); primera citació prenupcial molt primerenca (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'1.IV (JEBA i AVPA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 31.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar 1 ex. al pont de les Clarisses el 13.X (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. al pantà de l'Alzina el 16.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

Estatus Introduïda. Resident localitzat tradicionalment en alguns nuclis urbans del litoral, tot i que recentment també es coneix d'algun punt de l'interior. Sembla en expansió, tot i que el nombre d'exemplars és encara petit. La seva àrea de distribució natural s'estén per l'Àfrica en una franja al sud del Sàhara i també per l'Índia, el nord-est del Pakistan, Myanmar, i el sud-est de la Xina.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 17% (ns, n=16).

Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a l'estany Europa el 29.IX (RBVA i SSXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 11 exs., alguns dels quals són juvenils, al parc de can Mercader l'11.VIII (RGLA); (N).

Delta del Llobregat Diverses observacions al camí de València: 14 exs. el 14.IX (RBVA); màxim anual (N). 12 exs. el 24.IX (RBVA); (N).

Molins de Rei Una parella nidificant en un plataner *Platanus × hispanica* a la plaça de l'església el 13.VI (CFMA); (R).

Sant Joan Despí 9 exs. el 21.I (JCCA); (N).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. als jardins de l'hospital de Sant Pau l'11.III (XTGA); (G). Un grup d'un mínim de 30 exs. al barri del Gorg el 16.XI (ADSA); (N). 34 exs. al parc de Diagonal Mar l'1.IV (RRSB); (N).

GARROTXA

Besalú 2 exs. el 25.II (MLLA); (G).

GIRONÈS

Girona 2 exs. entrant al niu en una palmera a la residència sacerdotal "Bisbe Sivi-lla" el 30.IV (CPVA); (R). Presència regular al llarg de l'any en diferents punts de la ciutat amb un màxim de 15 exs. junts el 5.VII (PFLB, AAXD i MRXA); (N).

OSONA

Gurb 1 ex. entre el 16 i el 23.VII (RJNA); (G). 1 ex. el 4, el 5 i el 15.VIII (RJNA); (G).

Myiopsitta monachus

Cotorreta de pit gris

Estatus Introduïda. Resident i nidificant, localment abundant, sobretot en alguns nuclis urbans del litoral, i amb presència més recent en nuclis de l'interior. En expansió. La seva àrea de distribució natural és a l'Amèrica del Sud, des del sud de Bolívia fins al centre d'Argentina. Ha estat introduïda als Estats Units i en diversos països d'Europa.

Continua l'expansió d'aquesta espècie a Catalunya amb noves localitats a diverses comarques i una nova citació de cria segura a la Garrotxa. Està present ja a com a mínim 29 comarques. Entre les comarques en que manquen citacions figuren les vuit amb menys població humana, una relació que sembla mantenir-se en el temps (Domènech *et al* 2003). El nombre d'individus també augmenta tal com apunten les tendències i l'índex de canvi obtinguts pel SOCC des del 2002. A la ciutat de Barcelona la població de cotorres ha passat dels 1.441 individus l'any 2001 als 1.990 exemplars del 2006 (Carillo 2008). Cal pensar que l'expansió territorial i l'augment poblacional continuarà vistes les estimacions per Barcelona (Carillo 2008) que apunten a una productivitat de 4 polls per parella reproductora l'any 2003, superior a la de



la seva àrea de distribució natural, i una alta taxa de supervivència (80%, l'any 2006).- JDGA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=31).
Índex 2008=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=34).
Índex 2008=1,6

ALT Penedès

Mediona 1 ex. a Sant Pere Sacarrera el 28.I (XBGA); (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 14.III (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 20 exs. a l'Areny del Molí el 15.III (ACXK i JCRD); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 104 exs. al SOCC 55, passeig de Sant Joan, el 14.XII (DMVB); (N).

GARROTXA

Olot 1 ex. arreglant un niu als plàtans *Platanus × hispanica* del pont de Ferro el 2.IV

(FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

PLA D'URGELL

Torregrossa 1 ex. dalt d'un xop *Populus nigra* el 12.XII (FMSA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 38 exs. als Salats i Muntanyans el 12.I (AVDA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Clamator glandarius

Cucut reial

Estatus Estival nidificant escàs, més freqüent a la depressió de l'Ebre, encara que localitzat, i distribuït de forma més discontinua a la resta del país, sobretot al litoral, on és molt més escàs. En migració és regular però escàs. Hivernant ocasional.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=35).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. a la closa salobrosa el 14.I (AOTA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany de Palau el 15.I (SSAA i FSJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 16.II (LOXA); primera citació prenupcial (F). Un juvenil a la Murtra el 21.VIII (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 21.II (RCAA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. a la carretera Artesa-Aspa el 21.II (JVLA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Un jove fora del niu atès per una parella de garses *Pica pica* a la bassa dels Aious del 18.VI al 10.VII (JRCD i SMMD); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Més de 10 exs. juvenils als camps de la Torre d'en Malla el 17.VII (OBDA); concentració postnupcial destacable (N).

Cuculus canorus

Cucut

Estatus *C. c. bangsi* estival nidificant comú a tot el territori. Comú també en migració. *C. c. canorus* comú en migració.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=261). Índex 2008=0,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 14.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). Un juvenil a can Camins el 14.VIII (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de fase gris al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (G, F).

OSONA

Sant Martí d'Albars 1 ex. a la Blava el 22.III (JCCA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a Saurí, Sorpe, el 28.III (EVAA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 29.III (DGJA. LBAA i GBCA); primera citació prenupcial (F).

Tyto alba

Òliba

Estatus *T. a. alba* és resident nidificant comú a tot el territori, tot i que és absent a les zones de muntanya, especialment als Prepirineus i Pirineus. Hivernant regular, amb l'arribada d'exemplars centreeuropeus, tal com s'ha comprovat amb les recuperacions d'ocells anellats. *T. a. gutata* té un estatus pendent de clarificar, ja que hi ha citacions a les terres de Lleida on encara no se sap si són variacions de coloració individuals o si es tracta realment d'una extensió de l'àrea de distribució d'aquesta subespecie.

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 5 exs. al mas de la Pagesa el 28.XI (JPCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. als voltants de cal Tet el 23.I (CFXB); (N).

GIRONÈS

Llambilles 1 ex. atropellat a la carretera direcció Cassà de la Selva el 17.XII (PFLB); (B).

RIBERA D'EBRE

Ascó Es constata la desaparició d'un territori ocupat el 2007, que al 2008 és ocupat pel gamarús *Strix aluco* (PJAA); (B).

SELVA

Vilobí d'Onyar 2 exs. morts a l'eix transversal, un el 3.XI i l'altre el 17.XI (ADGA); (B).

Otus scops**Xot**

Estatus *O. s. mallorcae* estival nidificant, comú arreu del territori, però absent a les zones subalpines i d'alta muntanya als Prepirineus i al Pirineu. Comú en migració. Hivernant regular, però molt escàs, en algunes zones humides del litoral, més comú com més al sud. *O. s. scops* probablement comú en migració arreu, tot i que no hi ha cap recuperació que ho confirmi.

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. sentit l'11.III (AROA); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix-Hort del Rector el 13.X (FCFA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Cabó 1 ex. cantant als plans de l'Oliva el 15.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. cantant a mas Pinell el 27.IX (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a l'estació biològica del Remolar el 2.III (JCMC i JIXA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. respon al reclam del mussol comú *Athene noctua* el 6.X (HFSA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. a Salou el 16.III (MGBA); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Cervera 1 ex. a Sant Pere el Gros el 14.III (FSVA); primera citació prenupcial (F).

Bubo bubo**Duc**

Estatus Resident comú i ben distribuït arreu del territori, més comú en ambients mediterranis, i molt més rar i escàs en ambients d'alta muntanya i boscos subalpins, als Prepirineus i Pirineus. És absent a la plana de Lleida i a zones del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Entre 6 i 10 parelles reproductores (PFLB i ALTA); (R). 1 ex. mort sota la línia elèctrica del puig de Bufadors el 30.VII (JTGC); (B). 1 ex. trobat mort atropellat a Vilajuïga i portat als Agents Rurals el 12.XI (JVSA); (B). **Serra de l'Albera** 12 parelles nidificants localitzades durant el primer cens realitzat en aquest espai (MBFA); (R).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Es localitza un territori nou de cria al parc del Foix (CGGA, XBGA i HSCA); (R).

MARESME

De 7 territoris coneguts a la comarca, 5 estan ocupats, hi ha niu en 4 i treuen polls únicament en 3 casos. La productivitat dels nius amb èxit és de 2,66 polls/niu. Els dos nius en els quals no cria, molt probablement sigui a causa de la mort dels adults, ja que s'han localitzat dos adults electrocutats: un a la primavera i un altre a la tardor. En el cas de l'ex. localitzat a la tardor, als 15 dies hi havia un altre mascle amb la femella del territori (HAPA i JGMA); (R).

PALLARS SOBIRÀ

Vall de Cardós 1 ex. vist, posat i volant, a Ribera de Cardós el 16.VIII (JSVA, ASLB i FRXC); (G).

SEGRIA

Aspa Un mascle cantant al cementiri el 12.II (RGLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Athene noctua**Mussol comú**

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori, tot i que és absent en àmplies zones dels Pirineus i en ambients muntanyencs. Algunes observacions puntuals suggereixen una entrada d'ocells hivernants que s'afegeixen a la població resident, o potser exemplars en dispersió des de nuclis no llunyans, aspecte encara mal conegut.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=54).
Índex 2008=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=54).
Índex 2008=2,1

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al km 3,1 de la carretera BV-2115 el 16.III (PTEA); (B).

GIRONÈS

Sant Andreu de Salou 1 ex. atropellat a la carretera de Caldes a Cassà de la Selva el 18.IX (PFLB); (B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Densitats màximes de 14 i 16 parelles/km² (FMVA); (N, R).

Strix aluco**Gamarús**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori en tota mena d'ambients forestals. Absent només en les zones menys boscoses del país (bona part de l'Empordà i la depressió Central, i el delta de l'Ebre).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. trobat mort al peu d'uns dels finestrals del monestir de Sant Pere de Rodes l'11.VIII (ETXB i ALTA); (G, B).



BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al castell de Montjuïc el 6.XI (JBCC); (G).

GIRONÈS

Girona 4 polls volanders posats en uns plàtans a la Devesa el 26.II (HMPA); primers polls de l'any (R).

RIBERA D'EBRE

Ascó Una parella establerta en un territori que l'any anterior estava ocupat per l'òliba *Tyto alba* (PJAA); (B, R).

Asio otus**Mussol banyut**

Estatus Resident nidificant escàs distribuït de forma irregular, i que ocupa tant zones forestals de muntanya com ambients de terra baixa, especialment bosquets entre camps de cultiu. Hivernant regular, sobretot a l'interior, en especial a la depressió Central i en algunes zones humides litorals.

Són especialment interessants les dades sobre joques hivernals repartides per diferents àmbits biogeogràfics. També són remarcables les dades de cria a nous quadrats, tal i com va passar el darrer any (Anton 2008), tot i que no es pot saber amb claredat si es deuen a dinàmiques expansives locals, a redistribucions espacials o a un augment extensiu de l'esforç de prospecció nocturn. En aquest darrer sentit, la citació de Cànoves es realitza durant les tasques de camp de l'atles de rapinyaires nocturns del Montseny. La dada del delta del Llobregat és d'interès per la data en què es produeix i s'hauria de considerar diverses possibilitats a l'hora de valorar-la; podria tractar-se d'un exemplar pertanyent a la població flotant, un nou reproductor a la zona, o bé un migrant tar-

dà ja que a Europa occidental es poden veure exemplars en migració activa fins al juny (Wernham *et al.* 2002).- FMVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de ca l'Arana anellat el 14.V (FSEB i EDBB); (G).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Polls sentits a Sant Vicenç de l'Esclet el 17.V (JRBB); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Sant Gregori 2 polls a Cartellà el 17.V (PFLB i ACHA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la roureda del Castellet el 25.IX (JCCD i MVEB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivriars i Vila-sana Mínim de 4 exs. en un dormidor el 19.I (JEBA i GBCA); (B, N).

RIBERA D'EBRE

La Torre de l'Espanyol 3 exs. vistos i sentits en uns camps de fruiters vora el poble l'11.II (RGLA); (G).

RIPOLLÈS

Llanars Un dormidor de 9-10 exs. al llinard del bosc amb prats de pastura al veïnat d'Espinalba el 13.I (PIPA i MDCA); (B, N).

URGELL

Bellpuig d'Urgell 3 polls volanders al cementiri el 7.V (RBVA i OLGA); primera dada de juvenils de l'any (R).

VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL

Diverses observacions en una joca al sector meridional del Vallès Occidental: 10 exs. el 23.I, 12 exs. el 4.XI i 16 exs. l'1.XII (FMVA); (B, N). 12 parelles a la plana vallesana de les quals se'n fa el seguiment i es compro-

va l'èxit reproductor en 7. Per primera vegada es troba un niu al terra (FMVA); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Cànoves i Samalús Un mascle i una femella territorials i en festeig el 2.IV (RGLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Asio flammeus

Mussol emigrant

Estatus Migrador i hivernant regular, que es pot observar arreu del territori, però sobretot a les comarques litorals. També pot aprofitar l'abundància puntual de recursos tròfics i criar excepcionalment i rara en àrees on no és habitual, cas de la depressió Central, per exemple, o al delta de l'Ebre el 1962.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas per la punta de cap de Creus el 25.IV (ACXG i ANXA); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 26.IV (MFRA); darrera citació prenupcial a Catalunya (E, F). 1 ex. a l'estany de Palau el 2.X (SSAA); primera citació postnupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada l'1.XI (ISSB, MHHA i NSSB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. el 16.XI (JLGA i ASSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 30.X (ABRA); (E). 1 ex. a la platja del Remolar el 27.XI (FLSA); (E). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 18.XII (RBVA); (G).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 1 ex. al secà el 16.XII (JEBB); (E).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. a la timoneda el 21.IX (AGXG); primera citació postnupcial a Catalunya (E, F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el 12.II (JEBB) i el 5.III (SSAA); (E).

Aegolius funereus

Mussol pirinenc

Estatus Resident nidificant als boscos subalpins del Prepirineu i Pirineu, distribuït de forma regular en aquesta àrea, especialment als dominis del pi negre *Pinus uncinata* i el pi roig *Pinus sylvestris*. Hi arriben exemplars de forma regular, possiblement dispersius, des del Pirineu aragonès (un individu anellat a Osca) i la població centreeuropea segons dades genètiques.

De les dades d'aquest any destaca per segon any consecutiu, la dada de la Garrotxa (Anton, 2008), en un lloc i hàbitat no típic per l'espècie, que pot tractar-se d'un individu en dispersió. Cal, però, una prospecció més exhaustiva per aclarir la natura d'aquestes citacions. Per altra banda, les dades de reproducció publicades indiquen una reducció del nombre d'ous per posta respecte a les dades excepcionals del 2007 (Anton, 2008), tot i que són similars a les de 2006 (Estrada & Anton, 2007). El nombre de polls que volen per niu és dramàticament baix, només comparable al registrat l'any 2005 (Bonada *et al.* 2005). L'alt fracàs de la reproducció s'explica per l'elevat abandonament de postes (un 50%), fenomen observat per primer cop i causat

segurament per les nevades tardanes i les pluges persistents durant el període de cria. La gran variació de l'èxit reproductiu en el mussol pirinenc ja ha estat descrit a la península escandinava i es relaciona amb la disponibilitat d'aliment (Löfgren *et al.* 1986).- EBMA.

ALT URGELL

Montferrer i Castellbò Un mascle cantant a mig matí a Sant Joan de l'Erm a uns 1.800 m. el 14.III (PFXA); (E).

ALT URGELL/CERDANYA/RIPOLLÈS

En la present temporada de cria, les femelles controlades han post 3 ous de mitjana ($n=7$), han ecllosionat 0,62 ous per niu ($n=8$), han volat 0,5 polls per niu ($n=8$), han estat depredats un 25% dels nius ($n=8$) i s'han abandonat el 50% dels nius ($n=8$) (EBMA, ALNA, DPXE i ABGA); (E, R).

CERDANYA

GUILS DE CERDANYA Observat al Bac de la Comella durant el mostreig de l'atles d'hivern el 9.II (DOAA); (E).

GARROTXA

Olot Un mascle cantant en una pinada de pi roig *Pinus sylvestris* a 750 m d'altitud el 3.IV (BGCA); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. a les Planes de Son el 24.III (CNPA); (E).

Esterri de Cardós 1 ex. menjant una malle-renga emplomallada *Parus cristatus* recent capturada el 19.IX (RMOA i JCBC); (E, B).

Llavorsí 1 ex. al SOCC 284, Port-Ainé, el 19.I (JRSB); (E).

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Fins a 7 mascles territorials al forest d'Esterri la nit del 28 al 29.IV (JCBC); cens nocturn (E, N, R).

Caprimulgus europaeus**Enganyapastors**

Estatus *C. e. europaeus* migrador comú arreu del territori. *C. e. meridionalis* estival nidificant, i migrador comú arreu del territori, però amb presència discontinua com a nidificant, defugint les àrees d'alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. atropellat al trencant de Rabassers de Baix el 22.V (FPTB i PFLB); (B).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 18.IV (MOVA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al km 7,3 de la carretera BV-2115 el 5.V (PTEA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. en migració a Sant Pere Màrtir a darrera hora del 4.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a sant Daniel el 5.IX (ARVA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Ivers de Noguera 1 ex. a l'embassament de Santa Anna el 16.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. sobrevolant la Coromina del Bac el 22.IV (OPPBB); primera citació prenupcial (F).

Caprimulgus ruficollis

Siboc

Estatus Estival nidificant i migrador, més comú a la meitat sud de Catalunya, i molt més rar i localitzat cap al nord. Absent a les comarques pirinenques i prepirenques.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. atropellat a la T-11, prop del nucli urbà el 8.VI (FMSA); (B).

ALT PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. cantant a les masies de Sant Miquel el 26.IV (CGGA); primera citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. a mas de Melons el 25.IV (OLGA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex. cantant el 17.IV (JAIA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar 1 ex. atropellat a l'entrada sud el 15.VI (ADGA i MGSA); (B).

SOLSONÈS

Riner Un mascle cantant a Anglarill entre Su i Freixenet el 10.VII (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 3 mascles cantant el 15.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Apus melba

Ballester

Estatus Nidificant estival i migrador, comú arreu del territori encara que no distribu-

it uniformement com a nidificant, que es pot observar tant en àrees muntanyenques com litorals. En augment com a nidificant als nuclis urbans.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 16.III (MPSC, JVA i ALTA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Corçà Uns 300 exs. a la carretera en direcció Monells el 14.IX (MLUA); concentració destacable (N).

BAIX LLOBREGAT

El Prat del Llobregat 8 exs. a la Vidala el 10.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 4 exs. sobre cal Nani el 3.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Premià de Dalt 1 ex. a Sant Mateu el 4.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

Premià de Mar 8 exs. el 4.XI (ABBB); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Taradell 1 ex. al Vivet el 17.III (JPEA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Bellvís 15 exs. volant sobre lo Tossal Roig el 16.V (FMSA); presència estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre Mínim de 10 exs. a l'embassament d'Utxesa el 16.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Alguns exs. a la serra de ca l'Esstragués el 16.III (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Montornés del Vallès 350 exs. en migració al coll Mercader el 3.IX (JPSA); (N).

Vilanova del Vallès 9 exs. en migració activa el 6.XI (JFOB); darrera citació postnupcial (F).

Apus apus

Falciot negre

Estatus Nidificant estival i migrador, molt comú arreu del territori, especialment lligat als nuclis urbans. Accidental a l'hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a la Valleta el 22.III (PFLB, ACHA, HPMA i DSBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les salines de Sant Antoni el 17.III (JBAB); primera citació prenupcial (F). Més de 10.000 exs. en fort pas migratori d'uns 2.400 exs. per hora als Eucaliptus el 13.VII (RGBA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Esparraguera 1 ex. sobrevolant la bassa de can Cardús el 8.III (FSJA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Centelles Alguns exs. criant el 17.VII (ENSA i RRSB); data tardana de cria (R).

Gurb Uns 2.500 exs. sobre Puigllong l'1.V (MRFA); màxim anual (N).

SEGRÀ

Lleida Alguns exs. a l'interior del nucli urbà el 31.III (ESMA); primera citació prenupcial (F).

Apus pallidus

Falciot pàl·lid

Estatus Nidificant estival localitzat especialment en zones litorals o de marcat ambient mediterrani, sobretot en penya-segats marins, però també en nuclis urbans. Migrador regular pel litoral tot i que en baix nombre comparat amb *Apus apus*.

Les dades rebudes al 2008 indiquen que els primers exemplars s'han vist a principis de febrer, i els darrers a principis de desembre, fenologia habitual en aquesta espècie (Ferrer *et al.* 1996). A l'època de nidificació, destaca la cria segura a l'interior de l'Alt Empordà en una població (Albanyà) allunyada més de 30 km de la costa. A destacar la presència en època nupcial al Segrià a 80 km de la costa en una quadrícula propera d'on criava de manera segura al Baix Cinca a primers dels 80 (Ferrer *et al.* 1986, Sampietro *et al.* 1998) i possible al Segrià al 1990 (Calvet *et al.* 2000). Caldria estudiar el paper dels cursos fluvials com a patró d'expansió fora del litoral donat que aquestes dues darreres citacions es produeixen seguint el curs dels rius Fluvià-Muga i Segre, respectivament i a l'Aragó es cita criant a Saragossa sobre l'Ebre (Sampietro *et al.* 1998). RFSA.

ALT EMPORDÀ

Albanyà Uns 15 exs. nidificant als cingles de Rocapastora el 7.VII (FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al coll de Sant Genís el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB); primera citació prenupcial (F). 2 exs. joves de l'any a cap Norfeu el 28.VI (PFLB, MSFB, PFSA, OCVA, ALXE, MLCA, XVXB, GGXB, LFXB, ACHA i QXSA); primers juvenils de l'any (R). 8 exs. a la punta de cap de Creus i 2 exs. a s'Alqueria l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. sobre ca l'Ara-na el 28.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre la pineda del Remolar el 3.XII (RBVA i SSXA); darrera citació postnupcial o citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració a Sant Pere Màrtir el 5.XI (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Serós Almenys 2 exs. a l'església de la localitat el 29.V (MGMA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 5.II (AVDA i JVDA); primera citació prenupcial (F).

Alcedo atthis

Blauet

Estatus *A. a. atthis* resident nidificant que ocupa els cursos fluvials permanents des del nivell del mar (si la qualitat de l'aigua i les condicions de l'hàbitat ho permeten) fins als 1.000 m d'altitud. Defuig els Pirineus axials i les zones més altes dels Prepirineus, penetrant per les valls però evitant els vessants més alts. Migrador i hivernant especialment comú als cursos fluvials i a les zones humides, tot i que es pot trobar puntualment en zones allunyades de l'aigua. *A. a. ispida* desconegut, tot i que probablement migrador. Tres citacions a Catalunya.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=64).

Índex 2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=18).

Índex 2008=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'em-bassament del Foix el 3.IV (XPCA i PTEA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al riu Foix-Hort del Rector el 20.VII (PTEA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al Remolar el 4.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 23.VII (RMXH); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÉS

Barcelona 1 ex. pescant a l'estany del Turo Parc el 29.XI (LAMB); (G).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 26.III (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Besòs el 21.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

Merops apiaster

Abellerol

Estatus Nidificant estival, comú de forma local, però restringit als ambients mediterranis. Migrador comú arreu del territori.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.



Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=95).
Índex 2008=2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 33 exs. en pas cap al nord per sobre de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrera citació en pas prenupcial (F) 14 exs. en pas actiu cap al sud a es Jonquet el dia 18.VIII (PFLB, MSFB, PFSA, ARGC i CFLA); primera citació en pas postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.IV (JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda del Remolar el 29.III (DHXA i STVB); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys d'en Jordà el 5.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 7.X (DMVB); darrera citació postnupcial (F).

SEGRITÀ

Aspa 6 exs. al secà el 30.III (USSB i FRXE); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Riner 1 ex. a l'embassament de l'Alzina el 3.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Coracias garrulus**Gaig blau**

Estatus Estival nidificant escàs, distribuït de forma local a la depressió Central, l'Empordà, algunes comarques de Tarragona, i més irregularment per altres punts. Migrador regular, però escàs, que es pot detec-

tar fora de les àrees de cria, especialment al pas prenupcial.

Al 2008 es documenta per primer cop la nidificació al Bages i a la Selva i sembla que hauria pogut criar al Gironès. D'altra banda, continua l'augment del nombre de parelles detectades a l'Empordà (Anton 2008) i les dades del SOCC confirmen una tendència positiva malgrat que no sigui significativa, fet que cal atribuir al petit tamany de la mostra. El conjunt de totes aquestes dades, semblen indicar un increment d'efectius i una expansió geogràfica que cal anar confirmant any rere any.- MARC.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=20).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

27-30 parelles nidificants estimades (ABRA i ECFA); (N, R).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Vilaüt el 25.IV (JRRF); primera citació prenupcial (F). Població nidificant avaluada en 26 parelles (ABRA); (R).

ALT PENEDEès

L'Arboç 1 ex. posat en un cable als camps entre la fàbrica Omya Clariana i l'Arboç el 14.VI (PTEA); darrera citació prenupcial (F).

BAGES

Santpedor Diverses observacions a les Planes: 1 ex. el 12.V, un niu en una biga metàl·lica en un cobert de palla el 3.VI i 2 polls al niu el 2.VIII (XBXD i XGRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 12.VI (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un juvenil als erms de la Tancada el 25.IX (XTGA i RACC); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

3-4 parelles nidificants estimades (ABRA); (N, R).

Torroella de Montgrí 2 exs. al mas de la Pagesa el 14.VI (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als camps de la Ricarda el 6.III (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. als camps de la Ricarda i 1 ex. al camí de València el 14.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí de València del 18.VIII al 5.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F). Un juvenil a les pistes de l'aeroport l'11.IX (LTBB); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la Ranella el 5.VI (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Diverses observacions a Esclet: una parella realitzant vols nupcials el 21.V (ADGA i MGSA), 1 ex. el 19.VI (TMXC) i 3 exs. el 22.VI (XVGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Sant Martí Vell 1 ex. a la carretera de Madremanya a Sant Martí Vell el 21.IX (PECA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 1 ex. al secà el 25.IV (SWWA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla Un adult prop de la mancomunitat la Plana el 18.VII (JBCB); citació estival (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Un mínim de 2 exs. sedimentats entre Vilesa i Buseu del 23.VIII al 7.IX (JCBC); (G).

PLA DE L'ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. a Sant Mer el 6.VIII (ECXD); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar Es confirma la reproducció en un niu de picot verd *Picus viridis* a les Fonts, Salitja (ADGA i LMCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

URGELL

Tarrega Una parella als voltants d'Altet el 8.III (ADSA); primera citació prenupcial (F).

Upupa epops

Puput

Estatus Estival nidificant arreu del territori, més comú als ambients d'influència mediterrània. Defuig l'alta muntanya i les zones muntanyenques de bona part de la Catalunya humida. Presència durant l'hivern, de manera regular, en moltes zones humides tant de l'interior com al litoral, que poden correspondre tant a ocells sedentaris com a hivernants procedents d'altres zones.



La presència d'exemplars hivernants per tot el territori es constata amb les dades del SOCC, on es detecta una tendència a l'alça clarament significativa durant aquest període, fet que ens indica que probablement es queden molts més individus que uns anys enrere. Aquest fet emmascara l'inici de la migració prenupcial i fa molt difícil separar els individus migrants dels residents. D'aquí que les dades de primeres arribades siguin clarament tardanes en relació a la fenologia de l'espècie (Ferrer *et al.* 1986) ja que només es poden assegurar en un baix nombre de localitats.-MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=216).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 19% (*, n=120).
Índex 2008=2,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=14).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. observat dalt d'un arbre a l'interior de la fageda del solell del Puig-neulós el 30.III (PABA); (F, B).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al puig Culip, prop de la punta de cap de Creus el 8.III (FLSB) i 1 ex. al mas Rabassers el 8.III (PFLB, MCMB, SOAA i JVSA); primeres citacions prenupcials (F). 1 ex. en vol de mar cap a terra en direcció a la punta de la Figuera el 9.IV (PFLB, OCVA, GGXB i ALXE); (B).

BERGUEDA

L'Espunyola 1 ex. covant 7 ous en una caixa niu el 29.III (MBVA); (R).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. al Terrés el 27.XII (JFPC); citació hivernal (F).

Olot 1 ex. a Batet el 18.XII (FTCA); citació hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. a la partida de les Ínsules el 27.II (JCCD i MVEB); primera citació prenupcial en una comarca sense dades hivernals (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. a Escaló el 31.III (XGPB); primera citació prenupcial en una comarca sense dades hivernals (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Un jove de l'any ja volander al SOCC 23, la Palma d'Ebre, el 15.V (RACC); primera dada de juvenils de l'any (R).

Jynx torquilla

Colltort

Estatus Nidificant estival distribuït de forma irregular. Migrador regular, en baix nombre, i hivernant localitzat especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=90).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (ns, n=7).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 21.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 23.XII (XBGA, CGGA i HSCA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1-2 exs. hivernen al parc zoològic a finals d'any (JGGD); citació hivernal (F, G).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. hivernant al parc del Besòs fins el 25.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs a Sant Adrià el 20.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Verges Un mascle cantant el 8.VI (JPCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni l'11.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 29.VIII (EPXE); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Batet, la fageda d'en Jordà, el 28.III (FTCA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Ós de Balaguer 1 ex. al partidor de Gerb el 3.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Miravet 1 ex. al mas de Xesa el 21.III (CGGA, MCMF i XBGA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al torrent d'Aigüesvives, Brics, el 3.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Picus viridis**Picot verd**

Estatus Resident comú arreu del territori. Absent només en àrees molt localitzades, com per exemple el delta de l'Ebre.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=236).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=324).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=21).
Índex 2008=0,5

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle cantant al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (G).

Dryocopus martius

Picot negre

Estatus Resident nidificant als boscos del Prepirineu i Pirineu, als dominis dels boscos subalpins, i per sota d'aquests en avetoses i fagedes als Pirineus més occidentals, a rouredes i bosquets de valls, a vegades a prop de pobles o en ambients riparis i d'influència mediterrània al peu de les muntanyes. Aquests últims anys ha experimentat una expansió cap al sud i l'est de la seva àrea inicial de distribució.

Les dades aconseguides al 2008 indiquen que la població catalana de picot negre en àrees colonitzades durant la dècada dels 90, continua en expansió amb una tendència positiva com es pot comprovar en l'observació de Granera al Vallès Oriental i en les del Gironès. A més, es mantenen ocupats territoris descoberts els darrers anys a l'Alt Empordà (Agullana o Maçanet de Cabrenys) (Anton 2008). La resta correspon probablement a ocells en dispersió o a divagants que cerquen àrees de qualitat per establir-se. Concretament, les dades de finals de març i juny són d'ocells en territoris de cria, amb possibilitats de reproduir-se amb èxit si estan establerts en masses forestals madures. Ara bé, s'han de prendre amb cautela si no es confirma la seva reproducció, ja que en moltes ocasions podria tractar-se d'exemplars en ambients subòptims a causa de la fragmentació i la desconexió geogràfica de la població sedentària. – JRRC i JPCA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=33).
Índex 2008=1,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 15% (ns, n=48).
Índex 2008=2,9



ALT EMPORDÀ

Agullana 1 ex. a Santa Eugènia el 16.II (BMBA) i el 26.IV (TMJA i MSDC); (G).

Albanyà 1 ex. a la vall del Pincaró el 15.III (BMBA, TMMA, EUXA, PSGA, IMXA, MBFA, ECFA, SNXC i AOTA); (G). 1 ex. a Bassegoda el 3.V (MBFA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Maçanet de Cabrenys 1 ex. al clot dels Vilars el 8.VI (BMBA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR). 2 exs. a la serra de Bac de Grillera el 9.VI (FTCA); (G).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. a Puigsou el 6.XII (ABRA); (G).

Sant Martí de Llémena 1 ex. al collet de Bastarra el 5 (ACHA) i el 20.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. al sud del coll d'Estenalles, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el 10.II (JBDA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granera Un mascle cantant i tamborinant el 22.I (FMVA); (G).

Dendrocopos major

Picot garser gros

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular pels ambients forestals de la Catalunya humida, els Prepirineus i Pirineus, i més irregularment pels ambients mediterranis o de la Catalunya més seca. Pot presentar-se irregularment a l'hivern en zones de plana on no és present.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=205).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=116).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=16).
Índex 2008=1,8

RIBERA D'EBRE

Riba-roja d'Ebre 1 ex. a Santa Madrona en una zona cremada el 7.VI (RBVA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (G).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba Una femella portant al niu un cargol blanc i petit a la Batlloria el 26.V (JRCD i SMMD); (R).

Dendrocopos medius

Picot garser mitjà

Estatus Resident localitzat i en baix nombre a la Val d'Aran, on nidifica en roures pures o mixtes.

Els anys 2007-2008, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb la participació de la guarderia de medi ambient del Conselh Generau d'Aran, ha realitzat el cens de la població aranesa en el marc d'un projecte sobre ecologia dels picots a l'Aran



promogut pel Conselh. La població es concentra a les roures de roure pènel del Baish Aran, entre el sector d'Es Bòrdes al sud i Val de Toran, al nord. S'han localitzat un total de 50-104 individus diferents en el període pre-reproductor (època de zel). S'estima la presència d'un total de 31-52 territoris. La densitat estimada és de 0,14-0,21 territoris/10 ha si es considera la totalitat de l'hàbitat potencial que augmenta a 0,36-0,63 territoris/10 ha en l'àrea ocupada pel picot. Les densitats màximes s'emporten als sectors de Les i Es Bòrdes, amb una mitjana de 0,61-0,68 territoris/10 ha respectivament, seguits de Bossòst i Bausen amb 0,41 territoris/10 ha, i finalment Toran amb 0,37 territoris/10ha. - JCSA, JFCB i JSZA.

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a Bèussa i 2 exs. a Pans de Trapa el 2.II (CGGA i MCMF); (E).

Dendrocopos minor

Picot garser petit

Estatus Resident localitzat en determinats cursos fluvials amb bosc de ribera de la Catalunya humida (cas de la Muga i el Fluvià), o en plantacions forestals (cas de la Selva), i altres àrees amb presència de caducifolis de tipus centreeuropeu, com per exemple la Val d'Aran o la Cerdanya.

Bon nombre d'observacions en boscos de ribera, hàbitat preferent de l'espècie al Principat. Són destacables les citacions del Baix Ebre i Ribera d'Ebre, nous indrets colonitzats molt lluny dels nuclis reproductors coneguts. Les del Baix Empordà, Osona, Vallès i Alt Penedès confirmen l'expansió de l'espècie. Alguns, com el de Santa Cris-



tina d'Aro es mantenen ocupats els darrers anys (Estrada & Anton 2006, Anton 2007). La citació d'una parella a Sant Quirze del Vallès, és interessant i caldria comprovar la seva reproducció, ja que podria produir joves en un àrea buida de territoris reproductors que beneficiarien en un futur la connexió amb indrets de qualitat meridionals. A la població de la Tordera destaquen els baixos valors de productivitat i d'èxit reproductor en comparació als anys 2001 (Aymí & Herrando 2005) i 2007 (Anton 2008), segurament producte de la mala meteorologia primaveral, a part, de la mala qualitat d'hàbitat.- JRRC i JPCA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 1, fe d'errates.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 13% (ns, n=26).
Índex 2008=1,3

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions al parc del Foix: un mascle que s'ha instal·lat en un territori de cria i que el defensa tot cantant intensament enfront de possibles intrusos el 26.II (XBGA, CGGA i HSCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR). Una altra parella amb el mateix comportament el 3.III (XBGA, CGGA i HSCA); (R).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. a l'illa d'Audi el 6.XI (CBCB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Diverses observacions a la vall de Molins: mínim 2 exs. el 15.I, 1 ex. el 28.I i 1 ex. sentit el 14.VI (XIPA i JEXD); (G).

Santa Cristina d'Aro 1 ex. a can Provençal els dies 27.I, 24.II, 3.III, 13.X i 25.XII (CACB); (G).

MARESME/SELVA/VALLÈS ORIENTAL

Conca Fluvial de la Tordera 15 mascles i 15 femelles en una superfície d'uns 150 km², comptabilitzant un total de 12 parelles, 2 tríos i 3 territoris amb un individu solitari. Es troben 12 nius i es comprova la nidificació amb èxit en 4 parelles. El promig de polls nascuts al niu ha estat de 2,25 polls (n=4). L'èxit reproductor de 1,12 (n=8) i la productivitat de 0,64 (n=14); (JRRC, JPCA i SMMD); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al riu Ter a Gallifa el 27.IV (ABBB); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix Un mascle a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 25.IV (DMCA i FVXA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Quirze del Vallès Diverses observacions al bosc de ribera del torrent de la Betzuca: una femella el 8.II (JSZA i MPMC); (G). Una parella el 16.II (JSZA i MPMC); (G).

Terrassa Un mascle picant l'escorça d'un arbre al torrent de la Grípia tocant la C-58 el 23.II (XMCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells Un mascle el 19.I (VPRA); (G).

Melanocorypha calandra

Calàndria

Estatus Resident nidificant comú a la depressió Central de Catalunya i més localitzat a les comarques interiors dels Ports cap al sud. Excepcional a l'hivern a les comarques on no és present.

L'hàbitat de la calàndria ha sofert una dràstica transformació en els darrers anys provocant una tendència poblacional regressiva, que va portar a que en *l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* es considerés el seu estatus com proper a l'amenaça (NT). Així, doncs, tenint en compte que és el primer any que les tendències poblacionals SOCC són positives (ICO 2009), malgrat no siguin significatives en cap dels dos períodes tinguts en compte, són dades esperançadores. Caldrà seguir l'evolució de l'espècie.- MRSA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=10).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 41% (ns, n=15).
Índex 2008=18,8



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 22.VII (AOTA); (G).

Santa Llogaia d'Alguema 1 ex. a l'aeròdrom el 2.V (ERRB); (G).

CONCA DE BARBERÀ

Santa Coloma de Queralt 1 ex. a Tossal Rodó el 6.X (XBGA); (G).

NOGUERA

Balaguer Diverses observacions al SOCC 27, secà de Balaguer: 137 exs. el 28.I, 230 exs. el 14.V, 150 exs. el 16.VI i 463 exs. el 28.XII (JEBÀ); 4 màximes xifres del projecte (N).

Calandrella brachydactyla

Terrerola vulgar

Estatus Nidificant estival d'àmbit local en àrees litorals, i més àmpliament distribuïda a la depressió Central i altres comarques de l'interior, tot i que és comuna només de forma local. Espècie en regressió a Catalunya.

L'any 2008 continua la tendència negativa de l'espècie en el conjunt de Catalunya. En aquest marc, les dades del SOCC apunten que l'espècie pot haver perdut quasi el 60% dels efectius nidificants que presentava el 2002 (ICO 2009), i al cap de Creus només s'ha registrat una observació en un indret on anys enrere es calculava la seva població en més de 10 parelles (Feliu 2009). Malgrat això hem de destacar la primera dada de cria a la Selva, comarca on havia desaparegut com a nidificant (Estrada *et al.* 2004) i el bon nombre de citacions rebudes, la majoria d'ocells migrants.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -18% (*, n=13).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Garriguella 7 mascles al sector de mas Hortús (AOTA); (R).

Mollet de Perelada 19 mascles al principal nucli reproductor de la província de Girona (AOTA); (R).

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle cantant al pla de les Gates el 23.IV (PFLB); primera i única citació de l'any (F).

BAIX CAMP

Reus 19 exs. a l'aeroport el 13.IV (ABBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. a l'itinerari SOCC 262, erms de la Tancada, el 14.V i 5 exs. el 13.VI (ACMA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja dels militars el 2.IV (FSEB); primera citació prenupcial (F). 27 exs., alguns d'ells mascles cantant, a l'aeroport el 25.IV (ABBB); màxim prenupcial (N, R).

Sant Joan Despí 1 ex. en un camp de fruiters el 26.V (AAMA, MPLA i SSAA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració activa cap al sud el 23.VIII (CODA); (G, F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 25.IV (XLBA); (G, F).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 19.III (OCVA i MRFB); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions al secà d'Alfés: 3 còpules el 16.IV, un adult duent becada el 21.VI i un volander el 26.VI (JFGE); (R). 4 exs. a l'itinerari SOCC 142, timoneda d'Alfés, el 31.V (JCGA); (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar Un adult peixant un jove volander als plans de Vilobí l'1.VII (ADGA);

nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions a Gallecs: 2 exs. l'11.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 27.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 22.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Calandrella rufescens**Terrerola rogenca**

Estatus Resident nidificant localitzat en determinats punts com el delta de l'Ebre i en alguns llocs de la depressió de l'Ebre. Fora d'aquestes àrees és molt rar o irregular com a divagant o potser en migració.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada: 1 ex. el 14.I, 4 exs. el 25.IV i 5 exs. el 30.V (OCVA); (E). Diverses observacions a l'itinerari SOCC 262, erms de la Tancada: 11 exs. el 14.V, 9 exs. el 13.VI i 2 exs. el 29.XII (ACMA); (E). 30 exs. a l'Alfacada entre el 17 i el 19.III (JBCG); (E, N). Entre 2 i 6 exs. a l'Alfacada del 22.III al 15.V (JBCG); (E, F).

Galerida cristata**Cogullada vulgar**

Estatus Resident nidificant comú a tot el territori, absent només al Pirineu i Prepirineu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=129).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=89).
Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs., com a mínim un dels quals és un jove de l'any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

Galerida theklae**Cogullada fosca**

Estatus Resident nidificant distribuït de forma irregular, tot i que és localment comú. Defuig la Catalunya humida i l'àrea d'influència pirinenca, i és més freqüent als ambients de caire mediterrani sec.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=21).
Índex 2008=0,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -7% (ns, n=32).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 15 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

Lullula arborea**Cotoliu**

Estatus *L. a. arborea* resident nidificant que té una població no gaire nombrosa, distribuïda de forma irregular a Catalunya des del nivell del mar (on no és abundant) fins a l'alta muntanya, als boscos de pi negre *Pinus uncinata*. Les màximes abundàncies s'assoleixen, però, a l'estatge montà. Migrador i hivernant no gaire abundant, però regular. *L. a. pallida* resident que té una població no gaire nombrosa, distribuïda de forma irregular al sud de Catalunya.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=142).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 12% (*, n=239).
Índex 2008=2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. al pla de les Gates el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB); darrera citació prenupcial en un indret on no hi cria (F). 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera citació post-nupcial en un indret on no hi cria (F).

BARCELONÈS

Barcelona 19 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 9 exs. el 3.XI (MGVA); (N, F).

Alauda arvensis**Alosa vulgar**

Estatus *A. a. cantarella* resident nidificant distribuïda de forma més regular als Pirineus i la Catalunya humida, i de manera més irregular pels ambients més secs o mediterranis, tant de la terra baixa al litoral, on es pot trobar localment, com a l'interior. Migrador molt comú i hivernant abundant. *A. a. arvensis* migrador molt comú i hivernant abundant.

Les poblacions més nòrdiques d'aquesta espècie a l'hivern migren cap al sud i oest del continent europeu, essent França i Espanya zones importants per la seva hivernada (Donald 2004). Per segon any consecutiu s'ha registrat una tendència de població hivernant (SOCC) significativament positiva, assolint novament el valor màxim respecte els hiverns anteriors (ICO 2009).- MRSA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=49).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 23% (*, n=81).
Índex 2008=4,8

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc del Foix l'11.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 13.IV (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 9.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex. a la bassa de can Boada el 6.IV (PFLB, PFSA i MSFA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. cantant al puig dels Jueus el 28.IX (OCVA i MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.X (JEBA); primera citació postnupcial (F).

URGELL

Preixens 1.013 exs. al SOCC 92, secà de Montgai, el 16.XII (JEBA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès 4 exs. a Gallecs el 28.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Riparia riparia

Oreneta de ribera

Estatus Nidificant estival molt localitzat, especialment a les planes al·luvials de l'Ebre i el Segre. Migrador regular i comú arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 10 exs. en pas cap al nord per la punta de cap de Creus el 7.VI (PFLB, SOAA i JVSA); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 28.II (JMAA i TMJA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni més 2 exs. a Reguerons l'11.VI (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a cal Tet el 20.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F). Uns 100 exs. a la Murtra el 8.IX (RBVA); (N).

Sant Joan Despí 1 ex. al riu Llobregat el 7.III (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 30.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

Malgrat de Mar 70 exs. a la desembocadura de la Tordera el 7.IV (PABA i EBMA); (N).

OSONA

Manlleu Més de 50 exs. al Ter el 7 i el 8.IV (MRFA i RPEA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 10 exs. el 4.III (JEBa); primera citació prenupcial (F). Mínim de 50 exs. el 8.IV (AVPA); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Flix 4 exs. al meandre el 5.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils Alguns exs. als estanys el 2.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

Ptyonoprogne rupestris

Roquerol

Estatus Resident nidificant en tota mena d'ambients rupícoles o urbans des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, on pot ser estival només. Migrador i hivernant més localitzat, lligat molt sovint a zones humides litorals, en àrees on no hi és a l'estiu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=75).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=83).
Índex 2008=1,9

ALT EMPORDÀ

Sant Llorenç de la Muga 300 exs. al SOCC 290, Sant Llorenç de la Muga, el 13.I (JCTB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 35 exs. sobre can Bosquet, la Rierada, el 12.X (JRRC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 54 exs. en migració directa cap al sud al turó Blau el 12.X (CODA); primera citació postnupcial (F, N).

GARRAF

Sitges Uns 20 exs. a l'hotel Miramar el 13.X (RBVA); primera citació postnupcial (F). Un mínim de 60 exs. aturats a l'església mentre plovia el 12.XI (RBVA); (N).

GIRONÈS

Girona 21 exs. a l'hospital Josep Trueta el 19.III (CPVA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu Uns 40-50 exs. sobre Puigrodon el 13.III (CMGA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 110 exs. al SOCC 83, congost de Collegats, el 3.V (DMVB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al balcó del Mediterrani el 6.X (ACTA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Bossòst 1 ex. el 18.XII (CGGA, MCMF i XBGA); citació hivernal (F).

Vielha e Mijaran 4 exs. a Vielha el 4.I (CGGA i XBGA); citació hivernal (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 70-80 exs. pels voltants de la desembocadura de la Riera Seca el 6.III (FMVA); (N). 3 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 14.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès Un niu amb 4 polls situat a la sortida de la cinta transportadora de la màquina de triturar granit de la pedrera de can Collet el 3.VII (HAPA i JGMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Hirundo rustica**Oreneta vulgar**

Estatus Nidificant estival, comú arreu del territori. Migrador molt comú arreu del país. Hivernant regular, però molt escàs, en algunes zones humides litorals.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=125).
Índex 2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=23).
Índex 2008=0,4

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 17.II (CJMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Uns 15 exs. a la vall de Molins el 20.XII (XIPA i JEXD); citació hivernal (F).

Pals 1 ex. als arrossars el 13.XI (XIPA i JEXD); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al riu el 4.I (FLSA); citació hivernal (F). 3 exs. a la maresma del Remolar el 19.II (FLSA i SBXB); primera citació prenupcial (F). 4 exs. a cal Tet (CGGA i XBGA) i 1 ex. a l'aeroport el 9.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F). Alguns exs. sobre ca l'Arana el 6.XII (JJMB, RRSB, JLDA i PTEA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Badalona 1 ex. en direcció nord a la platja el 31.XII (LCPA); citació hivernal (F).

Barcelona 1 ex. sobrevolant el parc zoològic el 9.XI (JCJA); darrera citació postnupcial (F). 4 exs. en vol a Sant Andreu el 6.XII (JCCA); citació hivernal (F).

GIRONÈS

Girona Un mínim de 10.000 exs. en un dormidor vora el pavelló de Fontajau el 2.IX (HMPA); (N).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. entre un grup de roquers *Ptyonoprogne rupestris* el 30.I (ABBA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Uns 10.000 exs. el 22.IX (JBSA) i el 4.X (JEBA); (N).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp 1 ex. a l'aiguabarreig Segre-Cinca el 23.II (JBGJ); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 20.II (DCFB i XRCA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la platja dels Prats el 8.XI (EGTA); darrera citació postnupcial (F).

Hirundo daurica

Oreneta cua-rogenca

Estatus Nidificant estival, localitzat i no gaire abundant, distribuït de forma irregular per ambients de caire mediterrani. Migrador regular, però escàs, arreu del territori, detectat més sovint al pas prenupcial. Hivernant excepcional.

L'espècie segueix una tendència a l'alça, ja sigui amb la colonització de nous territoris com en zones de l'Urgell, Tarragonès i Maresme, o augmentant la densitat de parelles nidificants a indrets habituals de cria, com indiquen els censos anuals realitzats a cap de Creus. Les observacions de 2008 mostren una fenologia habitual, des de primers de març a primers de novembre, on destaquen algunes dades de possible pas prenupcial tardà al mes de juny al delta de l'Ebre i al Besòs.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Durant els censos de reproductors es visiten tots els ponts i búnquers del parc natural amb un resultat de 29 nius ocupats i 3 nius amb nidificació probable (PFLB); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 7.III (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la platja de la Marquesa l'1.VI (JTOA i RSBB); possible darrera citació prenupcial tardana (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la gola del Ter l'1.XI (ABRA); darrera citació prenupcial (F).



BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 4.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 2 exs. a Plana Novella el 26.X (RGLA); darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

El Cogul 2 exs. l'1.III (SWWA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 4 exs. als afores el 7.VII (ARHA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

OSONA

Santa Eulàlia de Puigoriol 2 exs. descansant en uns cables elèctrics a l'interior del poble l'11.XI (ABBB, OSFA i RTLA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 7.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Ferran el 28.VI (ACTA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

Vila-seca 1 ex. a la Pineda el 8.III (ACTA); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Belianes 2 exs. agafant fang i portant-lo dins una cabana per fer niu el 22.V (FPTA i JBSA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Delichon urbicum**Oreneta cuablanca**

Estatus Nidificant estival molt comú arreu del territori. Migrador regular i molt comú per tot el territori. Hivernant excepcional.

Tot i mostrar una tendència del SOCC força fluctuant al llarg del període 2002-2008, si bé no és significativa, mostra un lleuger augment del 30% respecte la població del 2002. Destaca però, la davallada del 10% respecte el 2007 (Índex 2007=1,4), sent un exemple més dels mals resultats generalitzats de la reproducció degut possiblement a les pluges del 2008. D'altra banda, cal subratllar la citació dels 5.000 exemplars observats en migració postnupcial a Olèrdola, màxima concentració d'individus publicada a l'anuari. Al 2008 s'han rebut dades des del febrer (20.II, Aiguamolls de l'Empordà) fins al novembre (23.XI, Lleida) dins el patró conegut de migració de l'espècie. Destaquen les dades de nidificació que aporta el projecte Orenetes. La colònia mitjana calculada a partir dels nius censats pel projecte Orenetes el 2008 (n=36.215) és de 5,2 nius, estant molt per sobre la colònia situada a Sant Andreu de Llavaneres.- ADGC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=71). Índex 2008=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. en pas actiu prenupcial cap al nord a Sa Pla-

nassa l'11.VI (PFLB i GVXC); darrera citació en migració prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 20.II (JMAA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Olèrdola Més de 5.000 exs. en migració en poc més de 2 hores sobre el turó dels Tres Partions el 29.IX (XBGA, CGGA i HSCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Vidala el 25.II (FLSA i SBXB); primera citació prenupcial (F).

CERDANYA

Alp 106 nius a 1.264 m (JCPB); major altitud documentada al projecte Orenetes (R).

GARRAF

Sitges 1 ex. a l'església el 12.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 618 nius actius a tot el municipi (ARHA); major nombre documentat al projecte Orenetes (R). 230 nius a la façana del patí interior d'avinguda Sant Andreu de Llavaneres s/n (ARHA); façana amb major nombre de nius al projecte Orenetes (R).

MONTSIÀ

Freginals 3 exs. al Montsià el 6.III (ISSB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 15.III (JCCD i MVEB); primera citació prenupcial (F).

SEGRIA

Lleida 2 exs. a la Seu Nova el 23.II (RBXA); primera citació prenupcial (F). Un grup

força nombrós a la plaça d'Espanya el 18.XI (ESMA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 4.XI (JVDA); darrera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. a l'estany Llong de Colomers a 2.200 m el 21.X (XNPA); darrera citació postnupcial (F).

Anthus richardi

Piula grossa

Estatus Accidental, que s'ha convertit en hivernant regular, però amb molt pocs ocells, molt localitzats en zones planes litorals. Diverses citacions homologades. Es distribueix des del centre d'Àsia fins al mar d'Okhotsk. Com a hivernant arriba fins a l'oest d'Europa, inclosos alguns punts de la península Ibèrica i Balears.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de can Comes el 16.II (JMAA); (G). 1 ex. als prats de Vilaüt el 8.IV (RSSC i AFFB); darrera citació prenupcial (G, F). 3 exs. als prats de can Comes el 8.X (AOTA, JGIA i ALTA), dels quals 2 exs. resten als prats del mas Trencat el 19.X (ABRA i AOTA) primera citació postnupcial (G, F). 1 ex. al mas Trencat el 6.XI (AOTA i JMAA) i 1 ex. a les salsures a tocar la Riereta el 26.XI (AOTA); (G). 1 ex. a l'estany de Palau el 31.X (SSAA); (G). 1 ex. a les dunes de la Rubina el 26.XI (AOTA); (G). 1 ex. a les salsures a tocar la Riereta l'1.XII (AOTA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Fins a 4 exs. al mas de la Comandanta entre el 2.I (JTOA i RSBB) i el

12.II (CJMA); (G, F). Homologada pel CAC. 4 exs. a la Platjola, 3 exs. a l'Alfacada i 4 exs. als erms de la Tancada el 7.I (DBCA); (G). 1 ex. a l'Illa de Riu entre el 27.I (ACHA, PFLB, HPMa, JTOA, RSBB i MSFB) i el 12.II (CJMA); (G). 1 ex. de 1r hivern a l'Alfacada el 13.III (OCVA, JFBB i MLCA); (G). 1-2 exs. a l'Alfacada entre el 23.III (JBCG) i el 26.IV (ACHA, PFLB, OCVA, JSVA i JGCB); darrera citació prenupcial (G, F). Fins a 1 ex. a l'Illa de Riu del 16.XI a finals d'any (JTOA i RSBB); (G, F). 4 exs. a la Tancada el 29.XI (JFOD); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a la maresma del Remolar l'1.X (PBGA, JBOL i FRRA); primera citació postnupcial (G, F). Homologada pel CAC. 1 ex. a l'aeroport l'11.XII (ABBB); (G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboadura del Besòs l'11.IV (MCVA); (G).

Anthus campestris

Trobat

Estatus Nidificant estival, distribuït de manera irregular especialment pels ambients secs de la terra baixa, o al nivell del mar, en alguns punts del litoral de forma local, a la depressió Central i àrees properes, i en petits nuclis dispersos per la demarcació de Tarragona. En general, defuig la Catalunya humida i l'àrea pirinenca, tot i que es pot trobar també a l'alta muntanya, molt puntualment. Migrador regular escàs, més conspicu al pas prenupcial.

L'any 2008 s'ha rebut una interessant mostra de noves localitats de cria que es donen en indrets on no s'han produït incendis forestals en els darrers anys, àrees que el



trobat colonitza fàcilment de manera oportunista (Estrada *et al.* 2004). Aquest fet fa pensar que poden ser poblacions viables a llarg termini. Destaca especialment la dada del Pallars Sobirà ja que les dades de cria a l'alta muntanya són escasses (Estrada *et al.* 2004). D'altra banda l'índex de 2008 al SOCC és el major des de 2003, tot i que la tendència global en el període 2002-2008 continua sent negativa.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=38).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a Sobrestany el 4.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració sobre el turó dels Tres Partions el 27.IX (XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 21.IX (XLBA, PMBE, RBVA, LPXE i RSLA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. observat durant la 7a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa els dies 21 i 23.IX (FTCA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. prop del pla de l'Aire el 12.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Manlleu-Santa Maria de Corcó 2 exs. a la zona de Puigagut del 10.V al 14.VI (AGRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (F).

Torelló 1 ex. a Espadamala el 20.IX (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 2 mascles cantant a la Portella, Comes de Rubió, a 2.300 m. el 13.VII (MLLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 7 exs. al Sot del Fuster el 6.IV (EFSA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar Una parella criant en un camp de regadiu reconvertit a pastura l'1.VII (ADGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

SOLSONÈS

Olius Un mascle cantant a Brics el 22.VI (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Anthus trivialis

Piula dels arbres

Estatus Nidificant estival limitat a la Catalunya humida i les zones muntanyenques com el Pirineu i Prepirineu, on pot

ser abundant localment, i molt més localitzat en altres nuclis muntanyencs del sud, com ara la serra de Prades. Migrador regular i comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=39).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sedimentat a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a Montjoi el dia 18.X (MFRA i JBCD); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. en pas per l'estany de Palau el 27.III (SSAA i AROA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 18.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 31.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

Torrelles de Llobregat 1 ex. a la zona de can Coll el 9.III (JMXC); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 52 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 30 exs. el 4.X (MGVA); (N, F).

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs a el 20.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. a la serra del Montsià el 20.III (ISSB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 5 exs. al pla de l'Aire el 27.VIII (AGRB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 5.X (JEBBA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 6.X (JBGC); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 4.V (DCFB i XRCA); darrera citació prenupcial (F).

Anthus pratensis

Titella

Estatus Migrador i hivernant molt comú per tot el territori, especialment als ambients de plana i més escàs als de muntanya.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=139).
Índex 2008=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a sa Planassa el 23.IV (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 4.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d'Empordà 1 ex. als arrossars de Sobrestany el 4.X (ABRA i NPXB); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 810 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F). 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 27.IX (RRSB); primera citació postnupcial (F).

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 14.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Folgueroles 1 ex. als Focs el 19.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

Tona 2 exs. als camps prop la Mancomunitat el 4.X (JBCB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.X (JEBA); primera citació postnupcial (F). 101 exs. al SOCC 224, estany d'Ivars Sud, el 9.XII (JEBA); (N).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. al pla d'Olius el 13.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

Anthus cervinus**Piula gola-roja**

Estatus Migrador regular, encara que escàs, detectat de forma localitzada especialment en alguns punts del litoral i prelitoral, com per exemple el delta del Llobregat, els aiguamolls de l'Empordà i a comarques com el Vallès Oriental. Més conspicu en el pas prenupcial que en el postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Bàscara 2 exs. el 10.IX (PFLB); citació postnupcial (E, F).

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.IV (RSSC i AFXF); primera citació prenupcial (E, F). Mínim de 30 exs. als estanys del Matà el 5.V (ABRA, RAJB, AOTA i FTCA); màxim prenupcial (E, N). 1 ex. als prats de can Comes el 14.V (AOTA i JGIA); darrera citació prenupcial (E, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a la Noria: 7-8 exs. el 26.IV (JFOB i CGGB); primera citació prenupcial (E, F, N). 3 exs. el 27.IV (LEEA, REEA i AAXC); (E). 10 exs. el 30.IV (JFOB i PHHD). 1 ex. anellat a l'Alfacada el 2.V (JBGC); (E). 1 ex. a l'Alfacada el 3.V (JBGC); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. als arrossars de Riet Vell el 13.IX (EYYA); citació postnupcial (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 25.IV (RBVA); primera citació prenupcial (E, F). 1 ex. al camp de futbol el 2.V (MGVA); (E). 2 exs. a la maresma del Remolar el 3.V (MGVA); darrera citació prenupcial (E, F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració a Sant Pere Màrtir el 22.IX (MGVA); citació postnupcial (E, F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 3.V (DCFB); (E). Una femella el 4.V (DCFB i XRCA); (E).

URGELL

Belianes 2 exs. al secà el 8.IV (MCVA); (E).

Anthus spinoletta

Grasset de muntanya

Estatus Nidificant estival comú a l'alta muntanya pirinenca. Migrador regular però no especialment nombrós a la resta del territori, tot i que localment pot ser molt comú en algunes zones humides, i hivernant regular i ben distribuït per les zones humides tant del litoral com de l'interior.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=60).
Índex 2008=3,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en ple plomatge nupcial al mas d'en Caussa el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. als estanys del Matà el 14.X (JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. vora el Poble Nou el 18.X (CJMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars el 14.X (AOTA i ABRA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 16.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 9.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espadama el 19.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 207 exs. al SOCC 359, Lladorre, el 9.XII (APSA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 111 exs. anellats durant les campanyes de primavera, estiu i tardor (SSAA, MPLA, JFGE, GBCA i MLMB); (N). 1 ex. anellat l'11.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.X (JEBA); primera citació postnupcial (F).

Anthus petrosus

Grasset de costa

Estatus Accidental. Diverses citacions homologades pel CAC. Es reproduïx a les costes d'Escandinàvia, les Illes Britàniques i l'oest de França. Hiverna al mar del Nord, al litoral atlàntic d'Europa i a les costes del Marroc i Tunísia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Rubina els dies 20 i 21.XII (JMAA i AOTA); (G). No tramesa al CAC.

Motacilla flava

Cuereta groga

Estatus *M. f. cinereocapilla* nidificant ocasional i localitzat a Catalunya, anual en els darrers anys i possiblement en expansió. Migrador escàs arreu del territori. *M. f. feldegg* accidental. Algunes dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén pel sud i l'oest de Iugoslàvia, Bulgària, sud d'Ucraïna, Crimea, costa oest del mar Caspi, Iran, Afganistan i al sud de Grècia a Irak. *M. f. flava* migrador regular i molt comú arreu del territori. *M. f. flavissima* migrador regular i comú arreu del territori, amb un major predomini a la migració de primavera. *M. f. iberiae* estival nidifi-

cant, distribuït de forma irregular per alguns cursos fluvials i zones humides, encara que també és present en alguns prats de muntanya. Migrador regular i comú arreu del territori, especialment abundant al pas postnupcial a la conca de l'Ebre. Hivernant molt escàs, però darrerament regular, en zones humides del litoral com el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre. *M. f. thunbergi* migrador regular arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle a l'estany del Cortalet el 4.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. juvenils als estanys del Matà el 20.VI (JMAA); primera citació de juvenils de l'any (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Goleró l'11.III (CGGA, MCMF i XBGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la bassa de les Olles el 7.XII (OBDA); citació hivernal (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un adult als prats de la gola del Ter el 8.XI (AOTA i ABRA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 26.II (ABBB); primera citació prenupcial (F). Uns 500 exs. a cal Tet el 3.IX (RBVA); concentració destacable (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 30.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 12.V (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a Saurí el 30.III (JRBS); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 13.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VIII (DGCA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 15.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

Motacilla citreola

Cuereta citrina

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. La seva distribució s'estén pel nord i el centre d'Àsia, fins a Iran, Afganistan i Rússia europea. En expansió cap a l'oest. Hiverna principalment a l'Índia i el sud-est d'Àsia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle als estanys del Matà el 2.IV (JMAA i TMJA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Gualta 1 ex. de 1r hivern en un camp inundat el 21.IX (JPCA i XGMA); (G). No tramesa al CAC. Un adult en un camp inundat el 14.X (AOTA); (G). Homologada pel CAC.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.XI (SSAA); (G). No tramesa al CAC.

Motacilla cinerea

Cuereta torrentera

Estatus Resident nidificant distribuït per tot el territori sempre que trobi ambients adequats. Migrador i hivernant regular, arreu del país.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=69).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=166).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -12% (ns, n=6).
Índex 2008=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a la vall de Santa Creu el 16.III (PFLB, PFSA i MSFB); darrera citació prenupcial (F). 10 exs. a l'embassament del Club Med i rodalies del pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 4.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

Motacilla alba

Cuereta blanca

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, excepte les zones litorals del sud de Catalunya, on és més ocasional. Migrador i hivernant comú que augmenta sensiblement el nombre d'exemplars a l'hivern.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=93).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=349).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. arribant de mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); (B). 2 exs. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera citació postnupcial (F).

Rabós 9 exs. en direcció nord el 22.III (MBFA i BMBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Uns 80 exs. a la joca de l'embassament del Foix el 18.I (XBGA, CGGA i HSCA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un adult amb 2 polls volanders al parc central de Nou Barris el 10.V (JCJA); primera dada de juvenils de l'any (R).

Motacilla alba yarrellii

Cuereta blanca endolada

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC. Aquesta subespècie es distribueix per les Illes Britàniques i la costa de l'Europa continental. La seva principal àrea d'hivernada s'estén per la Bretanya, l'oest de la península Ibèrica i el Marroc.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions als conreus propers al mas Avinyó: 1 ex., probablement un mascle de 2n any, els dies 6 i 7.III (AOTA i ALTA); (T). Homologada pel CAC. 1 ex. probablement una femella adulta, el 7.III (AOTA i ABRA); (T). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Abrrera Una femella adulta anellada a can Morral el 22.IV (MGVA); (T). No tramesa al CAC.

Cinclus cinclus**Merla d'aigua**

Estatus *C. c. aquaticus* resident nidificant als cursos fluvials de la Catalunya humida, especialment, i més localitzat en els cursos més mediterranis. Hivernant local en trams de rius on no nidifica, a on arriba de parts més altes de les muntanyes. *C. c. cinclus* resident nidificant als cursos fluvials dels Pirineus. Hivernant local en trams de rius on no nidifica, on arriba des de les parts més altes de les muntanyes.

GARROTXA

Besalú Un adult alimentant dos polls a la sortida del túnel de l'aigua de la sèquia dels Horts el 9.IV (MLLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a illa de Ter el 12.I (CPVA); darrera citació prenupcial en una localitat on no hi cria (F).

Salt 1 ex. al riu Ter el 12.I (IBGA); darrera citació prenupcial en una localitat on no hi cria (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. al salt d'aigua de Vilert el 6.XII (JCCD i MVEB); (G).

Pobla de Segur 23 exs. al SOCC 83, conegut de Collegats, el 2.I i 18 exs. l'1.XII (JCBD); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. a l'embassament de Santa Fe de Montseny el 24.XI (RBVA); (G).

Troglodytes troglodytes**Cargolet**

Estatus *T. t. kabyorum* resident nidificant comú al sud dels Pirineus. Manca a bona part de la plana de Lleida. Migrador i hivernant regular a la plana i especialment al litoral, tot i que es desconeix si es tracta d'exemplars transpirinencs o moviments altitudinals dels individus residents al Pirineu, Prepirineu o altres zones properes a les zones on només hiverna. *T. t. troglodytes* resident nidificant comú al Pirineu i possiblement en altres àrees de Catalunya. Es desconeix si fa moviments altitudinals.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=243).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=356).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=35).
Índex 2008=0,8

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un niu amb polls al parc del Foix el 10.VI (XBGA, CGGA i HSCA); primera dada de juvenils de l'any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la pineda de la Murtra el 8.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 20.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs el 26.III (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 25.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Prunella modularis

Pardal de bardissa

Estatus *P. m. mabotti* resident comú a la Catalunya humida. Estival nidificant als boscos subalpins i als rasos alpins del Pirineu i Prepirineu i també de forma molt localitzada als Ports. *P. m. modularis* migrador i hivernant comú als ambients més mediterranis i de plana, i en general arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=63).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 8% (*, n=122).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=5).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 6.IV (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany de Palau el 17.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix l'11.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 13.IV (JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. el 16.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 32 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI. (MGVA); (N).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 26.X (MRFA); primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris

Cercavores

Estatus Resident a l'alta muntanya pirinenca i prepirinenca, en ambients rupícoles. En aquesta àrea de nidificació es pot trobar tot l'any, però també hi ha una part de la població que fa moviments altitudinals a l'hivern que els fan arribar al nivell del mar, sempre que trobin ambients adequats. Hivernant, per tant, regular però localitzat, a la plana i al litoral, i a les comarques del sud.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs. entre Sant Salvador i Sant Pere de Rodes el 7.I (PFLB, PFSA i MSFB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 2 exs. a l'ermita de Sant Salvador de les Espases el 2.IV (MLMB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX PENEDÈS

El Montmell 3 exs. al puig de la Cova el 9.I (CGGA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansa durant uns minuts i segueix la migració en direcció sud a Sant Pere Màrtir el 30.X (MGVA); (G).

BERGUEDÀ

Castellar de n'Hug 42 exs. al SOCC 43, pla del Rus, el 8.XII (PABA); (N).

GARROTXA

La Vall de Bianya 12 exs. al cim del puig d'Ou el 22.XII (FTCA); (N).

Olot 10 exs. a Comanegra el 15.IV (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al castell de Burriac el 20.III (JPSA); darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 7 exs. a l'ermita de Sant Jordi el 16.XI (RBVA, TASA i ALAA); (G, N).

OSONA

El Brull 4 exs. al Matagalls el 27.III (JPRA i JPFB); darrera citació prenupcial (F).

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 22.X (JPRA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 19 exs. al SOCC 195, Buseu, el 12.I (JCBD); (N).

Llavorsí Diverses observacions al nucli urbà: 1 ex. al carrer de la Riba, després d'una intensa nevada a cotes mitjanes i altes, entre el 21 i el 22.IV (JPPE, AEXB i MGLA); (B). 1 ex. al mateix carrer durant un intens temporal de neu el 31.X (JFXE); (B).

Rialp 18 exs. al SOCC 144, Llesú, el 19.IV (IOSA); (N).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 12 exs. junt al refugi de Siurana el 20.II (JPSA); (N).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Diverses observacions als Ports: 1 ex. el 6.II (AWWA i CJMA); (G). 1 ex. el 26.XI (MTTB, LWVA i CJMA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 25 exs. al turó de l'Home el 12.XII (EBMA); màxim anual (N).

Erithacus rubecula**Pit-roig**

Estatus Resident nidificant comú a la Catalunya humida i als ambients montans del país, i a les valls més humides de l'àrea d'influència mediterrània. Al sud de Catalunya només apareix a les diferents serralades. Als boscos subalpins és estival, possiblement efectuant moviments només altitudinals. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=258).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=445).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=38).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als Carrions el 3.X (PFLB); primera citació postnupcial (F).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 8.V (JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a la pineda de ca l'Arana: 1 ex. el 19.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Prat del Llobregat el 21.IX (PEGA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 25.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Luscinia megarhynchos**Rossinyol comú**

Estatus Nidificant estival a tot el país, defugint només les grans altituds als Pirineus i Prepirineus, i alguna zona concreta deforestada. Comú en migració, especialment pels ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=251).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=46).
Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 21.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 27.IX (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 31.III (JCMC i VSXA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. al nucli urbà l'11.IV (JGCC); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. a Fares el 12.III (SCIA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

La Cellera del Ter 1 ex. anellat al Pastoral el 27.IX (GJPA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. al Sot del Fuster el 6.IV (EFSA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Luscinia svecica**Cotxa blava**

Estatus *L. s. cyanecula* és un migrador regular tant a les zones humides del litoral com de l'interior, i hivernant més escàs. Hi ha diverses citacions a Catalunya de *L. s. svecica* no homologades pel CR/SEO.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 15.IV (MOVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'itinerari de la Massona el 10.IX (PLSA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'Alfacada el 14.IV (JBCG); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 20.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hiber-

nants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 7.IV (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 4.IX (XLBA, JPXL i IJXA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb Un mascle a Malars el 18.III (MRFA); primera citació prenupcial (F).

Manlleu Una femella a la zona esportiva del Ter el 9.IV (MRFA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. anellat a l'embasament de Cellers el 13.VIII (MGMA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. anellats l'11.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 21.VIII (GBCA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 8.III (JVLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.X (XRCA); darrera citació postnupcial (F).

Phoenicurus ochruros

Cotxa fumada

Estatus Espècie nidificant a les zones d'alta muntanya del Pirineu i Prepirineu, on marxen quan arriba l'hivern ja que es comporten com a veritables migradors; a la resta del territori és un resident ben distribuït on trobi ambients adequats. Migrador i hivernant comú, especialment a la terra baixa mediterrània.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=136). Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=345). Índex 2008=1

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a Casa Alta el 10.X (PTEA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca Una femella o mascle jove davant el cementiri municipal el 17.X (VSSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 9.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Cabrils Un mascle de 2n any cantant a les teulades dels voltants de l'església (SGRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 5 polls en un niu en una casa en obres de mas Palau a Banyoles que volen el 21.V (PPXB); primera dada de juvenils de l'any (R).

SELVA

Tossa de Mar Un niu amb 3 polls en un forat de la muralla vella el 15.VI (HFSA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a l'amfiteatre el 15.X (ACTA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. en uns prats a Unha el 12.III (XNPA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle al riu Besòs el 21.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Phoenicurus phoenicurus**Cotxa cua-roja**

Estatus Nidificant estival molt rar i localitzat. Migrador comú arreu del territori. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 17.III (MOVA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 21.V (MOVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 17.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a Canal Vell: 1 ex. anellat el 16.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 13.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 30.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 24.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

Sant Andreu de la Barca 1 ex al riu Llobregat el 14.III (vSSA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 2 exs. als estanys d'en Jordà el 19.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda Una femella o jove a Còdol el 7.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).



Viladrau Un mascle cantant a l'urbanització la Guineu almenys fins el 24.VI (JPFb); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 2 exs., un d'ells mascle, a Personada el 4.X (CODA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. al camí que uneix Escalarre i la Guingueta el 20.III (MPXJ i JGCC); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Una femella o jove a l'Ollivera el 31.VII (JRAA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. al secà el 14.III (JVLA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. anellat a la Figuera el 25.VIII (VCGA); primera citació postnupcial (F).

Saxicola rubetra

Bitxac rogenic

Estatus Nidificant estival als Pirineus i Prepirineus, i a la seva àrea d'influència. Migrador arreu del país, més conspicu en el pas prenupcial. Accidental com a hivernant.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -14% (ns, n=11).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les vinyes properes a l'estany de Palau el 7.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a l'estany de Palau el 9.IX (SSAA i NRPA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Una femella anellada al Ter Vell el 15.VI (DBRA); darrera citació prenupcial molt tardana (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a Reguerons el 7.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí de València el 23.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella en migració al turó Blau el 12.X (CODA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Tavertet 1 ex. a l'Avenc el 31.VIII (PBCB i JBCA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. a Sorre el 9.IV (JRSB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna d'en Margarit el 12.III (CGPC); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 14.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Planols Un jove de l'any al refugi Cortal Blanc el 24.VII (MGVA); (R).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. al secà el 14.III (JVLA); primera citació prenupcial (F).

Saxicola torquatus

Bitxac comú

Estatus *S. t. hibernans* és migrador i hivernant, tot i que no se'n coneix bé l'abundància i la distribució. *S. t. rubicola* és un resident distribuït àmpliament per tot el territori, tot i que no es troba en les zones de major altitud. Migrador i hivernant comú en tota mena d'ambients, però especialment als ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=198).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=253).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=19).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs., 2 dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 23.V (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. a l'estany Obago de Colomers a 2.300 m el 21.X (XNPA); darrera citació postnupcial (F).

Oenanthe oenanthe**Còlit gris**

Estatus *O. o. libanotica* estival nidificant a Catalunya, més propi dels ambients de muntanya, encara que manté nuclis regulars en ambients de plana. Migrador comú arreu del territori. *O. o. oenanthe* migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 8% (*, n=29).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al pla de Tudela el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. als prats de can Comes el 28.III (JMAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a l'Alfacada el 7.V (JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 18.III (ABBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al camí de València el 20.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Feliu de Llobregat Un juvenil en pas pel puig d'Olorda el 7.VII (DDDA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a Serinyà l'11.VIII (ACHA i HPMA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 31.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. al secà el 15.III (OLGA, MVCA i DFXA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l'11.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Vielha e Migaran 1 ex. a la collada de Varadós a uns 2.000 m el 22.X (XNPA); darrera citació postnupcial (F).

Oenanthe hispanica**Còlit ros**

Estatus Nidificant estival lligat als ambients mediterranis que evita en bona part la Catalunya humida, i és absent al Pirineu i Prepirineu, tot i que no es distribueix contínuament sinó de forma més o menys local. Migrador regular, tot i que no gaire abundant, especialment pels ambients més mediterranis.

Es publica l'única citació de l'any al parc del Foix. Es tracta d'una zona molt freqüentada per ornitòlegs en la qual el còlit ros hi era tradicionalment abundant i ja no hi va ser observat el 2007 (Bayer *et al.* 2009). Caldrà seguir aquesta població en un futur.- MARC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (ns, n=40).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle cantant al pont d'en Giraculs el 4.IV (PFLB, AOVA, MCME i JVSA); primera citació prenupcial (F). Un mascle cantant a la punta de cap de Creus imitant *Serinus serinus*, *Sylvia melanocephala* *Motacilla alba* i *Motacilla flava* el 22.V (MRFB); (B). 2 exs. al mas de Rabassers de Dalt i 2 exs. més a Rabassers de Baix el 19.VIII (MNPA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la pedrera de la Uniland el 29.VI (PTEA, PARA i JCRE); única citació de l'any (G).

GARRIGUES

Castelldans 1 ex. a mas de Melons-Matxerri el 20.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. entre Fígols i Claret el 16.III (JPPE); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 8.III (PJAA); primera citació prenupcial (F).

***Oenanthe leucura*****Còlit negre**

Estatus Resident nidificant escàs, distribuït de forma localitzada a Catalunya entre algunes serres litorals (Garraf), prelitorals (Montserrat), amb alguns nuclis a la depressió de l'Ebre i sectors solells d'algunes serres interiors, i part de les serres tarragonines.

Espècie amb poca informació disponible però amb clara tendència negativa al nord de l'àrea de distribució catalana. Desapareguda com nidificant al sud de França (R. Prodon com. pers.) i l'Empordà (CAE 2008), al 2008 no hi ha citacions a les comarques gironines i poca informació a la resta de comarques. Les poblacions nidificants de les serres litorals i prelitorals centrals representarien el límit nord-est de la seva distribució europea, però resulten escasses, fragmentades i molt fràgils com ho demostren estudis recents (Cerdeira *et al.* 2008). L'espècie colonitza àrees cremades que li ofereixen l'hàbitat àrid que necessita (citacions de Talamanca, Calaf, Pobla de Massalua i Riba-roja) però en desapareix quan es recupera la vegetació arbustiva densa. La citació a l'Alt Penedès pot correspondre a la connexió entre les poblacions del sud i les altament amenaçades de l'est. Calen més estudis que permetin situar l'estat de les poblacions reproductores, determinar amb exactitud la seva distribució hivernal i revisar la categoria d'amenaça.- FATA, JCRD, MLMB i MNPA.

Hi ha una correcció de dades de 2007 a l'apèndix 2, mancances.

ALT CAMP

La Riba 2 exs. el 18.X (PJAA); (E).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les vinyes properes a Torrelletes el 12.VI (XPVA); (E, G).

ANOIA

Calaf 1 ex. trobat mort al turó de Farrera el 18.VIII (CGGA); (E).

BAGES

Talamanca Una parella en una zona cremada a la masia de la Vila l'1 i el 13.VI (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (E, GR).

BAGES/BAIX LLOBREGAT

Collbató-Monistrol de Montserrat-Olesa de Montserrat-Esparreguera S'avalua la població nidificant dels 4 municipis en 3-4 parelles, de les quals han volat 3, 1, 3 i 0 polls. Els nius s'ubiquen a una altitud compresa entre els 180 i els 450 m amb una orientació vers al sud i al sud-est. Dels 3 nius localitzats, 2 dels nius estan situats en cingles i un altre en una cabana de pedra seca (FATA, JCRD, MLMB i MNPA); (E, R).

BAIX CAMP

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant Una parella en parada nupcial al Molló Puntaire el 3.V (APVA); (E, R). 1 ex. durant un recorregut de 3-4 km per les muntanyes de Vandellós i Tivissa el 3.VIII (APVA); (E).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. al SOCC 253, coll de l'Alba, el 13.I (VCPA); (E).

GARRIGUES

El Cogul 1 ex. al congost del riu Set el 3.V (OBDA); (E).

NOGUERA

Les Avellanès i Santa Linya 1 ex. a la Pala Alta del Mont-roig el 29.XII (FCTA); (E).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al SOCC 203, Mont-rebei, el 12.V (ANCA); (E).

PRIORAT

La Figuera 3 exs. caçant insectes el 4.IV (PJAA); (E).

Margalef 1 ex. al SOCC 193, la Serra Major, el 3.V i el 13.VI (JPBE); (E).

RIBERA D'EBRE

Garcia 2 exs. a l'ermita el 2.X (PJAA); (E).

Riba-roja d'Ebre Un mascle cantant en una zona cremada al sud de l'embassament de Riba-roja el 6.VI (RBVA); (E, R).

Torre de l'Espanyol 3 grups en diferents zones del terme municipal el 22.IX (PJAA); (E, N).

SEGRIÀ

Aspa Un adult al mas de Matxerri el 3.V (OBDA); (E). 1 ex. vora el poble el 29.V (FCTA); (E). Un mascle i una femella a les Tallades el 22.XI (DDDA, CLSA, FHVA, JRGB, EGGD, CMPA, MBAA, MVCA, MFSA, RMMB, JCRH, ROOA i FMSC); (E).

TERRA ALTA

La Pobla de Massaluca Un mascle cantant en una zona cremada el 4.VI (RBVA); (E, R).

Monticola saxatilis**Merla roquera**

Estatus Nidificant estival, present per un costat a l'alta muntanya dels Pirineus i Prepirineus, i per una altra en algunes muntanyes mediterrànies, i a l'interior com a les Guílleries o el Montseny. Migrador escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=26).
Índex 2008=0,5

ALT EMPORDÀ

Maçanet de Cabrenys 1 ex. a Roc de Frau-sa el 13.IV (MBXH i EPMC); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al mas d'en Causa i 1 ex. a Santa Helena el 9.VIII (MNPA); darreres citacions post-nupcials (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Una femella en un guaret a tocar a l'estany de Palau el 5.VI (JMAA); darrera citació prenupcial (F).

BAGES

Talamanca Una parella, amb la femella que du material al bec per construir el niu en una zona cremada l'1.VI (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle als erms de la Tancada el 24.IV (REEA, LEEA, JBAB i ISSB); (G, F).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a la serra del Montroig el 25.IV (SWWA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Una femella, alimentant-se de libèl·lules teneral emergents, a l'estany de baix del Port a 2.072 m. el 7.VII (MLLA); (B).

La Guingueta d'Àneu Un mascle cantant al nucli urbà d'Estaron el 26.IV (NEXA i MBXK); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

La Pobla de Massalua 2 mascles en una zona cremada el 4.VI (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Monticola solitarius**Merla blava**

Estatus Resident nidificant de distribució irregular d'àmbit mediterrani, lligat als habitats secs i rocallosos, i en general per on trobi aquest tipus d'ambients a l'interior, tant a la depressió Central com al nord d'aquesta, evitant, però, el Pirineu axial. Ocasional en nuclis urbans. Rar a l'hivern i durant les migracions fora de les zones on cria.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 8% (ns, n=47).
Índex 2008=2,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=45).
Índex 2008=1,1

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Un juvenil de l'any al parc del Foix el 9.VI (XBGA, CGGA i HSCA); primer juvenil de l'any (R).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels Un mascle a l'espigó exterior de Port Ginesta el 17.XII (RBVA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a les teulades de la cantonada del carrer Bruc amb avinguda Diagonal el 21.II (CODA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. a l'espigó del port l'11.II (JSPC); (B).

Turdus torquatus**Merla de pit blanc**

Estatus *T. t. alpestris* és un nidificant estival als boscos subalpins dels Pirineus i Prepirineus, on pot restar, però, una part petita de la població segons els hiverns. Migra-

dor regular, en baix nombre, detectat especialment a les comarques muntanyenques de Tarragona. Exemplars aïllats resten a l'hivern a les àrees on crien, en canvi, a la resta del territori és excepcional com a hivernant. *T. t. torquatus* és un migrador regular, en baix nombre, detectat especialment a les comarques muntanyenques de Tarragona, i al litoral, però també als Prepirineus i Pirineus. Probable hivernant excepcional, tot i que encara no hi ha dades confirmades.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=27).

Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 mascles i una femella sedimentats a l'inici de l'istme de cap Norfeu el 20.X (JVSA); primera citació postnupcial (F, G).

Rabós 1 ex. en pas per coll de Plaja el 8.III (MBFA i BMBA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. sedimentat a la cua de l'embassament del Foix el 3.XI (XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

Olèrdola 1 ex. en migració al turó dels Tres Partions el 4.X (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a cal Tet el 13.IV (JFOD); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc zoològic el 2.I (JGGD); citació hivernal (F, G). Diverses observacions en migració a Sant Pere Màrtir: 1 ex. el 22.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 18 exs. en 20 dies de seguiment entre les 8:00 i les 10:30 h entre els

dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 13 exs. el 25.X (MGVA); (N).

MARESME

Palafolls 1 ex al riu Tordera el 27.IV (JBDA, JAPB, AHMA, JPMC i OTMA); darrera citació prenupcial (F, G).

NOGUERA

Montgai 1 ex. al secà el 9.III (SWWA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

El Brull 10 exs. al Matagalls el 13.XI (JPRA); màxim anual (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. al bosc de la Mina el 9.II (ABRA); (G). Un mascle al port de la Bonai-gua alimentant-se de libèl·lules teneral emergents, a l'estany de baix del Port a 2.072 m el 7.VII (MLLA); (B). 1 ex. a Planes de Son el 2.XI (CNPA); darrera citació postnupcial (F).

Llavorsí 12 exs. al SOCC 284, Port-Ainé, el 30.V (JRSB); (N).

PLA D'URGELL

Bellvís Un mascle en migració el 17.IV (FMSA); (G, F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. el 27.IV (PJAA); darrera citació prenupcial (F, G).

RIPOLLÈS

Vilallonga de Ter 1 ex. a Tregurà el 16.III (PLSA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Susqueda 1 ex. al turó del Mal Sopar el 12.I (JBCB i LJSA); citació hivernal (F, G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. a les Agudes el 22.XI (JMOB); citació hivernal (F, G).

Turdus merula

Merla

Estatus Resident i nidificant comú arreu del territori. Migrador i hivernant regular.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=311).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=448).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=52).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. parcialment albí a sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXC); (M).

Turdus pilaris

Griva cerdana

Estatus Migrador i hivernant regular, més comú a la Catalunya humida i a l'interior, i molt més escàs al litoral i al sud. El seu nombre fluctua molt segons els anys. Hi ha una dada de possible cria al Pirineu.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 11% (ns, n=52).
Índex 2008=1,8

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 exs. a Santes Creus el 24.XII (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Torroelles el 18.II (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Pontons 56 exs. a l'itinerari SOCC 89, Aiguamúrcia, el 26.I (FATA); (N).

ANOIA

El Bruc 2 exs. al cim de Sant Jeroni, Montserrat, el 10.II (XSPA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Mínim 30 exs. a l'illa de Canet el 16.II (EPMC i MBXH); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 3.II (LGSB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar l'11 i el 12.XII (RRSB); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Ger 5 exs. prop de Grèixer el 12.XII (JNVA); primera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Arbeca 81 exs. al SOCC 79, Golmés, l'1.II (JBSA); (N).

MARESME

Dosrius 1 ex. a les feixes de ca l'Arenes en companyia de grives *Turdus viscivorus* el 20.XII (HAPA); (G).

OSONA

El Brull Diverses observacions al Matagalls: 3 exs. el 8.XI (RJNA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Senterada Més de 500 exs. ajocant-se al bosc de Colldeberri el 23.I (FMSA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 59 exs. al SOCC 283, Virós alt, el 20.I (JRBS); (N).

SOLSONÈS

Pinós 1 ex. a Sant Just d'Ardèvol el 9.II (CODA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 4-5 exs. a la fageda de Santa Fe de Montseny el 15.XI (RBVA i MVCA); primera citació postnupcial (F).

Turdus philomelos

Tord comú

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular, però no especialment nombrosa, per la Catalunya humida, els Prepirineus i Pirineus, i més irregularment a la resta del territori, on ocupa alguns sectors muntanyencs de comarques de caire mediterrani de l'interior i del sud, i puntualment en ambients de plana i terra baixa de forma més localitzada o més escàs. Als Pirineus axials i les zones de major altitud es comporta com a estival. Migrador i hivernant regular i molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=171).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=163).
Índex 2008=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -17% (*, n=25).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vall de l'Infern de Vilajuïga el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 6.V (JBCG); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 19.IV (RRSB); darrera citació prenupcial (F). 749 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N).

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs a el 25.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 3 exs. al puig dels Jueus el 28.IX (OCVA i MRFA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 2 exs. posats a can Pere Gil el 18.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Martorelles 6 exs. al riu Besòs el 28.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Turdus iliacus

Tord ala-roig

Estatus Migrador i hivernant regular, més comú al nord i a la Catalunya humida i interior, i més escàs com més al sud. La seva presència varia considerablement en nombre segons els hiverns.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (ns, n=126).
Índex 2008=2,3

ALT CAMP

Montferri Uns 150 exs. a la joca del Gaià el 31.XII (CGGA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. en pas per l'estany de Palau el 30.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

Rabós 1 ex. a coll de Plaja el 8.III (MBFA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. anellats a l'illa de Buda el 18.III (DBCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrrera Diverses observacions a can Morral: 25 exs. el 9.I (XLBA, JPMC, FSJA i RGLA); (N). 1 ex. anellat a can Morral el 22.II (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a l'estació biològica del Remolar el 18.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 52 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 26 exs. el 7.XI (MGVA); (N).

GARROTXA

Mieres 100-125 exs. a el Torn el 17.XII (PLSA); (N).

GIRONÈS

Sant Gregori 20 exs. l'11.I (GDBA); màxim anual (N).

OSONA

El Brull 4 exs. prop del Matagalls el 8.XI (RJNA); primera citació postnupcial (F).

Sant Boi de Lluçanès Més de 10 exs. a l'obaga dels Munts el 8.XI (JBCB); primera citació postnupcial (F).

Sant Julià de Vilatorrada Detectat al Llopard el 8.XI (MGBA); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 20 exs. en els prats de la llacuna de Casa Nostra seca als aiguamolls de la Puda el 20.I (CFQA); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 21.XI (SSAA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 10.III (PJAA); darrera citació prenupcial (F).

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 26.X (JBGC); primera citació postnupcial (F).

Turdus viscivorus**Griva**

Estatus Resident nidificant que apareix distribuït en bona part del territori, des del nivell del mar fins als boscos subalpins, on pot ser localment abundant. Migrador i hivernant regular arreu del territori, tot i que de difícil detecció si no és en les zones on no nidifica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=176).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=342).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 10% (ns, n=12).
Índex 2008=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); darrera citació prenupcial en una localitat on no hi cria (G).

Cettia cetti

Rossinyol bord

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, tot i que defuig en general les àrees de muntanya i les zones més àrides i eixutes. Migrador i hivernant comú, especialment en zones litorals, com per exemple el delta de l'Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=129).
Índex 2008=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=54).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=28).
Índex 2008=1,2

Cisticola juncidis

Trist

Estatus Resident nidificant comú a l'àrea d'influència mediterrània de Catalunya, que pot presentar poblacions localitzades en sectors muntanyencs de l'interior o dels Prepirineus. A l'hivern desapareix d'algunes zones fredes; el caire i magnitud d'aquests moviments, però, són força desco-neguts encara.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=52).
Índex 2008=1,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=101).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (ns, n=10).
Índex 2008=0,4

OSONA

Gurb 1 ex. a Dacs el 2.II (MRFA i RJNA); citació hivernal (F).

Tona 1 ex. als canyissars de la depuradora el 27.I (RJNA); citació hivernal (F).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. en uns camps vora la ciutat el 18.I (RBVA); (G, F). Encara present l'1.IV (RBVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

Locustella naevia

Boscaler pintat gros

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, detectat sovint en zones humides i vora cursos d'aigua. Tot i això, pot ser trobat en tota mena d'ambients, a excepció, però dels boscos subalpins i l'alta muntanya. Els seus efectius poden variar molt segons els anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. cantant a l'estany de Palau el 8.IV (SSAA i AOTA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 21.V (MOVA); darrera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. anellat al bosc de Ribera el 22.IV (JDAB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex, anellat a l'illa de Buda el 2.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.V (MOVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 29.III (JCMC i DHXA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. al Pasallís del Borró el 29.V (RCFA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter entre Gallifa i Espadamala el 20.IV (MRFA, RJNA i AJXA); primera citació prenupcial (F).

Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva el 16.VIII (MRFA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 1 ex. anellat a l'embassament de Cellers el 18.VIII (MGMA); primera citació postnupcial (F).

Guardia de Tremp 2 exs. en un camí prop de Cellers el 21.IV (AVPA i JBSA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 7 exs. anellats a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix entre el 15.VIII i el 9.X (JBGC); (N, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant breument a la bassa dels cabussets l'1.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Locustella luscinioides**Boscaler comú**

Estatus Nidificant estival regular, però molt localitzat, en diferents zones: el delta de l'Ebre, principal zona a Catalunya, i els aiguamolls de l'Empordà i les basses de la plana de Lleida, on és, però, molt més escassa. A la resta del territori és present en migració en molt baix nombre en les zones amb hàbitat adequat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en un mínim de 6 parelles (JMAA i SSAA); (R). Diverses observacions a l'estany de Palau: 1 ex. anellat el 26.III (SSAA i AROA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 9.IX (SSAA i NRPA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Riet Vell l'1.III (JFOD); primera citació prenupcial (F). 51 exs. anellats a Canal Vell entre el 24.VIII i l'1.X (JFBB); (N). 1 ex. anellat a Canal Vell l'1.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 12.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 20.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 4.VIII (XLBA); (G).

GIRONÈS

Salt 1 ex. anellat als aiguamolls del Veïnà el 20.IX (CPVA, JVCB, OCBA, MBMB, MFRA, JBCB, IBGA, IAXB, JVLA i JPVVD); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espadamala el 21.III (MRFA); (G).

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex. a la bassa de la Quintana el 27.IX (RJNA i MRFA); (G).

SEGRIA

Torres de Segre 1 ex. a l'embassament d'Utxesa el 29.III (SWWA); primera citació prenupcial (F).

Vilanova de la Barca 1 ex. anellat al Sot del Fuster el 7.X (MLMB); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 42 exs. anellats durant les campanyes d'estiu i tardor (SSAA, MPLA, JFGE, GBCA i MLMB); (N). 1 ex. anellat el 17.VII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat el 25.IX (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 10 exs. anellats a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix durant la campanya de migració postnupcial entre el 4.VIII i l'11.X (JBGC); (N).

Acrocephalus melanopogon**Boscarla mostatxada**

Estatus Resident nidificant, de forma molt localitzada i escassa al delta de l'Ebre, i molt localitzat o puntual en altres zones com l'embassament d'Utxesa, els aiguamolls de l'Empordà o el delta del Llobregat. Migrador i hivernant regular i relativament abundant localment, especialment a les zones humides litorals.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Entre 6 i 8 exs. cantant als calaixos de depuració el 13.II (FLSA); primera dada de cant (R).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs entre el 24.I i el 26.II (XLBA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l'illa de Ter el 23.II (CPVA, JRBB i HMPA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle cantant a la desembocadura de la Tordera el 16 i el

23.V (EBMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 8 exs. anellats durant les campanyes d'estiu i tardor entre el 17.VII (SSAA) i el 26.X (JFGE); (F, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 exs. anellats a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix durant la campanya de migració postnupcial entre el 4.VIII i l'11.X (JBGC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Un mascle cantant al riu Besòs el 18.II (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. als entorns del riu Besòs el 7.XII (FMVA); (G).

Acrocephalus paludicola**Boscarla d'aigua**

Estatus Molt escàs en migració, però regular, detectat només en algunes zones humides del litoral. Més freqüent en el pas pre-nupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Palau el 8.IV (SSAA i AOTA); (G). 1 ex. als prats de Vilaüt el 15.IV (AOTA); (G). 2 exs. a l'estany de Palau el 18 (ABRA i JGME) i el 22.IV (SSAA); (G). 2 exs. a l'estany d'en Massot el 22.IV (ABRA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.IV (JFBB); (G). 1 ex. anellat a l'Alfaceda el 16.IV (JBGC); (G). 1 ex. a les salines de Sant Antoni el 25.IV (JBAB, LEEA i REEA); (G). No trameses al CAC.

Acrocephalus schoenobaenus

Boscarla dels joncs

Estatus Migrador regular, en baix nombre, detectat sobretot a les zones humides d'arreu del territori, especialment al litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Palau el 10.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 13.V (MOVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Massona el 17.VII (AOTA i JMMA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. anellat al bosc de ribera el 10.IV (JDAB); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbila el 20.IV (TASA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIA

Delta de l'Ebre Diverses observacions a Canal Vell: 1 ex. el 23.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 14.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'Alfacada el 17.VII (JFBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a Amposta el 19.X (CJMA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Belcaire d'Empordà 1 ex. a Sobrestany el 19.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 15.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 31.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a illa de Ter el 10.X (JBLA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a la zona esportiva el 13.V (JPRA i JPFB); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur-Llimiana 3 exs. a l'embassament de Cellers el 17.VII (MGMA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.III (MPLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 13.V (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. anellats el 17.VII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 14.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. a la bassa de la Sèquia Major el 12.IV (ACTA, MPSA i CAFA); (G).

Acrocephalus scirpaceus

Boscarla de canyar

Estatus Nidificant estival distribuït arreu del territori de manera irregular, segons trobi ambients adequats per nidificar (llaunes, estanys litorals, marges de riu, aiguamolls amb bona cobertura vegetal...). Localment comú en algunes zones humides, especialment al delta de l'Ebre. Migrador

comú per tot el territori. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=45).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (*, n=15).
Índex 2008=1

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 26.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 12.XI (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions als calaixos de depuració: 1 ex. l'1.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 19.XI (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu Diverses observacions al Ter a la zona esportiva: 2 exs. el 9.IV (MRFA i RPEA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII (MRFA); primera citació postnupcial (F).



PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 40 parelles nidificants (JEBA); (R, N). 10 exs. anellats el 10.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 4.XI (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 24.XI (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys l'1.IV (AGRB, LMMA, JOMB i CSPA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i de Plegamans 1 ex. a l'hostal del Fum i un altra a la riera de Caldes el 7.VII (FMVA); citacions estivals en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 15.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Acrocephalus arundinaceus

Balquer

Estatus Nidificant estival distribuït arreu del territori de manera irregular, segons trobi ambients adequats per nidificar (zones humides amb canyís o canyes). Localment comú en algunes zones humides, especialment al delta de l'Ebre. Migrador comú per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=20).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=12).
Índex 2008=0,4

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en un mínim de 43 parelles (JMAA); (R). Un mascle cantant a l'estany de Palau el 8.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a Canal Vell; 2 exs. el 27.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 20.XI (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar; 1 ex. anellat el 3.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 16.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Bordils 4 mascles cantant des de les balques *Typha latifolia* el 5.VI i 3 el 23.VI (JRBB); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter a, a la zona esportiva el 10.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 50 parelles nidificants (JEBA); (R, N). 3 exs. anellats el 10.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 6.X (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix l'1.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

Hippolais opaca**Bosqueta pàl·lida occidental**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Sant Carles de la Ràpita el 5.X (JAJA, CPXB, HSSB, OVXA, AAXE i EAXC); (G). No tramesa al CAC.

Hippolais icterina**Bosqueta icterina**

Estatus Migrador escàs, però regular, detectat exclusivament per la banda oriental del territori, en especial pel litoral, i principalment en el pas prenupcial.

El pas prenupcial de 2008 ha estat el més notori que mai no s'ha registrat a casa nostra, amb 96 exemplars recollits, mentre que el màxim anterior va ser de 22 individus el 2002 (Sales 2006). De la mateixa manera a la base de dades de la OCA s'han registrat 75 exemplars anellats, quan la mitjana del període 2003-2007 va ser d'11 captures anuals. S'ha vist entre el 28.IV (delta de l'Ebre) i el 23.V (a la mateixa localitat i al cap de Creus), amb un màxim de 9 anellaments al delta del Llobregat el 12.V.

Aquesta petita "invasió" ha estat provocada segurament per les llevantades que van ocórrer especialment a mitjans de maig i que també afectaren a altres espècies escasses o que tenen el pic migratori en aquestes dates. Com és habitual el litoral ha aglutinat gairebé totes les dades, amb l'excepció de les citacions de Sant Celoni i La Selva. Al pas postnupcial s'han detectat 7 exemplars entre el 31.VIII (aiguamolls de l'Empordà) i el 23.IX (deltetes de l'Ebre i Llobregat).- XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al coll del Mosquit el 23.V (PFLB); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 22 exs. anellats i 2 observats entre el 3 i el 20.V, amb un màxim de 8 exs. anellats el 12.V (ABRA, MOVA, JIVA, AROA i AOTA); (E, F, N). Un juvenil anellat a l'estany de Palau el 31.VIII (SSAA); única citació postnupcial (E, F).

Sant Climent Sescebes 1 ex. a Vilartolí i 1 ex. a Requesens el 13.V (ABRA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 28.IV (DBCA); primera citació prenupcial (E, F). 19 exs. anellats a tot el delta entre el 28.IV i el 13.V (DBCA, JBGC i JFBB); (E, N). 2 exs. als Eucaliptus el 9.V (SSAA); (E). 1 ex. prop de la Platjola el 14.V (ISSB, CJMA, CSSB i CSSC); (E). 1 ex. al Trabucador el 15.V (JCMG i MGTA); (E). 1 ex. a la punta de la Banya el 23.V (RGBA i CDBA); darrera citació prenupcial (E, F). 3 exs. anellats a Canal Vell entre el 21 i el 23.IX (JFBB); úniques citacions postnupcials (E, F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. al Ter Vell el 10 (ABRA) i l'11.V (DBRA); (E). 1 ex. a l'Estartit el 15.V (JRBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 36 exs. anellats entre el 27.IV i el 17.V, amb un màxim de 9 exs. el 12.V (JCMC); (E, F, N). 1 ex. anellat el 21 i el 23.IX (JCMC); (E, F).

La Palma de Cervelló 1 ex. anellat el 5.IX (MPLA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (E). 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 12.V (RRSB); (E).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 13.V (XLBA); (E).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 10.V (XRCA i DCFA); (E).

Tiana 1 ex. anellat a la Conreria l'11.V (MGVA); (E).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. anellat l'11.IX (HAPA, JMGC, AAXG i ACSA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les Llobateres el 5.V (DCFA); (E).

Hippolais polyglotta

Bosqueta vulgar

Estatus Nidificant estival, comú arreu del territori, defugint només les zones de major altitud al Pirineu i Prepirineu i els boscos subalpins, així com les àrees forestals massa denses. Migrador regular a les zones mediterrànies especialment, tot i que es pot trobar en qualsevol punt del territori tret dels Pirineus.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=181).
Índex 2008=1,2

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Mitjana anual (2002-2008): -13% (*, n=31).

Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de Vilaüt el 15.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 2 exs. anellats al bosc de ribera l'11.IV (JDAB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'Alfaceda el 8.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 9.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 23.IX (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 21.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Malla Un mascle cantant l'11.IV (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Vic 4 exs. al puig dels Jueus l'11.VIII (MRFA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 24.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. anellat a Sant Cebrià el 26.IX (AERA); darrera citació postnupcial (F).

Sylvia atricapilla

Tallarol de casquet

Estatus *S. a. atricapilla* resident nidificant distribuït per tot el Pirineu. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori. Té poblacions que són estivals, potser fent només moviments altitudinals. *S. a. heineken* resident nidificant distribuït per tot el territori al sud dels Pirineus, tot i que és més comú a la Catalunya humida, i menys abundant a les zones de terra baixa de caire mediterrani, on penetra pels indrets més ombrívols. Absent en les zones més seques, com el sud de Tarragona i part de la depressió Central. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=268).

Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=132).

Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (*, n=43).

Índex 2008=0,6

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a l'Alfaceda el 13.V (JBGC); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 22.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 18.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. en un jardí a Salardú el 27.III (XNPA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia borin**Tallarol gros**

Estatus Nidificant estival, distribuït de forma regular per la Catalunya humida i les seves zones muntanyenques, així com pels Pirineus i Prepirineus. Més localitzada i de distribució més irregular pels ambients més secs i mediterranis, pot nidificar en punts muntanyencs de Tarragona i Barcelona, així com en altres àrees interiors, sempre en les zones més humides. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=94).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=11).
Índex 2008=0,3

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. anellat al bosc de ribera l'11.IV (JDAB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 8.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.XI (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 10.IV (JCMC i VSXA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 13.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 11 exs. al parc del Guinardó el 7.IX (MGVA); (N).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys d'en Jordà l'1.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 30.X (JBCG); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. anellat a la depuradora el 5.IV (JVNA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia curruca**Tallarol xerraire**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. Es distribueix pel centre, nord i est d'Europa; també per Turquia, Sibèria i Àsia central. Hiverna a les regions àrides de l'Àfrica al sud del Sàhara i també a Egipte i Aràbia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un juvenil anellat a l'estany de Palau el 31.VIII (SSAA i ALTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. observat a l'itinerari de l'aguait de la maresma del Remolar el 2.X (FLSA) i capturat posteriorment per a l'anellament al Remolar el 6.X (JCMC); (G). Homologada pel CAC.

*Sylvia hortensis***Tallarol emmascarat**

Estatus Nidificant estival, local i escàs, per les zones mediterrànies forestals més seques i termòfiles. Migrador molt escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=44).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=4).
Índex 2008=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la Vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F). 15 exs. anellats, molts dels quals són joves, a l'estació SYLVIA de Vilajuïga el 8.VII (MFRA); primera dada de juvenils de l'any (N, R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 8.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F). Un mascle als erms de la Tancada el 26.IV (JFOB i CGGB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat l'11.IV (JCMC, LOXA i FLSA); (G). 1 ex. el 14.IV (JCMC); (G). 1 ex. a la llera nova del Llobregat el 24.IX (LTBB); (G, F).

OSONA

Orís 1 ex. a l'abocador el 3.V (JEPB); (G).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. a Montrebei el 12.IV (ANCA); primera citació prenupcial (F).

*Sylvia communis***Tallareta vulgar**

Estatus Nidificant estival, distribuïda de manera més regular pels ambients montans, i molt més localment pels de terra baixa i de caràcter més mediterrani. Migrador comú arreu del territori, més conspicu en el pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=23).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Mollet de Peralada 1 ex. el 26.III (AOTA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'Alfacada el 19.III (JBGC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 20.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F).
Sant Joan Despí 1 ex. l'1.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 24.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona Un mascle cantant al parc del Migdia el 26.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus l'11.VIII (MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 6.IV (MPLA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia conspicillata

Tallarol trencamates

Estatus Nidificant estival, molt localitzat i escàs, en comarques del litoral com, el Garraf, l'Alt Camp, l'Alt Empordà, i en zones de l'interior, a la depressió Central o al Pallars Jussà. Migrador molt escàs pels ambients més termòfils. Hivernant rar.

Interessants observacions al Vallès, delta de l'Ebre i Barcelona a finals de maig i fins i tot inicis de juny, moment en què la població nidificant d'altres punts del país (com al cap de Creus, on la població continua tenint nuclis amb elevades densitats), es troba en plena reproducció, sovint ja amb polls volanders. Enguany no es compta amb registres hivernals, com succeeix alguns anys, però sí que l'espècie ja és present als indrets de cria des de març fins a mitjans novembre.- PFLB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 mascles a la font de la Vic el 23.III (PFLB, PFSA i MSFB); primera citació prenupcial (F). 8 exs., 2 dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC 400, Sa Planassa l'11.VI (PFLB i GVXB); primera dada de juvenils de l'any (R). Una femella covant al niu, amb el mascle fent crits d'alarma al voltant i 3 polls

volanders per la zona, pel qual és probable que es tractés d'una segona posta, al sector del Pení, el 15.VI (MFRA i GDBA); (R). 1 ex. a cap Norfeu el 14.XI (MRXF); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle als erms de la Tancada el 14.V (CJMA, ISBB, ISSC, CSSB i CSSC); (G, F). 1 ex. al Trabucador el 24.V (CJMA, ISSB i ALTA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l'aeroport el 18.IX (ABBB); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona Un mascle al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (G, F).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. al secà el 4.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i de Plegamans Un mascle cantant a l'Hostal del Fum l'11.VI (FMVA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

Sylvia undata

Tallareta cuallarga

Estatus Resident nidificant arreu del territori, especialment lligat als ambients assolats i mediterranis, tot i que pot pujar en altitud al Pirineu, i arribar als 1.700 m de forma localitzada a les solanes. Migrador i hivernant local, pot presentar-se en zones on no nidifica de manera regular, com passa al litoral i a zones de la plana.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=80).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=163).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=11).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs., un dels quals és un jove de l'any, al pla de les Gates el 9.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 16.III (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Reguerons el 20.X (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 12.V (RRSB); (G).

GIRONÈS

Girona 2 juvenils a can Venda el 10.VIII (MFRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

OSONA

El Brull 1 ex. a uns 1.550 m d'altitud durant la pujada al Matagalls el 20.XII (RBVA i MVCA); (G).

Sylvia cantillans

Tallarol de garriga

Estatus Nidificant estival, més comú als ambients de muntanya mitjana i als de caire forestal mediterrani, i de distribució més irregular en ambients més secs i del litoral, sempre que trobi hàbitat forestal i de brolles adequat. Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=159).
Índex 2008=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=26).
Índex 2008=0,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 16.III (MOVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle a Riet Vell el 13.III (JBAB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 15.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 24.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 29.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Orís 1 ex. a l'abocador el 18.III (JCBC); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al congost de Mont-rebei el 30.III (CGGA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii

Tallarol de garriga balear

Estatus Accidental. Diverses dades homologades pel CAC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 29.V (JCMC i FLSA); (T). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 25.IV (XLBA); (T). No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Almenys un mascle en migració menjant en plantes ruderals al riu Francolí, prop de la desembocadura el 13.IV (RACC); (T). Homologada pel CAC.

Sylvia cantillans albistriata

Tallarol de garriga

D'homologar-se aquesta citació, seria la primera per a Catalunya.- MARC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle adult anellat a l'estany de Mornau el 23.IV (MFRA); (T). No tramesa al CAC.

Sylvia melanocephala

Tallarol capnegre

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, en major nombre a les zones mediterrànies litorals, i absent a les zones de més altitud al Prepirineu i Pirineu. Migrador i hivernant molt rar de forma local en zones on no és present al llarg de l'any. Fa moviments com a migrador par-

cial, dels quals es desconeix actualment la magnitud.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=198). Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=313). Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 118 exs. al llarg del SOCC 90, Montjoi, el 18.I (PFLB); màxim al projecte (N). 33 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes el 23.V (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

BAIX EBRE

L'Ampolla 106 exs. al llarg de SOCC 434, bassa d'Enmig, el 5.I (AMVB); (N).

Phylloscopus inornatus

Mosquiter de doble ratlla

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CR/SEO. Es distribueix pel nord i l'est de Sibèria i per l'Àsia central. Hiverna al sud-est asiàtic.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a Sant Carles de la Ràpita: 1 ex. anellat el 5.X (JAJA, CPXB, HSSB, OVXA, AAXE i EAXC); (G). 1 ex. anellat el 21.X (SSAA, MPLA, DAXB i MAXI); (G). 1 ex. al Garxal el 25.X (CJMA); (G). No trameses al CAC.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. de 1r hivern anellat als estanys d'en Jordà el 30.IX (RSGA i ADGC); (G). Homologada pel CAC.

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. a l'Aubadera el 18.X (EPFA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus bonelli**Mosquiter pàl·lid**

Estatus Nidificant estival que es pot trobar arreu del territori, des del nivell del mar fins als boscos de mitja muntanya (aquí més infreqüent), defugint només els més eixuts i les planes deforestades. Migrador regular, en baix nombre, per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=207). Índex 2008=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -10% (ns, n=22). Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. el 2.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 6.VIII (XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 17.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Castellví de Rosanes 1 ex. el 20.III (PMBE); primera citació prenupcial (F).

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 9.VIII (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 30.III (JEBÀ i FSVÀ); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 30.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Phylloscopus sibilatrix**Mosquiter xiulaire**

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, molt més conspicu en el pas prenupcial i més escàs en el postnupcial.

Enguany ha estat l'any amb major nombre de captures registrades a Catalunya (113 exemplars), probablement fruit de les condicions meteorològiques adverses que van donar-se al maig. De fet, en el període 1975-2007 el total de captures era de 272 individus (ICO 2009). L'11.V fou un dels dies amb més sedimentació, amb el màxim de captures al delta del Llobregat (13 exemplars) i 29 individus observats al parc del Guinardó. S'ha citat entre el 20.III (dada més primerenca que s'ha publicat als anuaris) i el 19.V (ambdues cites dels aiguamolls de l'Empordà). Al pas postnupcial no s'ha recollit cap dada.- XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al sector del Matà el 20.III (AOTA); primera citació prenupcial (F). 21 exs. anellats a l'estany de Mornau entre el 18.IV i el 19.V (MOVA i MFRA); (N). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 19.V (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 12.V (XBGA); (F, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 16.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F, G). 63 exs. anellats en diferents esta-

cions entre el 16.IV i el 16.V (DBCA, JFBB i JBGC); (N). 2 exs. anellats a Canal Vell el 16.V (JBGC); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del Ter el 6.IV (ABRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 26 exs. anellats entre el 25.IV i 13.V amb un màxim de 13 exs. anellats l'11.V (JCMC i MGTA); (N). 1 ex. en un jardí del Prat de Llobregat el 20.V (PEGA); darrera citació postnupcial (F).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 12.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 29 exs. al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (N).

GIRONÈS

Salt 1 ex. anellat a l'illa de Ter el 26.IV (MLUA, HMPA, CPVA, JRBB i XVGA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 12.V (EBMA); (G).

OSONA

Torelló 4 exs. a les Gambires el 12.IV (MRFA); primera citació prenupcial (F, G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. al SOCC 173, la Terreta, el 7.V (EMDA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 o 2 exs. a la Pineda el 12.V (ACTA i CAFA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 7 exs., 3 d'ells mascles cantant, a la serralada de Marina el 5.V (FMVA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 3 mascles cantant al riu Besòs el 26.IV (FMVA); (G).

Phylloscopus ibericus

Mosquiter ibèric

Estatus Accidental, amb algunes dades homologades pel CAC. La seva àrea de distribució s'estén pel sud-oest de França i el nord i l'oest de la península Ibèrica, i també pel nord-oest de l'Àfrica. Hiverna al sud del Sahel.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Palau el 7.IV (SSAA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'Alfacada el 25.III (OCVA i MLCA); (G). 2 exs. anellats a Canal Vell el 20.IV (JFBB); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 14.III (JCMC); primera citació prenupcial (G, F). 1 ex. anellat el 27.III (JCMC i MGTA); (G). 1 ex. anellat el 28.III (JCMC i MGTA); (G). 1 ex. anellat el 31.III (JCMC); (G). No trameses al CAC. 1 ex. cantant a la Vidala el 3.IV (JCPA i RSPA); (G). Homologada pel CAC. 1 ex. cantant a l'estació biològica el 4.IV (MGVA); (G). Homologada pel CAC. 1 ex. anellat el 6.IV (MGVA); (G). 1 ex. anellat el 9.IV (JCMC); (G). No trameses al CAC.

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a Espadama el 21.III (MRFA); (G). Homologada pel CAC.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 26.VIII (GBCA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Diverses observacions al riu Besòs: 3 exs. el 10 i 2 exs. el 23.IV (FMVA); (G). No trameses al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant insistentment vora el Besòs el 31.III (FMVA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus collybita

Mosquiter comú

Estatus *P. c. abietinus* migrador i hivernant molt escàs arreu del territori. Cal precisar-ne l'estatus real. *P. c. collybita* resident nidificant comú a la Catalunya humida, i més irregular en la Catalunya més mediterrània, on es troba localitzat a les valls més humides. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=192). Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=362). Índex 2008=0,6

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -21% (*, n=13). Índex 2008=0,3

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. sentit al fondo de l'Alzina el 2.V (PTEA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 12.V (JGBC); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant a l'embarcador l'1.V (MRFA i APFA); darrera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu Un mascle cantant en una zona de ribera a la mollera d'Escalzarre el 19.IX (JFXE); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.IV (AVPA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. anellats el 28.IX (MPLA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 7.VIII (TMXC); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. al riu Besòs el 14.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).
Montcada i Reixac 253 exs. al SOCC 226, Parc Fluvial del Besòs, el 7.I (XLBA); (N).

Phylloscopus collybita tristis

Mosquiter comú siberià

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. Cria a Sibèria. Hiverna al sud d'Àsia, entre l'Irak i l'Índia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 28.IV (MFRA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus trochilus

Mosquiter de passa

Estatus *P. t. acredula* migrador, probablement molt escàs. *P. t. trochilus* migrador

regular i molt comú tant al pas prenupcial com al postnupcial, arreu del territori, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 12.III (JVCB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Palau el 4.VI (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. anellat a l'estació SYL-VIA de coll de Déu el 20.V (RSBA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Riet Vell el 15.III (JBAB i CJMA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a Canal Vell: 1 ex. anellat el 16.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat l'11.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 3 exs. anellats el 16.III (MLMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 9.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 5.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 18.III (MRFA); primera citació prenupcial (F).

Manlleu 1 ex. al Ter el 18.III (MRFA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 6 exs. anellats el 18.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 14.V (MLMB); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. anellats el 8.VII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix l'11.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. anellat a la Coromina del Bac el 19.X (OPPB); darrera citació postnupcial (F).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 2 exs. anellats a la Bòfia el 31.VII (JCOA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sentmenat 1 ex. anellat el 20.VII (CFMA); primera citació postnupcial (F).

Regulus regulus

Reietó

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular pels boscos subalpins i altimontans pirinencs i prepirinencs, amb petits nuclis de nidificants aïllats al Montseny i les Guilleries. Migrador i hivernant regular, però en nombre irregular segons els hiverns, que arriba a les zones de plana i litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=38).
Índex 2008=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 20% (*, n=224).
Índex 2008=4,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al puig de l'Àguila el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al pla de Tudela el 8.X (ACHA i GDBA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. a la Mallereta el 5.XII (PFLB); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 14.XI (XBGA, CGGA i HSCA); (G).

BAIX CAMP

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. en una pineda de la platja de la punta de Riu el 31.XII (APVA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. a l'Alfacada el 17.III (JBCG); (G, F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. a la desembocadura del Ter el 21.X (JBLA); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la pineda de ca l'Arana el 3.I (FLSA); (N). 1 ex. anellat al Remolar el 9.IV (JCMC i MGTA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 13.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

L'Hospitalet de Llobregat 1 ex. ingressa al CRFS de Torreferrussa el 24.X (APVB); primera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 9.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a l'interior del nucli urbà en un pi de l'escola Pompeu Fabra el 24.XI (VPRA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al carrer del Carme el 5.II (PFLB); (G).

Llagostera 1 ex. a l'abocador de Solius el 8.XII (CACB); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 13.XI (JBGC); (G, F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç Savall 1 ex. a la vall d'Horta el 7.XI (CGGA i XBGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a l'interior del nucli urbà el 24.XII (RRSB); (G).

Regulus ignicapilla

Bruel

Estatus Resident distribuït de forma ben àmplia per tot el territori nidificant en qual-sevol massa forestal, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya. Només és absent en les planes de l'interior o el delta de l'Ebre. Migrador i hivernant escàs que apareix regularment a la terra baixa i a la muntanya mitjana arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=202).

Índex 2008=2



Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=318).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=29).
Índex 2008=1,1

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 16.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de cal Tet el 26.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Muscicapa striata

Papamosques gris

Estatus Nidificant estival, tot i que escàs, d'àmplia distribució per tot el territori, manca només a les zones altes dels Pirineus. Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=113).
Índex 2008=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. sedimentats a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 25.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la pineda de la Marina el 10.X (PTEA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 18.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la gola del Ter el 5.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 19.IV (MGVA); primera citació prenupcial (F). 5 exs. a can Dimoni el 15.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la Murtra el 21.VIII (RBVA); possible primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar l'11.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 70 exs. al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (N).

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 18.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys d'en Jordà el 3.X (MFRA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Gallifa el 21.IV (JCBC); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Hostafrancs 1 ex. el 20.IV (CGFA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona Forta entrada de migrants després de les pluges dels dies anteriors amb un mínim de 8-10 exs. sedimentats al costat del riu Francolí l'11.V (RACC); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Palau-Solità i de Plegamans 2 exs. anellats a l'Hostal del Fum el 5.X (CLVA); darrera citació postnupcial (F).

Muscicapa striata balearica

Papamosques gris balear

Estatus Accidental. Diverses dades homologades pel CAC, d'ocells capturats en campanyes d'anellament primaverals

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions al Remolar: 1 ex. anellat el 30.IV (JCMC); primera citació documentada en aquest espai (T). 1 ex. anellat el 10.V (JCMC i MGTA); (T). No trameses al CAC.

Ficedula parva

Papamosques menut

Estatus Accidental. Alguna dada homologada. Cria a Europa central i oriental i a Àsia. Hiverna al sud d'Àsia, des del Pakistan fins a la península de Malacca (Malàisia).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.XI (DBCA, JPVE, IBXB i QCXB); (G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 2.XI (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

Ficedula albicollis

Papamosques de collar

Estatus Accidental, tot i que els últims anys és d'aparició anual. Algunes dades homologades pel CR/SEO. Es reproduïx a Europa central i oriental i per parts de Turquia, el Caucas i l'Iran. Hiverna a l'Àfrica, entre l'equador i el tròpic de Capricorn.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle sedimentat prop del far de la punta de cap de Creus el 27.IV (OBBB, BAAA i BCCA); (G). No tramesa al CAC.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Un mascle al parc del Besòs el 25.IV (XLBA, MCVA i MGVA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella anellada al Remolar el 7.V (JCMC, VSXA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Ficedula hypoleuca

Mastegatatzes

Estatus *F. h. hypoleuca* és un migrador comú per tot el territori. *F. h. iberiae* nidificant estival molt rar i molt localitzat, no hi ha cap zona de Catalunya on nidifiqui de manera regular. Migrador segurament molt escàs.

El patró migratori és molt similar al dels anys anteriors (Sales 2006, Estrada & Anton 2007, Anton 2008). En canvi, són molt interessants les observacions en període de cria: dos nous quadrats UTM 10×10 de reproducció possible a Cassà de la Selva i a Horta de Sant Joan i les citacions de Llivia i de Sant Esteve de la Sarga, en les quals es detecten exemplars en els dos censos SOCC i, per tan es pot suposar que es tracta de zones possibles de reproducció. A més, la darrera es produeix en un hàbitat molt semblant al que utilitza al Sistema Ibèric (Roman *et al.* 1996). Tot i això, cal tenir present que és una espècie amb un dilatat pas migratori prenupcial que finalitza a mitjans de juny i que els mascles defensen territoris d'alimentació durant la sedimentació migratòria (Estrada *et al.*

2004), fet que dificulta establir amb certesa nous territoris de cria.- APFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 25 exs. a la serra Verdera el 25.IV (PFLB, ACHA i JGCB); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions a l'estany de Mornau: 1 ex. anellat el 6.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 21.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un mascle a la riera de Marmellar el 3.VI (PTEA); darrera citació prenupcial (F).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a prop de mas Bellestar el 27.VIII (PTEA i PARA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al SOCC 10, Sant Jaume d'Enveja, el 7.VI (JTOA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 31.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Sabogal el 9.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 30 exs. al parc del Guinardó l'11.V (MGVA); (N). Diverses observacions al parc de Diagonal Mar: 1 ex. el 21.V (RRSB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. l'11.X (RRSB); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Llivia 1 ex. al SOCC 220, Llivia, el 14.VI (XRPA); darrera citació prenupcial molt tardana o citació estival (F).

GARROTXA

Argelaguer 1 ex. al riu Fluvià l'1.IV (SCIA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Cassà de la Selva Una femella duent becada a can Vilallonga el 8.VI (ADGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Girona 1 ex. a les hortes de Santa Eugènia el 6.X (ACHA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 2 exs. a Gallifa el 15.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al SOCC 203, congost de Mont-rebei, el 9.VI (ANCA); darrera citació prenupcial o citació estival (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu Un mascle a Sant Pere de Brugal, en un prat montà amb arbres dispersos, el 5.IV (JPPE i NEXA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 13.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.X (TMXC); darrera citació postnupcial (F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Un mascle al salt de Sotorres el 21.VI (JTOA i JWVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. a Salardú el 22.VIII (MAMA); primera citació postnupcial (F).

Panurus biarmicus

Mallerenga de bigotis

Estatus Resident molt localitzat i molt escàs com a nidificant, al delta de l'Ebre, on resten només unes quantes parelles, i a l'embassament d'Utxesa. Migrador molt escàs i localitzat a les zones humides del litoral o l'interior. Hivernant escàs, més regular als aiguamolls de l'Empordà on sembla que part de la població en aquesta estació pot ser forània, i més irregular a la resta de zones humides.

La minsa informació rebuda no fa més que constatar la delicada i preocupant situació de l'espècie a Catalunya. Es troben a faltar dades habituals en anteriors anuaris, dels aiguamolls de l'Empordà i el delta de l'Ebre. La bona notícia és la constatació per segon any consecutiu de la presència d'almenys 2 parelles establertes a l'embassament d'Utxesa; on es va detectar, per primera vegada l'any 2000 (Aymí & Her-rando 2003). L'observació a Banyoles s'atribueix a un exemplar erràtic o en pas prenupcial tardà. A finals d'abril i maig l'espècie ja ha retornat a les localitats de cria (Cramp & Perrins 1993).- JGGD.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. al canyissar de Lió el 15.IV (JPXE); (E).

SEGRÀ

Torres de Segre Diverses observacions a l'embassament d'Utxesa: un mínim de 2 parelles el 3.IV (AVPA, JGGD i DFXA); (E). Un mínim de 2 parelles el 27.V (JGGD, MGMA, MGTA i JCMG); (E). 2 mascles i una femella (JCMG, MGTA, MGMA i JGGD) i 2 exs. en un sector diferent al de la resta d'observacions anteriors l'11.VI (JGGD, MGTA i JCMG); (E).

Leiothrix lutea

Rossinyol del Japó

Estatus Procedent de captivitat. Alguns nuclis establerts a Collserola des de 1993, i en zones properes a aquesta serralada. Es considera nidificant segur. Es distribueix per l'Himàlaia, Burma i el sud de la Xina.

L'any 2008 cal destacar l'alt nombre d'exemplars anellats a can Balasc en el marc del projecte SYLVIA i l'expansió geogràfica en dues direccions: cap al nord-est on es detecta a Teià per primer cop, i cap al sud-oest per les serralades del marge esquerre del Llobregat on ja s'hi detectà el 2007 (Anton 2008) i on, al 2008, es confirma la seva reproducció a Corbera de Llobregat. En conjunt, es pot afirmar que cria de manera consolidada a Collserola i a la serralada de Marina i que està expandint la seva distribució geogràfica.- CFMA.

BAIX LLOBREGAT

Corbera de Llobregat 5 exs, 3 dels quals són juvenils, al serrat del Vent el 28.VII (CFMA); (R).

El Papiol 5 exs. anellats a les Escletxes el 27.IX (CFMA); (N).

Molins de Rei 2 exs. anellats als camps del Martí del Rec (CFMA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 53 exs. anellats a l'estació SYLVIA 2, can Balasc, amb un màxim d'11 exs. l'11.VI (SSAA); (N).

MARESME

Teià 2 exs. a l'estació SYLVIA 12, els Garrofers, el 8.V (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. anellat el 22.VII (EGGA i PBGA); (G). 5 exs. anellats a Sant Cebrià el 26.IX (PARU); (N). 2 exs. anellats el 18.X (EGGA i PBGA); (G). 20

exs. al SOCC 218, Sant Fost de Campsentelles, el 5.XII (MLMB); (N).

Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga

Estatus Resident nidificant comú pràcticament a tot el territori, manca només en zones molt eixutes o deforestades, i a parts de la franja més seca del litoral. Migrador i hivernant regular que es detecta més sovint al litoral, tot i que és difícil diferenciar els moviments de deambulació que fan els estols de la vertadera migració.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=234).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=356).
Índex 2008=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): 7% (*, n=41).
Índex 2008=0,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns juvenils al parc del Foix el 9.VI (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada de juvenils de l'any (R).

Parus palustris

Mallerenga d'aigua

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular per la Catalunya humida, arriba per la part oriental dels Pirineus a l'Alt Empordà i pel sud a la comarca d'Osona.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -8% (ns, n=20).
Índex 2008=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=37).
Índex 2008=1,1

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. cantant a Montfullà el 4.IV (MFRA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Crespià 1 ex. a la Salida, bosc de ribera del riu Fluvià, el 6.XII (CFQA); (G).

Serinyà Diverses observacions a l'illa de Fares: 2 exs. anellats el 24.II (CFQA i JBVB); (G). 1 ex. anellat el 7.XII (CFQA, JBVB, MFXD, SFXB i XVPA); (G).

Parus cristatus

Mallerenga emplomallada

Estatus Resident nidificant distribuït per tot el territori on hi hagi masses forestals, tot i que és més comú a les coníferes. Manca només en les zones deforestades de la depressió de l'Ebre i en alguns punts amb menys cobertura forestal o del litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=228).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=148).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2008): -10% (*, n=24).
Índex 2008=0,4

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Murtra el 18.X (RBVA); (G).

Parus ater

Mallerenga petita

Estatus Resident nidificant comú arreu de les masses forestals, especialment de coníferes. Manca només en les zones deforestades de la depressió de l'Ebre i les parts més eixutes

o sense cobertura forestal del litoral, tot i que es troba en expansió. Migrador i hivernant regular que pot aparèixer en nombre variable en zones de terra baixa, on no hi és present com a resident.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=162).
Índex 2008=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=118).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -8% (*, n=12).
Índex 2008=0,5



ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un grup juvenil al parc del Foix el 22.V (XBGA, CGGA i HSCA); primera dada de juvenils de l'any (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l'aparcament del Remolar l'1.III (EPXE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la capçalera de la Vidala el 6.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 216 exs. al SOCC 283, Virós, el 13.XII (JRBS); (N).

Parus caeruleus

Mallerenga blava

Estatus Resident nidificant comú, distribuït per tot el territori, llevat de les zones més deforestades, on és molt més local i dels boscos subalpins de coníferes, on pràcticament no penetra enlloc. Migrador i hivernant regular, que arriba en nombre variable a zones de terra baixa on és present en baixa densitat com a resident, o no és present del tot (per exemple algunes zones humides com el delta del Llobregat).

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=121).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (*, n=391).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=40).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas de Rabassers de Baix l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSBS); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex agafant pèl de corder (llana) pel niu prop del riu Francolí, a l'alçada de Sant Salvador el 27.IV (RACC); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Parus major

Mallerenga carbonera

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, llevat dels boscos subalpins del Pirineu, on és absent en bona part i només penetra de forma local, i de les zones més

deforestades, on no s'hi troba per manca d'hàbitat.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=298).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (*, n=444).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=52).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 polls volanders a Santa Creu el 29.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

Sitta europaea

Pica-soques blau


Estatus *S. e. caesia* resident nidificant localment comú als boscos pirinencs de Catalunya. *S. e. hispaniensis* resident nidificant localitzat i escàs a les zones muntanyenques de Catalunya fora del Pirineu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=96).
Índex 2008=0,8

Tendència població

hivernant (SOCC)
Mitjana anual
(2002-2008): 7%
(*, n=134).
Índex 2008=1,1



Tichodroma muraria

Pela-roques

Estatus Nidificant als Pirineus i Prepirineus, tot i que de forma molt local i escassa. Migrador i hivernant regular, en baix nombre, en ambients rupícoles des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, tot i que de forma localitzada.

Com ja és habitual en els anuaris, la major part de dades corresponen a zones d'hivernada i en dates habituals (octubre-abril), cosa que posa de manifest –una vegada més– la prospecció deficient de l'alta muntanya pirinenca. En aquest context resulta lloable l'esforç que s'està realitzant els darrers anys des del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a conèixer millor la població nidificant de pela-roques, com a resultat del qual enguany s'aporten noves dades de cria, encara que es troba a faltar una mínima precisió geogràfica en les observacions. Pel que fa a la fenologia és remarkable la citació tan primerenca (9 de setembre) en una zona baixa de la Catalunya oriental, ja que en aquesta època gairebé no hi ha observacions apartades de l'àmbit pirinenc. També té un cert interès, tot i que no és gens excepcional, l'observació hivernal d'un individu en edificis a Bossòst.- PABB.

**ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/
PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN**

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 6 parelles reproductores localitzades durant un estudi específic de seguiment de l'espècie. En 4 d'elles es confirma amb seguretat la cria i en 2 casos se n'observa la sortida del niu (JRSB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. a la miranda dels Aurons el 19.IV (FCTA i ALTA); darrera citació pre-

nupcial (F). 2 exs. al camí de Sant Jeroni el 30.XI (LHPB); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Àger 1 ex. al congost de Mont-rebei l'1.III (MBRA); darrera citació prenupcial (F).

Camarasa 3 exs. junts volant per la cinclera a la serra de Mont-roig el 8.XI (DDDA, EFTA, EGGD, JRGB, FHVA, MFSA, NGH, MBAA, DARA, SBGA, MFSB, FMSC, EMGC, OGPA, MMRB i JCRH); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Collsuspina 1 ex. present a Palafolls fins el 15.III (PVPA); darrera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. el 6.II (AWWA i CJMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als Ports el 26.XI (MTTB, LWWA i CJMA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Bossòst 1 ex. a les parets de les cases del poble el 19.XII (XBGA); (B).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. a la Castellana de can Torre, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, el 24.XI (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. al viaducte de l'AVE sobre el riu Tordera el 7.IX (XRCA); (F, G, B).

Certhia brachydactyla

Raspinel·l comú

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori en tota mena de masses forestals, grans o petites (per exemple jardins), des de nivells del mar fins a l'alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=246).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=330).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=44).
Índex 2008=1,5

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Alguns juvenils sortits del niu fa poc al parc del Foix el 7.VI (MLBA); primera dada de juvenils de l'any (R).

Remiz pendulinus

Teixidor

Estatus Resident nidificant de distribució irregular i localitzada per certes conques fluvials i zones humides de caire mediterrani (Muga, Llobregat i Fluvià, especialment), i de forma més regular per la vall de l'Ebre i l'àrea d'influència de la depressió de l'Ebre. En regressió a Catalunya. Migrador i hivernant comú que arriba en bon nombre a les zones humides, especialment les del litoral.

En aquest recull d'escasses dades s'ha de destacar les observacions de Rubí al Vallès Occidental (primera citació de cria segura), ja detectada en aquest indret com a colonitzadora l'any 2006. Aquesta espècie comença molt aviat el seu cicle reproductor i cap a finals de febrer es poden veure als mascles enfeïnats en la construcció del niu (Estrada & Anton 2006, obs. pers.). Per tant, les observacions aconseguides a la comarca del Vallès Oriental podrien ser incloses com a probables nidificants, o estar molt a prop d'alguna àrea d'influència on cria. La resta de dades s'han de prendre amb cautela ja que podrien tractar-se



d'ocells en migració o en moviments de dispersió postnupcial.- JRRC i SMMD.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=21).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=31).
Índex 2008=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=7).
Índex 2008=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 4 exs. el 19.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Alguns exs. el 7.III (XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació prenupcial (F). Alguns exs. el 26.VIII (XBGA, CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri prop el Vidal el 19.III (AGR); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Diverses observacions a la bassa dels Alocs: joves en grups familiars durant del maig i el juny. A l'hivern niu vells de quatre territoris ocupats la primavera de 2008 amb 2, 2, 2 i un niu respectivament en

dues zones de bosc de ribera de *Populus alba* fragmentat (JRCD i SMMD); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V i un juvenil el 29.VI (FMVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (G).

Oriolus oriolus

Oriol

Estatus Nidificant estival comú arreu del territori, lligat especialment a les arbredes de ribera, tot i que es pot trobar en altres tipus de bosc, especialment en caducifolis i en plantacions de fruiters. Defuig l'alta muntanya subalpina i bona part de la Catalunya humida, especialment a les zones muntanyenques. Migrador regular, especialment per les zones de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (*, n=217).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Agullana 3 mascles a Santa Eugènia el 14.IV (MSDC i TMJA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 26.VIII (XBGA, CGGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Canal Vell el 13.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 18.IX (XLBA, JPMC, PMBE, IJXA, JPXL i RGLA); darrera citació postnupcial (F).

**GIRONÈS**

Quart Una femella en vol el 9.IX (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Roda de Ter 1 ex a Sorralta el 30.III (JPFB); primera citació prenupcial (F).

SEGRÌÀ

Lleida 1 ex. a Raïmat el 6.IV (FFCA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.IV (TMXC); primera citació prenupcial (F).

Lanius collurio

Escorxadador

Estatus Nidificant estival distribuït regularment per la Catalunya humida i pels ambients altimontans i subalpins als dos vessants dels Pirineus i Prepirineus. Migrador escàs per la resta del territori.

De l'any 2008 en destaquen les dades fenològiques, força extremes: s'ha registrat la citació prenupcial més tardana, el 14.VI, i dues citacions postnupcials, 24.X, i 18.X, que són la segona i la cinquena més tardanes respectivament, des de l'edició del primer anuari, el 1996.- FTCA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=46).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle a la vall de Santa Creu el 14.VI (GBCA, PGGG, TLFA, DSBB, JPPE, DSSC i ETXB); darrera citació prenupcial (F). Un jove a Montjoi el 18.X (MFRA i JBCD); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un juvenil als prats de can Comes el 21.VIII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. caçant a Reguerons el 13.V (RGLA); única citació prenupcial (F, G).

BAIX EMPORDÀ

Belcaire d'Empordà Diverses observacions a Sobrestany: 1 ex. el 26.VIII (JPCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 5.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 8.IX i el 24.X (XLBA); (G).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. a la desembocadura del Terri el 26.IV (NRCA); primera citació prenupcial (F).

Sant Martí de Llémena 1 ex. a Granollers de Rocacorba el 30.VI (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Santa Maria de Corcó Un mascle al trencant del Collell el 6.V (RPEA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a les vinyes de Sant Miquel el 5.V (JCCD i MVEB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà-Serinyà Un juvenil al pla de Martís el 23.IX (CFQA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Un juvenil el 26.VIII (DGCA); (F, G).

Lanius minor**Trenca**

Estatus Nidificant estival molt localitzat i escàs al Segrià-Garrigues. A la resta del territori és un migrant molt rar.

Continua el descens poblacional dels darrers anys, enguany encara més acusat (major del 50%). L'extinció de l'espècie a Catalunya pràcticament és un fet i pot ser només una qüestió de temps. El descens entre el 2007 i 2008 es pot atribuir, en gran part, a un menor retorn del nombre de mascles a les àrees de cria que en anys anteriors. L'explicació més plausible seria una mortalitat inusual dels mascles durant el període de no reproducció, per motius desconeguts. No es poden descartar també problemes relacionats amb una situació meteorològica desfavorable la segona meitat del mes de maig al mediterrani occidental, amb pluja i fred durant força dies consecutius, que podria haver dificultat la localització de les àrees de cria. Aquest fet podria explicar la presència tardana (juny) d'un mascle solitari al Prat del Llobregat. L'observació del maig al PNAE coincideix amb l'arribada dels exemplars i probablement correspon a un ocell a punt d'arribar a l'àrea de cria de Lleida. - DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de Vilaüt l'11.V (AOTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al costat del cementiri del Prat l'11.VI (DBRA); (G). 1 ex. a cal Nani, possiblement el mateix que l'anterior el 26.VI (FLSA); (G).

SEGRIÀ

Només es localitzen 4 parelles reproductores, les úniques de Catalunya, que crien totes amb èxit i s'envolen 19 polls (DGJA, MLMB i MPLA); (R). 1 ex. el 14.V (GBCA); primera citació prenupcial (F).

Lanius meridionalis**Botxí meridional**

Estatus Resident nidificant no gaire abundant distribuït de forma irregular per tot el territori, defugint de forma clara els Pirineus i Prepirineus a partir dels 1.200-1.400 m d'altitud i el sud de Catalunya. Migrador i hivernant regular, però en baix nombre, que pot aparèixer en zones on no hi ha cap població resident.

La població reproductora de botxí a Catalunya es troba en un acusat i preocupant declivi mostrant un descens de la població d'un 57% respecte a 2002, amb una tendència mitjana anual de caire negatiu del 15%, que només era del 9% al 2007 (ICO 2009). La població hivernant es troba també en descens mostrant una tendència considerada com incerta. Aquest axioma de declivi es posa en evidència en l'absència de citacions de reproducció en comarques com Osona, on a l'Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya (Estrada *et al.* 2004) es registraven fins a quatre quadrats amb reproducció segura i possible

en altres tres. Per contra, les observacions mostren una certa estabilitat a la comarca del Penedès. En canvi a la Garrotxa, Montsià i Selva s'han obtingut nous casos de reproducció. Realitza dispersions cap a la costa en època hivernal. A la resta d'Espanya, l'espècie també presenta aquest acusat declivi, amb una important regressió tant de la seva població com de l'hàbitat que ocupa (Hernández & Infante 2004).- OIXA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -15% (*, n=23).

Índex 2008=0,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=109).

Índex 2008=0,8

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. al coll de la Creu de Perves el 20.XII (CGGA, MCMF i XBGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de can Túrries el 18.VIII (AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

L'Arboç 1 ex. als camps entre la fàbrica Omya Clariana i l'Arboç el 16.VI (XPCA); (R).

Castellet i la Gornal 1 ex. posat en un cable al costat de la carretera de Torrelletes el 21.VI (RJRA); (R).

GARROTXA

Besalú 1 ex. entre el 10.VI i el 9.VII (SCIA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (G).

Sant Ferriol 1 ex. al pla de la Canova entre el 14 i el 23.VIII (SCIA); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (G).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. al Montsià el 6.VI (CJMA, ISSB, FNNA i JAAC); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

OSONA

No es troba cap citació que pugui indicar la cria a la comarca i de fet no hi va haver cap observació durant el període entremig a les dues que es publiquen.

Santa Maria del Corcó 1 ex. a la recta de Roda i el Colom Gros el 26.VII (RPEA); possible primera citació de dispersió postnupcial (F).

Vic 1 ex. al Baró a la Guixa del 4 al 20.III (RPEA); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. en uns ametllers a Aramunt el 30.I (FMISA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Espionellà-Serinyà 1 ex. al Pla de Martí el 13.IX (CFQA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Vilobí d'Onyar 1 ex. a les Fonts, Salitja, duent becada el 6.VI (ADGA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (R).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a la zona de Brics el 22.VI (RBVA); (R).

Lanius senator

Capsigrany

Estatus *L. s. rutilans* nidificant estival distribuït regularment pel territori al sud dels Pirineus, però més nombrós a les zones més termòfiles i mediterrànies. Migrador comú. *L. s. senator* nidificant estival distribuït per zones dels Pirineus. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=121).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 7% (ns, n=6).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al cap de Vol el 29.III (ACJA) primera citació prenupcial (F). 3 exs. joves a la pujada entre Sant Pere de Rodes i Vilajuïga el 29.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda (DBCA) i 1 ex. a la vora la Tancada el 20.III (JBAB, JTOA i RSBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a cal Tet: 1 ex. el 7.IV (ARMC i SBXC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 28.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil al Remolar el 24.IX (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc del Besòs el 13.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al camí del mas Puigllong l'11.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Malla 2 exs. l'11.IV (JBCB); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 15.IV (MGMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 26.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Lanius senator badius**Capsigrany balear**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 7 exs. anellats al Remolar entre el 16.IV (JCMC i VSXA) i l'11.V (JCMC); (T). No trameses al CAC.

Garrulus glandarius**Gaig**

Estatus *G. g. fasciatus* resident nidificant distribuït de forma regular per les zones forestals de Catalunya, manca de forma local només en els espais desforestats (a la depressió de l'Ebre i zones de l'Alt Empordà, per exemple). Migrador i hivernant regular, en baix nombre, amb exemplars transpirinencs que possiblement s'afegeixen a la població resident. *G. g. glandarius* resident nidificant als Pirineus. Possiblement migrador i hivernant regular, en baix nombre, amb exemplars transpirinencs que s'afegeixen a la població resident.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=262).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 1% (ns, n=349).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -10% (ns, n=26).
Índex 2008=0,6

Pica pica

Garsa

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori, a excepció de les cotes més altes pirinenques i prepirinenques, i al sud del territori de forma local.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=180).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=274).
Índex 2008=1

BAIX CAMP

La Selva del Camp 100 exs. al SOCC 398, la Selva del Camp, el 30.I (PJAA); (N).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 100 exs. a l'entorn del riu Terri a Mata, probablement formant un dormidor, el 14.I (JMGD); (B).

SEGRÀ

Lleida 1 ex. depredant polls i adults als nius d'oreneta cuablanca *Delichon urbicum* a la catedral el 6 i el 16.V (FMSA); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 ex. amb el blanc del plomatge de color cendra al polígon industrial de can Volart el 17.VII (RRSB); (M).

Pyrhacorax graculus

Gralla de bec groc

Estatus Resident nidificant localment comú a l'alta muntanya pirinenca i prepirinenca, que fa moviments de caire altitudinal que la pot portar a l'hivern a cotes més baixes per les mateixes comarques on viu, sempre en l'àrea d'influència pirinenca. Accidental a la resta de zones, especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=16).
Índex 2008=0,4

PALLARS SOBIRÀ

Alins 207 exs. a la borda Bartomico el 18.XII (JFXE); (N).

La Guingueta d'Àneu 70-80 exs. en un estol mixt amb gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax* al pic de la coma del Forn el 26.VIII (JFXE); (N).

Sort Estol mixt amb gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax* d'entre 240-250 exs. a les bordes de Llesú en zona de prats a 1.500 m. el 19.IV (IOSA i CSAA); (N). Estol de més de 235 exs. a la mateixa zona el 13.XII (IOSA i CSAA); (N).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 50-100 exs. al port del Compte el 9.II (ARSA); (N).

Pyrhacorax pyrrhacorax

Gralla de bec vermell

Estatus Resident nidificant localment comú, distribuït regularment pel Pirineu i Prepirineu, i zones muntanyenques del nord de Catalunya, generalment per sobre dels 1.000 m d'altitud, sempre que hi hagi cingleres. Així mateix, present al sud de Lleida i a les muntanyes de l'interior de Tarragona de forma més localitzada. Fa moviments de caire altitudinal a l'hivern que la poden portar a zones veïnes de menor altitud, i al litoral, on és molt rara o ocasional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 3% (ns, n=56).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=70).
Índex 2008=1,1

NOGUERA

Balaguer Uns 200 exs. a Torre de Noguera el 18.XII (CGGA, MCMF i XBGA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort Estol mixt amb gralla de bec gros *Pyrhhoracorax graculus* d'entre 240-250 exs. a les bordes de Llesú en zona de prats a 1.500 m. el 19.IV (IOSA i CSAA); (N).

SEGRIÀ

Sarroca de Lleida 207 exs. al SOCC 385, vall del Secà, el 4.XII (JBGC); (N).

URGELL

Montgai 214 exs. al SOCC 92, secà de Montgai, el 16.XII (JEBA); (N).

Corvus monedula

Gralla

Estatus Resident nidificant comú de forma irregular i més o menys localment, per tot el territori, especialment pels ambients de caire mediterrani, i és absent o molt rar als altimontans. Defuig la muntanya pirinenca i prepirinenca, i les zones forestals denses. En regressió a Catalunya. Migrador i hivernant regular, hi ha possiblement una entrada d'exemplars transpirinencs, com ho suggereixen les observacions hivernals on zones on no és present. Els individus residents poden fer també altres moviments després de la cria, no gaire coneguts.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=34).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=27).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Masarac 23 exs. a Vilarnadal el 20.XI (JBRC); (N).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la punta de cap de Creus el 6.IV (MPGB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 23.V (FLSA); (G). 2 exs. a la maresma del Remolar l'1.VI (STVB); (G). 1 ex. al Sabogal el 4.XI (FLSA); (G).

Molins de Rei 13 exs. al dormidor dels aiguamolls el 19.I (IJXA, NRPA i SSAA); màxim prenupcial (N). 22 exs. el 18.XII (SSAA i MPLA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Mitjana de 65 exs. a la joca del parc zoològic amb un màxim de 130 exs. el desembre i un mínim de 30 exs. l'abril (JGGD); (N). Un niu a l'edifici del parlament el 10.VI (JGGD); (R). Un niu amb 2 polls en un plàtan *Platanus × hispanica* el 15.VI (JGGD); (R).

GIRONÈS

Girona 28 exs. el a l'ajocador d'espluga-bous *Bubulcus ibis* de Fontajau el 12.I (JFPB, HMPA, CPVA, JRBB, NRCA i ENEA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. sobre el nucli urbà en vol direcció Caldes el 25.III (EBMA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Mínim de 1.000 exs. a la joca el 12.II, l'11.X i el 3.XII (JEBA); (N).

SELVA

Vidreteres 4 exs. sobrevolant el nucli urbà el 12.I (ADGA); escàs a la comarca (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 parelles van del parc de les Aigües al riu Besòs a alimentar-se a la llera del riu l'1.II (PABA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 9 exs. a can Cabanyes el 15.XI (JMOB); màxim anual (N).

Corvus corone**Cornella**

Estatus Resident nidificant de distribució regular a tot el territori, excepte les comarques litorals, on s'hi pot presentar de manera local.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 6% (*, n=91).
Índex 2008=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 11% (*, n=105).
Índex 2008=1,7

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l'estació biològica el 5.IV (STVB); (G).

CERDANYA

Llivia 76 exs. al SOCC 220, Llívia, el 27.I (XRPA); (N).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 54 exs. volant riu Fluvià avall a l'illa de Fares el 19.IV (CFQA i JBVB); concentració destacable (N).

Corvus corone cornix**Cornella emmantellada**

Estatus Accidental. Diverses citacions homologades. Es distribueix per Irlanda, Escòcia, Dinamarca i Escandinàvia; a l'est fins la vall del Ienisei; al sud per part de



l'est d'Alemanya, Txèquia, Eslovàquia, Hongria, el nord-est de Romania, el nord de Iugoslàvia, el nord d'Itàlia, i Còrsega, i cap a l'est fins als 49°N a Rússia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex., possiblement el mateix present al Baix Empordà, entre l'Armentera i Cinclaus el 30.V (RFRA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 1 ex. als arrossars del 21.V (RFRA) al 27.XI (ABRA i AFXF); (G). No tramesa al CAC.

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. prop les Coromines el 13.VII (AGRB); (G). No tramesa al CAC.

Corvus corax**Corb**

Estatus *C. c. corax* resident nidificant a les zones muntanyenques dels Pirineus. *C. c. hispanus* resident nidificant, de distribució irregular, i de presència localitzada. Absent a pràcticament tot el litoral, i en general a les zones de plana. Fa moviments a la tardor-hivern que produeixen concentracions hivernals a determinades àrees.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=89).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=251).
Índex 2008=1,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una parella amb actituds de zel al parc del Foix el 7.III i una altra parella en un altre sector del parc el 12.III (XBGA, CGGA i HSCA); citacions en un espai on hi criava fa alguns anys i sembla recolonitzar (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre Nou Barris el 17.XI (XLBA); (G).

GARROTXA

Beuda 72 exs. a la Mare de Déu del Mont el 14.IX (PFLB, MSFB i PFSA); (N).

OSONA

Viladrau Uns 700 exs. en un dormidor al peu del Matagalls observat des de coll de Bordriol el 27.I (PCPA); (N, B).

SELVA

Blanes 2 exs. al jardí botànic Mar i Murtra el 12.III (EBMA); (G).

SOLSONÈS

Lladurs Un mínim de 150 exs. formant un preajocador en un turonet al costat del nucli urbà el 8.II (RBVA); (N).

Sturnus vulgaris

Estornell vulgar

Estatus Resident nidificant abundant a la major part de Catalunya, només manca en algunes zones de Tarragona. Migrador i hivernant comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=202).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 43% (*, n=128).
Índex 2008=5,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=9).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. en pas cap al nord a 2 milles nàutiques al sud de cap Norfeu el 29.III (PFLB, ACHA, OCVA, JAPB, JPPE, CSAA, JPMC, JBDA, JBCA i ALTA); (B). Més de 5.000 exs. a s'Alqueria l'1.XI (PFLB, ACHA, JVSA, JLRA i JVSJ); destacable concentració postnupcial (N).

BAIX EBRE

L'Ampolla 7.500 exs. al SOCC 434, basa d'Enmig, el 2.XII (MSBB); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Lladorre 3 exs. al nucli urbà de Boldís Sobirà el 2.III (JPPE); (G).

Sturnus unicolor

Estornell negre

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular i comuna pel sud i la porció occidental de Catalunya (depressió Central, comarques de Tarragona), i de manera més irregular per la resta del territori. Actualment present en pràcticament tota l'àrea, incloses les comarques pirinenques i prepirinenques. La distribució exacta a hores d'ara és mal coneguda a causa de la dificultat de separar ambdues espècies d'estornells.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=91).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=59).
Índex 2008=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus. 2 exs. aturats entre un grup de *Sturnus vulgaris* a Rabassers de Dalt el 14.XII (PFLB i JVSA); (G).

SEGRITÀ

Almacelles 1.583 exs. al SOCC 377, Almacelles, el 27.XII (JBSA); (N).

Passer domesticus**Pardal comú**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, especialment lligat a nuclis urbans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=250).
Índex 2008=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=144).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=30).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 24 exs., alguns dels quals són joves de l'any nas-

cuts als nius del monestir, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 23.V (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. albi al parc fluvial el 24.IX (TECA); (M).

GIRONÈS

Girona Uns 600 exs. a l'ajocador de la plaça poeta Marquina el 31.VII (ACHA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 7 exs. alimentant-se de brots tendres de *Prunus* a Saurí el 23.III (JRBSB); (B).

Passer montanus**Pardal xarrec**

Estatus Resident nidificant comú a la major part del territori, on prefereix els terrenys agrícoles i suburbans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=71).
Índex 2008=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=176).
Índex 2008=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -19% (*, n=16).
Índex 2008=0,2

NOGUERA

La Sentiu de Sió 125 exs. al SOCC 341, la Sentiu de Sió, el 22.I (JEBA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un grup d'uns 300 exs. en un parell de pins al marge de l'antic camp d'aviació el 25.XII (OGVA); (N).



Petronia petronia

Pardal roquer

Estatus Resident nidificant escàs de distribució localitzada i irregular, tant en ambients rupícoles com urbans i suburbans. Migrador i hivernant escàs, o rar, que apareix en zones on no cria, tant de l'interior com del litoral, on pot aparèixer lligat als estols de fringíl·lids migradors.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=42).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 25% (ns, n=61).
Índex 2008=6,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs., alguns dels quals són probablement joves de l'any, al llarg del SOCC 400, Sa Plannassa, l'11.VI (PFLB i GVXB); primera dada de juvenils de l'any (R).

Rabós 310 exs. el 15.I (ECFA); (N).

GARROTXA

Castellfollit de la Roca Un mascle cantant en una torre d'electricitat a la N-260 el 4.VI (FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

GIRONÈS

Sant Jordi Desvalls 2 exs. al pla de Sobrànigues a la zona d'extracció de sorra, on hi ha nius d'abellerol *Merops apiaster*, el 28.VI (ACHA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 62 exs. al SOCC 341, la Sentiu de Sió, el 22.I (JEBa); (N).

OSONA

Gurb Uns 80 exs. al Serí el 16.IX (RPEA); (N).

Montifringilla nivalis

Pardal d'ala blanca

Estatus Nidificant molt rar als Pirineus, on només hi ha la confirmació de la seva reproducció al Pallars Sobirà, i es distribueix molt irregularment pels cims pirinenques més alts. Més comú com a hivernant, quan es pot observar pràcticament arreu de la zona pirinenca i prepirinenca, tot i que amb concentracions importants només de forma localitzada. A la terra baixa i al litoral és present de forma ocasional.

A diferència de l'hivern 2007/2008, quan l'hivernada d'aquesta espècie al Pirineu oriental català va ser reduïda, a finals d'any s'han rebut dades de diverses localitats pirinenques, prepirinenques i d'alguns dels cims més alts de la Serralada Prelitoral. Aquest fet segurament és degut, en gran part, al fred i nivós hivern que hem tingut. A la zona tradicional d'hivernada de la collada de Toses s'han observat grups màxims d'uns 150 exs., grups que, cap al gener i febrer, solen fer-se més grans (Fernández-Ordóñez 2009). La forta innivació i les baixes temperatures a les cotes més altes han propiciat que, a més de les observacions prelitorals catalanes, també s'hagin detectat alguns exemplars a les províncies de Castelló (Alamán 2008) i Terol (Polo & Cabo 2008), i també a l'illa de Mallorca (Manchado 2008).- JFOB.

BERGUEDÀ

Bagà Un mínim de 100 exs. a coll de Pal el 16.II (TASA); (E, N). Un estol de 140-160 exs. al vessant sud de la Tossa d'Alp el 24.XII (PABB); (E, N).

Castellar de n'Hug Entre 500 i 600 exs. en un estol al sud del coll de la Creueta i un altre estol d'uns 400 exs., potser el mateix a dalt del coll el 6.XII (MBVA); (E, N).

**OSONA**

El Brull 1 ex. al Matagalls el 9.XI (XIPA i JEXD); primera citació postnupcial (E, F, G).

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 14 (JEPB) i el 15.XI (RJNA); (E, G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. al SOCC 272, port de la Bonaigua, el 15.I (JCBD); (E). Mínim d'1 ex. al pic de Muntanyol el 8.II (ABRA); (E). Un mascle, una femella, un poll volander i 2 exs. més d'edat i sexe indeterminat al tuc de Barbeguer el 19.IX (JRSB i FCTA); 5e any consecutiu de cria comprovada en aquest sector (E, R).

Espot 2 exs. al SOCC 405, Teso, el 21.I (JGCC); (E).

RIPOLLÈS

Toses Diverses observacions a prop de la collada: Uns 150 exs. el 20.XII (PARU); (E, N). 4 exs. anellats el 27.XII (PARU); (E).

VAL D'ARAN

Naut Aran Una parella sobrevolant els vessants a l'estany de Montoliu el 17.VII (JRSB); (E, R). Un adult a la carretera de Baqueira al pla de Beret el 27.XI (XNPA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

El Brull 1 ex. al Matagalls el 9.XI (JEXD i XIPA); (E, G).

Fogars de Montclús Diverses observacions al turó de l'Home: 2 exs. a l'aparca-

ment el 15.XI (RBVA i MVCA); (E, G). 2 exs. en plomatge d'hivern el 21.XII (ARHA); (E, G).

Estrilda astrild**Bec de corall senegalès**

Estatus Resident introduït, procedent de captivitat, que manté petites poblacions naturals de forma molt localitzada en algunes comarques (Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental, per exemple). Es distribueix per Àfrica al sud del Sàhara.

Les noves dades de Bigues i Riells (primeres per al municipi) confirmen l'expansió d'aquest estríldid seguint el riu Tenes, curs secundari de la conca del Besòs, una de les principals vies de colonització d'aquesta espècie a Catalunya (Estrada *et al.* 2004). Aquest fet ja s'ha constatat anteriorment en altres rius i rieres del Vallès (Congost, Ripoll i riera de Caldes). També està ampliant la seva distribució per rieres i altres zones agrícoles del Maresme, amb o sense aigua. Les encara petites poblacions que hi ha al riu Francolí (Tarragonès) i al pantà del Foix (Alt Penedès) sembla que es mantenen, tot i que en baix nombre. A la comarca de la Selva, on s'ha comprovat la cria als estanys de Sils, també s'està constatant una expansió de l'espècie resseguint el curs de la Tordera, població que sembla connectada amb les del riu Mogent (Vallès Oriental). - JFOB.

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 8 exs. el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. a cal Tet el 10.I (PBGA i JBOL); (N). 12 exs. a la Vidala el 12.VIII (RBVA); (N). Uns 40 exs. a cal Lluquer el 15.VIII (RBVA); (N). 14 exs. a

Reguerons l'11.X (RBVA); (N). Uns 30 exs. al camí de València el 20.X (RBVA); (N).

Molins de Rei 10 exs. als aiguamolls el 22.VIII (CFMA i RDSA); (N).

Olesa de Montserrat 38 exs. a l'Areny de Vilapou el 16.III (JCRD); (N).

Sant Boi de Llobregat Un grup d'un mínim de 50 exs. entre el 17 i el 22.XII (JGMF); (N).

MARESME

Cabrera de Mar 10 exs. alimentant-se en un rostoll junt amb els pardals comuns *Passer domesticus* als vivers de can Barrau el 23.VIII (JPSA); (B).

Dosrius 12 exs. a la llera de la riera el 24.VIII (CFMA i RDSA); (N).

Mataró 58 exs. al SOCC 143, Sant Andreu de Llavaneres-Mataró, el 12.I (ACSA); (N).

Premià de Mar Estol de 40 exs. a la platja del port el 24.II (JSPC); (N).

SELVA

Fogars de la Selva Alguns exs. juvenils anellats a l'església de Sant Cebrià el 8.XI (HAPA i JGMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

Sils Presència regular als estanys des del 19.III (TMXC) amb un màxim de 125 exs. el 5.XII (XRCA); (N). Una femella amb placa incubatriu anellada el 7 i el 26.VII (JVLA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

TARRAGONÈS

Tarragona Alguns exs. a la presa del Francolí el 26.I (ACTA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 2 exs. el 19.I (VPRA); (G).

Montornès del Vallès Uns 15 exs. al riu Congost el 12.I (CFMA i AERA); (N).

Fringilla coelebs

Pinsà comú

Estatus *F. c. balearica* resident nidificant comú a la Catalunya humida i a les zones muntanyenques de tot el territori al sud dels Pirineus, més escàs pels ambients forestals més mediterranis. Manca només a les zones més deforestades i termòfiles. *F. c. coelebs* resident nidificant comú als Pirineus i Prepirineus. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori. Als boscos subalpins pirinencs es comporta com a estival.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=227).
Índex 2008=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (*, n=208).
Índex 2008=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): 22% (ns, n=20).
Índex 2008=2,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 11 exs. al mas de la Pallera el 15.IX (PFLB i JVSA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Una parella a la pineda de Sant Semison el 23.IV (PTEA); darrera citació prenupcial (F). Alguns exs. al parc del Foix el 4.X (CGGA, XBGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Alforja Més de 3.000 exs. travessant el coll d'Alforja el 8.XII (CGGA i XBGA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana el 19.IV (JXA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 14.X (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 18.425 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 5.193 exs. el 5.XI (MGVA); (N, F).

Santa Coloma de Gramenet Una femella al Parc Fluvial del Besòs el 7.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Tiana 1 ex. volant en direcció nord a la Conreria el 18.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1.367 exs. al SOCC 341, la Sentiu de Sió, el 22.I (JEBA); (N).

Fringilla montifringilla**Pinsà mec**

Estatus Migrador i hivernant regular, localment comú però en general més aviat escàs, de presència més comuna a la Catalunya humida, i més escàs o rar a la meitat sud.

El 2008 s'ha rebut un allau de citacions, tant de principi com de final d'any, tot i que han estat molt més abundants en aquest darrer període. D'aquesta manera, de gener a abril s'han recollit 25 citacions corresponents a 93 exemplars, mentre que entre octubre i desembre el nombre de citacions ha pujat a 39 que fan referència a un total de 737 exemplars. Aquestes diferències són habituals en una espècie que fluctua molt segons els anys (Ferrer *et al.* 1998).- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (ns, n=36).
Índex 2008=0,7

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. al riu Gaià el 30.XII (CGGA); (G).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. en un camp a prop de cal Bladet l'11.XI (PTEA); (G). 1 ex. capturat en un parany prop de la Timba el 5.XII (MCMF); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex anellat a l'illa de Buda el 29.III (DBCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Una femella adulta a mas Pinells el 29.III (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. a la finca de can Morral el 21.III (JSZA); (G).

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 17.III (EGXF); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions a Sant Pere Màrtir: 2 exs. el 22.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 81 exs. en migració durant 20 dies de seguiment realitzat entre les 8:00 i les 10:30 h entre el 3.IX i 12.XI amb un màxim de 29 exs. el 5.XI (MGVA); (N).

GARROTXA

Les Preses Uns 50 exs. a Pocafarina el 19.II (FTCA); (N).

MARESME

Premià de Dalt Un mascle amb un grup de pinsans comuns *Fringilla coelebs* a prop de l'ermita de Sant Mateu el 5.IV (JPSA); darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

La Sentiu de Sió 1 ex. al SOCC 341, la Sentiu de Sió-Camarasa el 22.I (JEBA); (G).

OSONA

Gurb Uns 500 exs. prop de Quadres el 14.XII (RJNA); (N).

Torelló 1 ex. prop del nucli urbà el 18.X (JBCB); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Camós 32 exs. en uns camps al riu Matamors el 30.XII (CFQA); (N).

PLA D'URGELL

El Poal Un mínim de 4 exs. menjant entre pardals *Passer domesticus*, pinsans comuns *Fringilla coelebs* i verdums *Carduelis chloris* en un hort el 21.II (JEBA); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix l'1.XI (JBGC); primera citació postnupcial (F). 22 exs. al SOCC 384, vall de Sant Joan, el 15.XII (JBGC); (N).

RIPOLLÈS

Sant Pau de Segúries 1 ex. anellat al molí de Matalasca el 15.X (OPP); primera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Hostafrancs 1 ex. al SOCC 18, Hostafrancs, el 30.XI (CGFA); (G).

SEGRÀ

Sarroca de Lleida 25 exs. al SOCC 385, vall del Secà, el 4.XII (JBGC); (N).

SOLSONÈS

La Coma i la Pedra 2 exs. anellats a la Bòfia l'11.X (JCOA); primera citació postnupcial (F).

Olius 2 exs. al pla d'Olius el 27.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran Una parella en un jardí a Salar-dú el 23.III (XNPA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Castellterçol 1 ex. al SOCC 419, Castellcir, el 13.XII (BIPA); (G).

Serinus serinus**Gafarró**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, tot i que és molt més abundant al litoral i a les zones de terra baixa de caire mediterrani. Migrador i hivernant comú arreu del territori, especialment al litoral. Part de la població resident es comporta com a estival, tant les parelles que nidifiquen a les muntanyes prepirenques i pirinenques com les que ho fan al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=144).
Índex 2008=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=143).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -20% (*, n=36).
Índex 2008=0,3



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. arribant del mar a la punta de cap de Creus el 5.IV (PFLB, AOVA, MCMB i JVSA); (B).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella adulta amb 2 polls de l'any al parc central de Nou Barris el 12.IV (JCJA); primera dada de juvenils de l'any (R). 246 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 93 exs. el 5.XI (MGVA); (N, F).

Serinus citrinella**Llucareta**

Estatus Nidificant, generalment estival, als boscos subalpins pirinencs i prepirinencs. Migrador i hivernant per les comarques properes a l'àrea de nidificació en zones de menor altitud, on pot nidificar irregularment segons la producció de recursos tròfics. Ocasional o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=39).
Índex 2008=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 5% (ns, n=51).
Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Colera 4 exs. entre el coll dels Empedrats i el puig dels Taravaus el 13.XII (ABRA); (G).

La Jonquera 1 ex. en una pinassa *Pinus nigra* al Roc dels tres Termes el 9.VI (JBRC); (G).

Maçanet de Cabrenys 1 ex. al Roc de Frausa el 3.V (BMBA i ABRA); (G).

GARROTXA

Sales de Llierca 3 exs. a el coll de Faja el 27.I (MLLA); (G).

OSONA

Alpens Un mascle i una femella a Sant Pere de Serrallonga el 17.V (JCRC); (G).

SOLSONÈS

Olius Uns 40 exs. al pla d'Olius el 21.II (RBVA); (N).

Carduelis chloris**Verdum**

Estatus *C. c. aurantiiventris* resident nidificant comú arreu del territori, defugint només les zones de major altitud dels Pirineus i Prepirineus. Pot realitzar alguns moviments encara no prou coneguts. *C. c. chloris* migrador i hivernant regular, en major nombre quan els hiverns són més rigorosos a l'àrea d'origen (nord i centre d'Europa).

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=252).
Índex 2008=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=335).
Índex 2008=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -9% (*, n=25).
Índex 2008=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 25 exs., alguns dels quals són joves de l'any a Montjoi i un poll volander a Falconera el 9.VI (PFLB); primeres dades de juvenils de l'any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 27 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F).

Carduelis carduelis

Cadenera

Estatus *C. c. caniceps* subespècie asiàtica procedent de captivitat. *C. c. carduelis* migrador i hivernat comú arreu del país. *C. c. parva* resident nidificant comú distribuït regularment arreu del territori, que es pot observar des del nivell del mar fins a l'alta muntanya pirinenca, tot i que és més abundant en les zones més termòfiles i de caire mediterrani.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (*, n=259).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=182).
Índex 2008=1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -17% (*, n=27).
Índex 2008=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 31 exs., alguns dels quals són joves de l'any a Montjoï el 9.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 53 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI (MGVA); (N, F).

TARRAGONÈS

Tarragona Niu ja construït en un arbre del jardí davant el col·legi Cèsar August el 6.IV. El 13.IV s'observa un adult covant (RACC); (R).

Carduelis spinus

Lluèr

Estatus Nidificant en nombre irregular i escàs als boscos subalpins pirinencs i prepirinencs, i molt més rar en altres zones de menor altitud i fins i tot mediterrànies, segons les irrupcions que ens arriben a l'hivern. Migrador i hivernant regular arreu del territori però en nombre molt variable.

El 2008 resulten molt curioses algunes citacions estivals a terra baixa (Baix Llobregat, Gironès i Vallès Oriental) d'individus aïllats que poden ser atribuïdes a exemplars erràtics o, fins i tot, a possibles escapaments d'ocells captius.- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -10% (*, n=112).
Índex 2008=0,4

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l'embassament del Foix el 28.III (CGGA); darrera citació prenupcial (F).

Olèrdola 2 exs. migrant al turó dels Tres Partions l'11.X (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Diversos exs. al riu Segre el 14.IV (JNVA); darrera citació prenupcial (F).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. en pas pel riu Llobregat el 12.X (JSZA, FSJA i JCRD); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 25 exs. a mas Pinell el 29.III (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Esteve Sesrovires 1 ex. a can Amat el 12.V (SSAA); citació estival (F).

BARCELONÈS

Barcelona 372 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 95 exs. el 5.XI (MGVA); (N, F).

GARROTXA

Montagut Un mascle cantant i alguns exs. sentits a can Bundància el 22.IV (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sant Gregori Uns 200 exs. a can Muntanya el 3.II (PFLB); (N). 1 ex. a Constantins el 2.VI (MBMB); citació estival (F). 2 exs. a can Muntanya l'11.X (MBMB); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 12.X (MRFA); primera citació postnupcial (F).

Sant Vicenç de Torelló 7 exs. entre Vila-seca i Bordgonya el 12.IV (JCRC i JMXP); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Un total de 78 exs. en estols petits a les vores de l'estany el 4.XII (CFQA); (N).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 8.X (JBGC); primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses Un estol d'uns 20 exs. al molí de Matalatosca el 12.X (OPPB); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm Més de 70 exs. en pinedes de pi roig *Pinus sylvestris* el 27.I (ADGA i MGSA); (N).

TERRA ALTA

Prat del Comte 2 exs. a l'antiga estació el 29.III (CGGA i XBGA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Més de 100 exs. a l'interior del nucli urbà el 30.III (RRSB); (N).

Martorelles Una femella o juvenil al riu Besòs el 23.VIII (FMVA); citació estival (F).

Carduelis cannabina**Passerell comú**

Estatus *C. c. cannabina* migrador i hivernant comú arreu de tot el territori. *C. c. mediterranea* resident nidificant distribuït per tota mena d'ambients oberts des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=146).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 4% (ns, n=247).
Índex 2008=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs., alguns dels quals són joves de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 23.V (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 387 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 104 exs. el 27.X (MGVA); (N, F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 10.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Tordera 500 exs. als camps al sud de Formasa el 8.I (EBMA); (N).

NOGUERA

Balaguer 375 exs. al SOCC 27, secà de Balaguer, el 28.I (ANCA); (N).

Carduelis flammea

Passerell golanegre

Primera citació homologada a Catalunya d'aquesta subespècie que cria als Alps, la Gran Bretanya, la costa del mar del Nord entre el nord-oest de França i Dinamarca, el sud d'Escandinàvia i les muntanyes del centre d'Europa (Clavell 2002).- MARC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. de la subespècie *cabaret* anellat a l'embassament de Sant Ponç i recapturat diverses vegades entre l'11.III (JCOA) i l'1.IV (JCPA); (G). Homologada pel CAC.

Loxia curvirostra

Trencapinyes

Estatus Resident nidificant distribuït regularment pels boscos de coníferes pirinencs i prepirinencs, i més irregularment per la resta de zones forestals amb coníferes, on és més aviat localitzat. El nombre dels efectius reproductors pot variar molt d'un any a l'altre. Migrador i hivernant regular, però de nombre variable segons hi hagi o no irrupcions, que pot aparèixer en totes les zones forestals de coníferes del país.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -13% (*, n=56).
Índex 2008=0,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -3% (ns, n=56).
Índex 2008=1,6

ALT EMPORDÀ

Capmany 2 exs. en vol als Castrells el 2.VI (FMVA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. a les pinedes de pi blanc *Pinus halepensis* i pinastre *Pinus pinaster* de l'extrem oriental del turó de les Llaures, al cap Gros el 22.XI (ARVA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 5 exs. anellats a l'embassament del Foix el 15.XI (MBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Un grup familiar observat a can Bosquets, la Rierada, serra de Collserola el 19.VII (JRCD i SMMD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 7 exs. sedimentats al parc del Guinardó el 7.IX (MGVA); (G, N). 60 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 14 exs. el 16.XI (MGVA); (N, F).

GIRONÈS

Girona 7 exs. a la pujada dels Àngels el 19.VI (PFLB); (G).

Sant Julià de Ramis 4 exs. al torrent de la Garriga el 24.X (PFLB); (G).

PLA DE L'ESTANY

Crespià 12 exs. al torrent que desemboca al riu Fluvià a l'arbreda de la Salida, el 6.XII (CFQA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 13 exs. al Puigventós el 24.VI (OBJA); (F).

Pyrrhula pyrrhula**Pinsà borroner**

Estatus Resident nidificant de distribució regular i comuna per la zona montana a la Catalunya humida, i pels Pirineus i Prepirineus. Hivernant escàs i molt localitzat fora de l'àrea esmentada.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -1% (ns, n=28).
Índex 2008=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -11% (*, n=51).
Índex 2008=1,1

ALT EMPORDÀ

Bàscara 1 ex. al riu Fluvià el 12.XI (PFLB); (G).

La Jonquera 1 ex. al Puig Neulós el 24.I (JBRC); (G).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Un mascle en una zona arbrada propera a l'embassament del Foix el 30.V (CGGA, XBGA i HSCA); (G).

Mediona 1 ex. el 6.II (XBGA); (G)

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració a Sant Pere Màrtir el 29.X i 1 ex. el 5.XI (MGVA); (F).

CONCA DE BARBERÀ

Les Piles 1 ex. al Molí Nou de Sant Gallard el 3.II (JMFC i MSXF); (G).

Santa Perpètua de Gaià 3 exs. a Pontils al riu l'11.II (FMVA); (G).

GIRONÈS

Canet d'Adri 13 exs. a Rocacorba el 6.XII (ABRA); (N).

Girona Un mascle i 2 femelles a la pujada als Àngels el 2.II (JRBB i MCFA); darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. a les Tarteres el 12.I (DDDA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. als amarradors el 18.XI (CFQA); primera citació postnupcial (F).

Porqueres 1 ex. a l'estanyol nou de can Cisó el 15.III (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

PRIORAT

La Figuera 1 ex. al riu Montsant el 13.II (FMVA); (G).

Coccothraustes coccothraustes**Durbec**

Estatus Nidificant molt rar de distribució molt irregular i localitzada. Migrador i hivernant més regular, tot i que de distribució més aviat localitzada, i que pot variar en nombre significativament segons els anys.

Destaca el nombre de citacions que augmenten la distribució dels escassos registres de cria. Es detecta en un total de 8 quadrats nous de cria possible, situats en 6 comarques, la majoria al nord del país. A l'Alt Empordà se'n registren 3 que s'afegeixen a les noves zones localitzades darrerament (Sales 2006, Estrada & Anton 2007, Anton 2008). Sembla que es confirma l'augment de la població reproductora en les zones favorables (Estrada *et al.* 2004). Pel que fa a les dades d'hivernada, ja de per si molt fluctuants en funció de l'any, aquest hivern s'han donat grans oscil·lacions en funció del mes: al SOCC de gener tan sols es van citar 7 exs, men-

tre que al desembre, es van produir 39 citacions amb un total de 172 exs. De la mateixa manera, la majoria de les observacions publicades corresponen a finals d'any i durant el pas postnupcial es registren alguns estols força nombrosos.- FTCA.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 2% (ns, n=108).
Index 2008=2

ALT EMPORDÀ

Cantallops Un grup familiar amb un mínim de 2 juvenils en una sureda als afores del poble el 4.VII (ACJA); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR). Mínim de 40 exs. en una arbreda de Bell-lloc el 29.XI (ABRA); (N).

Capmany Mínim de 5 exs. al voltant dels Castrells el 2.VI (FMVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Sant Llorenç de la Muga 2 exs. el 19.VII i 1 ex. el 2.VIII (JCTB); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. a Ginoles el 21.I (XBGA); (G).

Olèrdola 53 exs. en un grup migrant al turó dels Tres Partions el 25.X (CGGA, XBGA i HSCA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 184 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 51 exs. el 24.X (MGVA); (N, F).

CONCA DE BARBERÀ

Vilaverd 1 ex. a la part nord de la serra de Guixeres i a menys de 500 m del riu Francolí el 5.VI (FMVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

GIRONÈS

Bescanó 1 ex. cantant a la riera a Montfullà el 29.V (MFRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

MONTSIÀ

Freginals 1 ex. l'1.X (CJMA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. a Malars el 17.X (JPRA); primera citació postnupcial (F).

Orís 37 exs. a Tartera el 15.III (JCRC); darrera citació prenupcial i màxim anual (F, N).

Tavèrnoles 1 ex. a Fussimanya (RBCA) i 8 exs. entre Fussimanya i el parador de Sau el 17.X (JPRA); primeres citacions postnupcials (F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp Es detecta l'espècie a Rodés l'11.VIII (EVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. als horts dels voltants de la ciutat el 12.IX (JMGD); primera citació postnupcial primerenca (F).

RIPOLLÈS

Camprodon Una parella a la Quera l'11.VI (FTCA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

SELVA

Massanes 2 exs. observats i escoltats en un bosc de ribera a can Sordet el 24.IV i 1 ex. escoltat i observat a la mateixa el 12.V (JCRC i SMMD); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 3 exs. parats en uns pins prop del poble el 19.X (RACC); primera citació postnupcial (F, G).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 45 exs. al SOCC 482, Horno, el 19.XII (CGGA i MCMF); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. en vol al restaurant el Palauet de la serralada de Marina el 25.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes 2 exs. a can Ràpia el 4.VII (SGRA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (GR).

Plectrophenax nivalis**Sit blanc**

Estatus Accidental, algunes dades homologades pel CAC, especialment observat al litoral en platges de zones humides, encara que també hi ha dades a zones d'alta muntanya.

NOGUERA

Os de Balaguer Un mascle adult a Alberola associat a un bàndol d'emberizids l'11.XII (MGMA); (G). Homologada pel CAC.

MARESME

Arenys de Mar Continua l'ex. localitzat el 30.XII.2007 a l'espigó de llevant fins el 5.II (DBRA, LHPB i EBMA); (G). Homologada pel CAC.

Emberiza citrinella**Verderola**

Estatus Resident nidificant a la Catalunya humida i als Prepirineus i Pirineus, especialment en ambients altimontans. Migrador i hivernant, més comú i regular a l'interior i a les comarques properes a l'àrea de nidificació, i molt més escàs o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -2% (ns, n=29). Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 39% (*, n=42). Índex 2008=5,4

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern a l'Alfacada el 16.II (CODA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 2 exs. el 27.XI (ABRA i AFXF); (G).

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels Una femella a la platja el 17.XII (RBVA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions a Sant Pere Màrtir: 1 ex. el 29.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. en migració en 20 dies de seguiment de entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 2 exs. el 3.XI (MGVA); (N).

GARROTXA

Sant Ferriol Un mascle canviant el plo matge a Fares el 2.IV (SCIA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. a Montcal el 14.II (ABRA); (G).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 65 exs. al SOCC 173, la Terreta, el 29.I (EMDA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. cantant a Bonabé el 6.IV (JPPE); primera dada de cant (R).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 12.XI (JBGC); primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Prats de Molló 66 exs. al SOCC 326, Pla Joan, el 6.XII (JCMA); (N).

SEGARRA

Torà Mínim de 7 exs. al Fontanet el 13.XII (CODA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 19.I (JVCB); (G).

SOLSONÈS

Solsona Un mínim de 50 exs. a les rodalies del nucli urbà l'1.II (RBVA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny Un mascle cantant a la Traüna el 29.V (RGLA); darrera citació postnupcial (F).

Emberiza cirius

Gratapalles

Estatus Resident nidificant comú distribuït de forma regular per tot el territori a excepció de les zones més muntanyenques dels Pirineus i Prepirineus. Migrador i hivernant regular en zones obertes arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=214).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -7% (*, n=127).
Índex 2008=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -21% (*, n=17).
Índex 2008=0,4

BARCELONÈS

Barcelona 23 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i el 12.XI amb un màxim de 5 exs. el 3 i el 5.XI (MGVA); (N, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 31.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Emberiza cia

Sit negre

Estatus Resident nidificant distribuït regularment pels ambients muntanyencs (generalment per sobre dels 400 m d'altitud), tot i que en moltes zones és de presència més aviat local. Migrador i hivernant regular, de presència en ambients de terra baixa de l'interior i en zones del litoral on no és present com a nidificant.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=132).
Índex 2008=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (*, n=232).
Índex 2008=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2008): -6% (ns, n=9).
Índex 2008=0,2

BARCELONÈS

Barcelona 20 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 5 exs. el 3.XI (MGVA); (N, F).

Emberiza hortulana

Hortolà

Estatus Nidificant estival escàs de presència molt irregular, i més aviat localitzada i escassa, tot i que en alguns llocs pot tenir abundàncies relatives de forma molt localitzada. Migrador regular, en baix nombre, arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 0% (ns, n=31).

Índex 2008=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a les closes de Mornau el 15.IV (JQQA); primera citació prenupcial (F).

BAGES

Talamanca Un mascle cantant a una zona cremada el 22.V i, novament, 2 mascles cantant el 28.V (RBVA); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 18.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat Un mascle cantant a can Dimoni el 16.IV (SSAA i JCGC); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sedimentat a Sant Pere Màrtir el 22.IX (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop de les Gambires el 19.IV (MRFA); primera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Sanauja 1 ex. al riu Llobregós el 27.IV (CGFA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 25.IX (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

Emberiza rustica

Repicalons rústic

D'homologar-se aquesta citació, seria la primera per a Catalunya.- MARC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Una femella de 2n any anellada a l'illa de Buda el 18.III (DBCA, ACXI, JFBB, ALXG, YBSA, JBGC, ISSB, MCBB i CJMA); (G). No tramesa al CAC.

Emberiza schoeniclus

Repicalons

Estatus *E. s. schoeniclus* migrador i hivernant molt comú en les zones humides, i en conreus de plana d'arreu del territori, absent en les zones muntanyenques i de major altitud. *E. s. witherbyi* resident nidificant regularment de forma molt localitzada al delta de l'Ebre i a l'embassament d'Utxesa.

Malgrat la tendència negativa mostrada pel SOCC no és significativa, l'índex per l'hivern 2008-2009 ha estat el més baix des de l'inici del projecte el 2002 (ICO 2009). Aquest fet és consistent amb el baix nombre de migrants detectats al Barcelonès i amb la manca de dades de dormidors o de concentracions hivernals com les que habitualment s'han publicat en anuaris anteriors (ie. Estrada & Anton 2007, Anton 2008). Tot plegat apunta que l'hivern 2008-



2009 no ha estat bo per a la hivernada del repicalatons a Catalunya, fet que podria tenir alguna relació amb el descens de les seves poblacions reproductores a nivell europeu (EBCC 2009). Caldrà seguir l'evolució d'aquesta espècie en un futur per conèixer el seu estatus real.- MARC.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -5% (ns, n=101).
Índex 2008=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. anellats a l'estany de Mornau el 4.IV (MOVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany de Palau el 8.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 60 exs. a la cua de l'embassament del Foix el 19.I (PARA, CGGA, XPCA, PTEA i JCRE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 150 exs. el 12.I (CACB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 71 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. als calaixos de depuració el 2.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 5.X (FLSA i XSPA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 27 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 20 dies de seguiment de la migració entre les 8:00 i les 10:30 h entre els dies 3.IX i 12.XI amb un màxim de 11 exs. el 5.XI. (MGVA); (N).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 5.X (DCFB i XRCA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Tona 1 ex. al canyar de la depuradora el 10.X (MRFA); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 101 exs. a l'estany el 13.I (CFQA i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 21.IV (MPLA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 9.X (JBGC); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 6.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Navès 2 exs. a l'embassament de la Llosa del Cavall el 24.II (RBVA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Salats i Muntanyans el 7.X (JVDA); primera citació postnupcial (F).

Emberiza melanocephala**Sit capnegre**

Estatus Accidental. Diverses dades homològades. Cria des d'Itàlia fins a la mar Càspia, i al sud, fins a Israel i l'est de l'Iran. Hiverna principalment a l'oest i el centre de l'Índia.

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Un mascle al Parc Fluvial del Besòs del 8 (VPRA) al 20.V (XLBA, FMVA, MGVA i JFOD); (G). No tramesa al CAC.

Emberiza calandra**Cruixidell**

Estatus Resident nidificant, comú arreu del territori en espais oberts i en conreus, a excepció de les zones més muntanyenques i de major altitud. Migrador i hivernant regular arreu del territori.

La població nidificant segueix amb una tendència negativa; des del 2002 única-ment la temporada del 2004 va mostrar valors positius (ICO 2009). En canvi, les dades hivernals del SOCC són d'augment, fet que podria indicar que les poblacions d'ambdós períodes no siguin les mateixes. L'observació del maig correspon a la cua del període de migració prenupcial, en la línia d'altres anuaris (Copete 1998, Sales 2006). A destacar la xifra hivernal del SOCC



a Tàrrega, i el seguiment de la joca de Castellet i la Gornal.- FMVA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): -4% (*, n=79).
Índex 2008=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2008): 9% (*, n=64).
Índex 2008=1,9

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 70 exs. a la joca de l'embassament del Foix el 10.I (CGGA, XBGA i HSCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. als calaixos de depuració el 4.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 12 exs. a cal Dalia el 14.X (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració a Sant Pere Màrtir el 5 i el 7.XI (MGVA); (F).

URGELL

Tàrrega 222 exs. al SOCC 73, plans del Conill, el 5.XII (FPTA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Ocells exòtics (Categories D i E)

Cygnus atratus

Cigne negre

Estatus Escapats de captivitat. Diverses citacions a Catalunya. Espècie australiana.

Els exemplars del delta del Llobregat i de Molins de Rei probablement eren els mateixos (López 2008a).- MARC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma del 9.II (RMXH) fins el 2.III (STVB); (G). A partir d'aquesta data s'observen 3 exs. fins el 22.IV (FLSA); (G). Posteriorment es desplacen els 3 exs. a la platja de ca l'Arana entre el 21.V (FLSA i FSEB) i el 3.VI (FLSA); (G). 1 ex. a la gola de la riera de sant Climent el 17.VI (RMXH); (G). 1 ex. al canal de can Sabadell el 12.VII (STVB); (G). 2 exs. al pont de Mercabarna el 13.VII (RBVA); (G). 1 ex. a la maresma del Remolar el 29.VIII (STVB); (G). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 30.VIII (RBVA) i l'1.IX (FLSA); (G). 1 ex. al riu a l'alçada del Prat del 17 (PEGA) el 29.IX (FLSA); (G).

Molins de Rei Observacions regulars de 2 exs. al riu Llobregat entre el 24.I (SSAA) i el 14.II (SSAA); (G). 3 exs. el 23.III (SSAA); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix el 7.IV (VPRA); (G).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Salats i Muntanyans el 8.II (PABA) i el 2.III (XBGA); (G).

Allophen aegyptiaca

Oca egípcia

Estatus Accidental, d'origen desconegut que s'ha reproduït irregularment a Catalunya. Hi ha més de 20 citacions, cap d'elles homologada pel CAC o el CR/SEO. La seva àrea de distribució s'estén per l'Àfrica al sud del Sàhara. Introduïda a diversos països europeus.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a cal Tet el 23.VI (FLSA, DRXD i MFXC); (G). Homologada pel CAC.

GARROTXA

La Vall de Bianya 2 exs. en uns camps de conreu estanyats per les pluges el 26.II (PLSA); (G).

OSONA

Les Masies de Roda Diverses observacions al Ter a Salou: 2 exs el 23.XI (JAIA); (G). 1 ex. el 7.XII (JAIA); (G).

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espadamala entre el 12.I (RPSA i CMGA) i el 6.VIII (RJNA); (G). 1 ex al Ter a Gallifa el 19 (RJNA) i el 27.X (JPRB); (G). De nou 1 ex. al Ter a Espadamala el 19.XII (RPEA); (G).

Manlleu Diverses observacions al Ter a Manlleu: 1 ex. l'1.V (MRFA); primera citació de l'any (F, G). 4 exs a l'embarcador el 10.X (JPRB); màxim anual (N, G). 4 exs al Ter a l'embarcador, el 25.XII (JGXX i GRXB); darrera citació de l'any (F, G).

Santa Maria de Corcó 1 ex al mas Coromines el 23.XII (JCRC); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a l'estany el 13.I (CFQA, JVBV, JSXJ, MCLA i PCSA); cens d'ocell aquàtics hivernants (G).

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. fent diferents passades volant baix el 23.XI (JAIA); (G). 1 ex. parat sobre una pedra, sota els corbs marins *Phalacrocorax sp.* i cridant durant molta estona (JAIA); (G).

Cairina moschata**Ànec mut**

Estatus Procedent de captivitat; espècie de l'Amèrica tropical.

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 4 exs. a l'Areny del Molí el 27.IV (RAGA i JBXP); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Onyar el 12.I (PFLB); (G).

Threskiornis aethiopicus**Ibis sagrat**

Estatus Accidental. Un grup d'individus procedents de captivitat ha mantingut una població en llibertat al Zoo de Barcelona des de la dècada dels setanta amb un màxim de 18 exs. entre 1983-1985 i la desaparició de la colònia en llibertat el 2001. Altres observacions en llibertat s'han fet als deltes de l'Ebre i Llobregat, i als aiguamolls de l'Empordà, però s'ignora si són procedents de captivitat o originàries del nucli reproductor francès (unes 200 parelles en llibertat als inicis de la present dècada).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern a la Bombita l'11 (CJMA, ISSB, YBSA i MCBB) i el 12.I (PGXF i JXXA); (G). 1 ex. a l'Encanyisada entre el 18.III i el 14.IV (CDBA); (G). 1 ex. a l'illa de Buda el 18.VII (RGA, HAXA,

AGAC i GCAB); (G). 1 ex. a l'Alfacada el 27.VIII (RBVA); (G). 2 exs. a l'illa de Buda el 29.IX (MGXE i AAXF); (G). 1 ex. al Clot el 14.X (CJMA i LAXA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet del 6 (MLMB i AOTA) al 8.IX (CFXB); (G).

Phoenicopterus minor**Flamenc menut**

Estatus Accidental, d'origen desconegut. Algunes dades sense homologar, tot i que hi ha dades documentades. La seva distribució s'estén per la vall del Rift, amb alguna altra localitat aïllada a l'Àfrica (per exemple, entre Mauritània i el Senegal) i l'Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. entre el 6 i el 16.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la punta de la Banya: 1 ex. del 9 (FBXD) a l'11.II (MRXF); (G). 1 ex. l'1.V (CDBA); (G). 2 exs. el 12.VII (DBCA, JPVF i TKKA).

Phoenicopterus ruber**Flamenc del carib**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie present al Carib.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banya el 29.X (RGA); (G).

Aix sponsa

Ànec carolí

Estatus Accidental. Espècie nord-americana.

BERGUEDÀ

Berga Una parella a l'estany de Graugés el 10.XII (MBVA); (G).

Anas cyanoptera

Xarxet canyella

Estatus Procedent de captivitat. Espècie que es distribueix pel centre i oest d'Amèrica del Nord, centre d'Amèrica i Amèrica del Sud.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle es localitza als estanys del Matà el 10.V (AOTA) i es continua observant al parc fins que es troba a l'estany del Cortalet el 30.VI (JMAA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Gualta Un mascle, amb tota seguretat el mateix exemplar observat al PNAE, a les basses del club de golf el 8.XI (AOTA i ABRA); (G).

Streptopelia senegalensis

Tórtora del Senegal

Estatus Procedent de captivitat. Espècie present a Orient Mitjà i Africa

ALT EMPORDÀ

Rabós Un mascle a mas Corbera l'1.VII (ABRA); (G).

Nymphicus hollandicus

Cacatua de les nimfes

Estatus Procedent de captivitat. Espècie australiana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola del 24 al 26.IX (RBVA); (G). 1 ex. a cal Tet el 2.X (RBVA). 1 ex. a l'aparcament de cal Tet el 20.X (RBVA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. aturat en un cable elèctric el 23.VIII (TMXC); (G). 1 ex. a les Ferreries el 24.IX (ADGA); (G).

Psephotus haematonotus

Cotorra de dors roig

Estatus Procedent de captivitat. Espècie d'Àustràlia.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 28.IV (JCCA); (G).

Agapornis roseicollis

Agapornis de Namíbia

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix pel sud-oest d'Àfrica.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al carrer Taulat vora la rambla del Poblenou el 25.VI (XTGA); (G).

Agapornis fischeri

Agapornis de Fischer

Estatus Procedent de captivitat. Espècie de Tanzània.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 2 exs. al carrer Bruc el 28.VI (CFMA i RDSA); (G).

Poicephalus senegalus

Lloro del Senegal

Estatus Procedent de captivitat. Espècie procedent de l'oest de l'Àfrica i molt comú com a ocell de gàbia a Catalunya. S'ha trobat en llibertat en diverses ocasions. És probable però la nidificació ocasional en llibertat en alguna ocasió passada, present o futura.

BARCELONÈS

Barcelona Una parella, i una altra possible, cria amb èxit al parc zoològic (JGGD); (R).

Aratinga acuticaudata

Aratinga de cap blau

Estatus Resident localitzat al casc urbà de Barcelona, on nidifiquen localment algunes parelles. Espècie sud-americana.

BARCELONÈS

Barcelona 14 exs. a l'itinerari SOCC 55, passeig de Sant Joan, el 13.I (DMVB); màxim en el projecte (N). 15 exs. menjant fruits d'un pebrer bord *Schinus molle* el 19.I (SHVA); (B). 20 exs. al parc de Diagonal Mar el 20.IV (RRSB); (N). 12 exs. el 14.XI (JCCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma del Remolar l'1 (STVB) i el 12.III (FLSA i PBGA); (G).

Aratinga mitrata

Aratinga mitrada

Estatus Procedent de captivitat. Originària de Perú, Bolívia i Argentina.

BARCELONÈS

Barcelona Una parella durant tot l'any als jardins de l'hospital de Sant Pau (XTGA); (G). 68 exs. al parc zoològic el 9.I (JGGD); màxim anual (N). 28 exs. a l'itinerari SOCC 55, passeig de Sant Joan, el 14.XII (DMVB); màxim en el projecte (N).

Aratinga jandaya

Aratinga jandaia

Estatus Procedent de captivitat. Originària del nord-est de Brasil.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 25.X (JCCA); (G).

Nandayus nenday

Aratinga nandai

Estatus Resident localitzat sobretot al nucli urbà de Barcelona, tot i que hi ha dades puntuals o regulars en altres àrees. Espècie sud-americana

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc zoològic el 5.IV i 6 exs. el 6.IV (JCCA); (G). 15 exs. al parc zoològic el 15.VII (JGGD); màxim anual (N). 11 exs. a un lledoner *Celtis australis* al carrer de la Marina el 4.VIII (XTGA); (G). 12 exs. al parc zoològic el 14.IX (JCCA);

(G). 10 exs. al parc de Diagonal Mar el 25.XI (RRSB); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. en un cable elèctric al costat de la carretera el 2.VI (RGLA); (G).

Cyanoliseus patagonus

Cotorra de la Patagònia

Estatus Espècie sud-americana procedent de captivitat i observada al delta del Llobregat. Tot i que entre 1999 i 2003 no s'ha observat com a reproductor a Catalunya la seva plasticitat la possibilita per poder-ho fer de forma natural en el futur.

PLA D'URGELL

Mollerussa 1 ex. volant a la perifèria del nucli urbà el 13.X (FMSA); (G).

Gracula religiosa

Minà religiós

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix a l'Índia, Malàisia i Indonèsia.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de cal Tet el 24.IV (RBVA i APSA); (G).

Acridotheres tristis

Minà comú

Estatus Procedent de captivitat. Diverses observacions al delta del Llobregat. Originari de l'Índia i establert a Austràlia, Nova Zelanda, sud de l'Àfrica, Rússia, Aràbia i Tenerife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 15.IV (PBGA i JBOL); (G). 1 ex. a la Ricarda el 24.IV (JCPA i RSPA); (G).

Lamprotornis superbus

Estornell superb

Estatus Procedent de captivitat. Espècie africana.

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex., procedent de captivitat, al nucli urbà els dies 8.X (JCGF), i 15 i 31.XII (NFXA); (G).

Ploceus melanocephalus

Teixidor capnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie africana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Tet el 12.X (RBVA); (G).

Euplectes afer

Teixidor daurat

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix per l'Àfrica al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 polls volanders a l'estany Europa el 2.VII (JMAA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar del 17 (RBVA) al 31.VIII (STVB); (G). Un mascle a cal Tet el 3.IX (RBVA); (G). 15 exs. a l'itinerari SOCC 257, els Reguejrons, el 9.XII (RGLA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 6.IX (MGVA); (G).

Estrilda troglodytes

Bec de corall cuanegre

Estatus Resident introduït, procedent de captivitat, que manté petites poblacions naturals de forma molt localitzada en algunes comarques (Baix Llobregat, Barcelonès, Tarragonès, per exemple). Es distribueix pel Sudan i Uganda.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l'aiguabarreig del riu Foix amb la riera de Marmellar el 28.III (XPCA); (G). 4 exs. a les vinyes de la cua de l'embassament del Foix el 29.V (PTEA i JDCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 47 exs. a l'itinerari SOCC 215, Gavà, el 7.XII (DBMC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al llarg de tot l'any d'estols de fins a 30 exs. al parc del Putxet (JCPB); (G, N).